CATALOGUS
PLANTARUM

HORTI BOTANICI

MEDICO-CIRURGICAE SCHOLAE OLISIPONENSIS

ANNO

MDCCCLII.

OLISIPONE
TYPOGRAPHIA NATIONALI
MDCCCLII.



Antonio Bivar de Sousa

CATALOGUS

PLANTARUM

HORTI BOTANICI

MEDICO-CIRURGICAE SCHOLAE OLISIPONENSIS

ANNO

MDCCCLII.

(1852)

OLISIPONE

TYPOGRAPHIA NATIONALI

MDCCCLI.

(1851)

« Hortorum botanicorum catalogi vario usui destinati sunt. « Nam ejusmodi recensus cunctis, qui in eadem scientiae vi- « nea operantur, serviunt, et quid ex unoquoque petendum « et vicissim sit dandum docent, deinde tutissimum plantarum « per areas et caldaria dispositionis fundamentum sistunt et « nomenclatorem, seminariorum etiam clavis sunt, et com- « mercii epistolici index, primaria verbo horti administrandi « norma. »

Steph. Endlicher Catal. Hort. Acad. Vindobonae Praefat.

PRAEFATIO.

Hortus Scholae Medico-Cirurgicae Olisiponensis in anno MDCCCXLIX initium cepit; creatus est ad implendum praeceptum ejus statuti, declaratum apud art. XLII cap. VI, curisque Concilii scholaris, semper soliciti in promovendis studii practici rationibus, quod ei statutum credidit, debetur.

In hoc autem horto, qui adjuvare institutionem eorum, qui disciplinis Medico-Cirurgiae et Pharmaciae incumbunt, praecipue tendit, omnes plantae medicinales et alimentariae, quas coligere licuit, coluntur; practerea quae ad studium Florae Lusitanae sunt aptae; indiginae etiam aut exoticae, quae ut exemplaria divisionum naturalium inspectari possunt, secundum methodum classificationis in horto receptum.

Res est maximi ponderis, talia enim susceperun botanici, ut Cl. Stephans Ladislaus Endlicher et William Aiton, auctores catalogorum hortorum botanicorum Vindobonae et Kew, quorum opera exemplaria hujus generis habentur. Si vero conficere et typis mandare catalogum nostri horti scholaris ausi sumus, profecto in animo non habuimus botanicorum scientiam ostentare, scimus enim, quanta nobis desunt, ut hoc nomine gaudeamus, quamobrem etiam pro titulo non respondemus. In hoc opusculo solum tendimus hac ratione, pro viribusque nostris, in ordinem redigere cultum horti, et nostris alumnis institutionem faciliorem reddere, ad quos unice haec scribere decrevimus. Classificatio, qua utimur, est secundum methodum naturalem, qualis apparet in opere egregio Karl Friedrich Meisner — Plantarum Vascularium Genera. Observationes de habitatione, et alias, quas collegimus, de singulis speciebus, ex libris classicis desumpsimus, hujusmodi sunt — A. P. De Candolle Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, — Karl Sigismond Kunth Enumeratio plantarum, — Wilhelm Gerhard Walpers Repertorium et Annales botanices systematicae, — Kurt Sprengel Systema vegetabilium, — Felix Avellar Brotero Flora et Phytographia, — Hoffmannsegg et Link *Flore Lusitane*, — Figueiredo *Flora alimentar e pharmaceutica*, — Christian Friedrich Hochstleter Flora Azorica, — Richard Thomaz Lowe Primitiae Florae Maderae et Porti Sancti. Consulimus etiam, praeter alias, Floras regionum similis vegetationis ac nostrae, — duarum Castillarum, et Catalunae eximii botanices professoris hispani D. Miguel Colmero, — Floram Calpensem E. F. Keloart, — Gallicam La-

marck et De Candolle, — Britanicam Hooker et Arnott, — Argeliae G. Munby, — Confederationis Americae borealis Asa Gray, — copiosissima scripta professoris Karl Friedrich Von Martius de Flora Brasiliensi, quorum excellentem collectionem Academia Scientiarum Olisiponensis ferme totam possidet. Omnibus praeterea observationibus Herbarii Florae Lusitanae collecti et in ordinem redacti a doctore Friedrich Welwitsch, quod apud nostrae Academiae museum servatur, usi sumus; simulque omnibus, quas studio nostro de hujusmodi rebus comparare potuimus. Hic catalogus, quamquam exiguus, sicut hortus, cujus Floram representat, labore tamen, sollicitudineque a nobis est confectus, sicut eadem ad creationem et conservationem horti scholaris (non semel dissolutione subjecti propter inopiam redituum, etsi exilium, quibus ad suam sustentationem indiget) adhibuimus. Omnia bene locata arbitramur, si hoc modo doctrinae nostrorum alumnorum prodesse, ac si animos plus excitare apud nos ad studium practicum cujusdam ex scientiis naturalibus magni momenti, et gratae colentibus, qualis botanice, potuerimus; quae scientia, si jam egregio impulsu Cl. Brotero, Correa da Serra, aliorumque illustrium in hac re Lusitaniae floruit, postea quoque multum decidit, ut multa alia nostra infelici quodam fato.

Hic locus est agendi gratias praepositis hortorum botanicorum Conimbricae et Ajudae, et maxime horti plantarum parisiensis, cujus ex professoribus Cl. Adolphe Theodor Brongniart et Joseph Decaisne, semper in requisitionibus nostris maxima signa benevolentiae et liberalis cooperationis, quae in rebus ad scientiam et instructionem pertinentibus valde

claram singularemque Scholam parisiensem redduna accepimus. Cl. Frederico Welwitsch multas Flora Lusitanae plantas debemus, ac praeterea consilia quae ejus major harum rerum usus comparatus i studio nostrae Florae utilissima nobis opusculoqu nostro fuerunt, pro quibus omnibus ei hoc in loc publicam gratiam habemus.

B. A. GOMES, ET C. M. F. DA S. BEIRÃO

Auctores in Catalogo citati, aut in compositione nominum generum et specierum commemorati.

Achilles. — O discipulo de Chiron. Dedicaram-lhe o genero *Achillea*, pela idéa de ter sido o primeiro, que empregara em medicina uma das especies mais antigamente conhecida d'este genero.

Adans — *Michel Adanson*. — Celebre viajante naturalista, auctor da *Histoire naturel du Senegal*.

Ait. — *William Aiton*. — Director do jardim botanico de Kew, e auctor de um catalogo das plantas cultivadas n'este jardim.

All. — *Carlo Allione*. — Auctor da *Flora Pedemontana*.

Alonso. — *Alonso Zanoni*. — Auctoridade hespanhola em Santa Fé de Bogota. Dá o nome ao genero *Alonsoa*, que lhe foi dedicado.

Alph. D. C. — *Alphonse De Candolle*. — Botanico de Genebra, filho do outro celebre botanico do mesmo apellido.

Alpini. — *P. Alpini*. — Medico italiano do 17.º seculo, a quem se dedicou o genero *Alpinia*.

Alstroemer. — *Barão C. Alstroemer*. — Botanico sueco.

Amaryllis. — A nympha do nome se consagrou um dos mais bellos generos da Flora.

Andr. — *Henry C. Andrews* — Distincto botanico-pintor inglez.

Arduine. — *Pietro et Luigi Arduine*. — Botanicos italianos.

Aubl. — *Fusée Aublet*. — Auctor da *Histoire des plantes de la Guiane française*.

Banks. — *Joseph et Jeorge Banks*. — Botanicos inglezes. O museu e bibliotheca botanicas de Joseph Banks, que hoje fazem parte do museu botanico de Londres, foram das mais ricas collecções particulares do fim do ultimo seculo.

Barrelier — *Jacques Barrelier* — Botanico francez do 17.º seculo.

Bart. — *William P. C.* — *Barton.* — Auctor do *Prodromus Florae philadelphiae*, e da *Flore of North-America.*

Bauh. — *Jean et Gaspard Bauhin.* — Celebres botanicos e escriptores do 16.º seculo.

Bauh. Pin. — *Pinax theatri botanici Gaspard Bauhini.*

Beauv. — *Palisot de Beauvais.* — Botanico e viajante francez.

Bedford. — *Duque de Bedfort.* — Zeloso promotor dos estudos botanicos.

Begon. — *Michael Begon.* — Promotor dos progressos da botanica.

Belleval. — *P. R. Belleval.* — Botanico francez.

Benth. — *Bentham.* — Botanico inglez, auctor de uma monographia sobre Labiadas.

Bernh. — *Johann Jakob Bernhardi.* — Botanico allemão.

Bertero. — *Carlo Giuseppe Bertero.* — Medico de Turim, que escreveu sobre objectos de botanica medica.

Bertol. — *Antonio Bertolini.* — Auctor de uma *Flora italica*

Bieb. — *Bieberstein.* — Botanico russiano.

Bignon. — *Abbé Bignon.* — Viveu no tempo de Luiz 14.º, foi-lhe dedicado o genero *Bignonia.*

Bivon. — *Antonio Barone Bivona-Bernardi.* — Auctor de varios escriptos sobre a Flora da Sicilia.

Bochemer. — *Jeorg Rudolph Bochemer.* — Botanico allemão do seculo passado.

Boerhaave. — Ao celebre medico d'este nome foi dedicado o genero *Boerhaavia.*

Boiss. — *Edmond Boissier.* — Estudou particularmente e fez conhecer a Flora da Peninsula, auctor da *Voyage botanique dans la midi de l'Espagne pendant l'année* 1837.

Bojer. — *W. Bojer.* — Auctor de um catalogo das plantas espontaneas e cultivadas das ilhas Mauricias, ou do *Hortus mauritianus.*

Bonjean. — *Joseph Bonjean.* — Escreveu sobre a cravagem de centeio uma memoria coroada pela sociedade de pharmacia de París.

Bot. Mag. — *Botanical Magazine.* — Importante publicação periodica começada em 1787, e por muito tempo dirigida por *William Curtis*, seu instituidor.

Bourjeau. — Membro da sociedade franceza de exploração botanica, auctor das *Notes sur quelques plantes nouvelles, critiques ou rares du midi de l'Espagne.*

Bouvard. — *Dr. Bouvard.* — Botanico francez.

Bromelius. — *Olof Bromelius.* — Botanico sueco.

Brongn. — *Adolphe Theodor Brongniart.* — Professor de botanica em Paris, e auctor de muitos escriptos, especialmente sobre vegetaes fosseis.

Brot. — *Felix de Avelar Brotero.* — O insigne botanico portuguez, auctor da *Flora* e da *Phytographia lusitano*, do Compendio de botanica, e de outros escriptos.

Brown. — *Robert Brown.* — Distincto botanico inglez, auctor do *Prodromus Florae Novae-Hollandiae.*

Brugmans. — *Seboldus Justinus Brugmans.* — Botanico allemão do seculo passado.

Brunswich. — Apellido de uma nobre familia ingleza, a que se dedicou o bello genero *Brunswigia.*

Buddle. — *A Buddle.* — Amador botanico inglez; foi-lhe dedicado o genero *Buddleia.*

Bunge. — *Alexander von Bunge.* — Botanico russiano com escriptos sobre plantas da Asia e outros.

Caesalpino. — *Andrea Caesalpino.* — Celebre botanico florentino do 16.º seculo.

Calandrini. — *Jean Louis Calandrini.* — Escreveu no seculo passado sobre objectos de physiologia vegetal.

Campd. — *F. Campdera.* — Botanico hespanhol, que escreveu sobre os *Rumex.*

Cass. — *Alexandre Henri Gabriel, conde de Cassini.* — Botanico francez, que se occupou muito do estudo das Compostas.

Cav. — *José Antonio Cavanilles.* — Distincto professor de botanica hespanhol do fim do ultimo seculo, auctor, entre outros escriptos, do *Icones et descriptiones plantarum, quae aut sponte in Hispania crescunt, aut in hortis hospedantur.*

Cels. — *François Cels.* — Horticultor de Paris.

Cham. — *Adelber von Chamisso.* — Naturalista allemão.

Chav. — *Edouard Chavannes.* — Botanico suisso.

Christovão dos Reis. (Padre.) — Publicou noticias sobre algumas das producções naturaes de Portugal.

Clarke. — *Edward Daniel Clarke.* — Viajante inglez.

Clemente. — *D. Simon de Roxas Clemente e Rubio.* — Botanico hespanhol, auctor de uma Flora inedita do reino de Granada, e de outros manuscriptos, que existem todos no museu de historia natural de Madrid, e que muito aproveitaram a Webb para a sua publicação o *Iter hispaniense.*

Clinton. — *De William Clinton.* — Governador, que foi, em New-York; o genero *Clintonia* deve-lhe o nome.

Clus. — *Carolus Clusius.* — Botanico escriptor do 16.° e 17.° seculos, um dos traductores e commentadores do nosso Garcia da Horta.

Cluyt. — *Outgers Cluyt.* — Professor de botanica em Leyden.

Cobo. — *B. Cobo.* — Botanico hespanhol, a quem dedicaram o genero *Cobaea.*

Collins. — Deu noticias botanicas e outras da New Soutls Wales, dedicou-se-lhe o genero *Collinsia.*

Commelyn. — *Gaspar, et Johan Commelyn.* — Botanicos do 17.° seculo, o primeiro é auctor de uma *Flora malabarica.*

Cooper. — *Daniel Cooper.* — Auctor de uma Flora dos arredores de Londres.

Corréa. — *José Corréa da Serra.* — Botanico portuguez distincto; viajou na America do norte. occupou-se particularmente de carpologia, e de outros objectos de physiologia e anatomia vegetal. As suas memorias correm impressas nas collecções das academias estrangeiras

Coult. — *Thomaz Coulter.* — Auctor de uma memoria sobre as Dipsaceas.

Crantz. — *Heinrich Johann Nepomuk von Crantz.* — Medico e botanico austriaco, auctor de uma materia medica.

Cun. — *Allan Cunningham.* — Celebre viajante. que escreveu sobre plantas da Australia.

Curt. — *William Curtis.* — Fundador do *Botanical Magazine*, auctor da *Flora londinensis*. e de outros escriptos.

Cusson. — Botanico francez, a quem se dedicou o genero *Cussonia.*

Dahl. — *Andrew Dahl.* — Botanico sueco, discipulo de Linneo; o bello genero *Dahlia* foi-lhe dedicado.

Daubenton. — Celebre naturalista francez.

D. C. — *Augustin Pyramus De Candolle.* — O auctor do *Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis*, e de numerosos outros escriptos; um dos primeiros botanicos d'este seculo.

Davall. — *Edmond Davall.* — Botanico suisso.

D. Don. — *David Don.* — Auctor do *Prodromus Florae nepalensis*

Delaire. — Dá o nome a um genero, que se quiz impropriamente formar com o *Senecio Mikanoides.*

De la Roche. — *Daniel, et François de la Roche.* — Botanicos, um do seculo anterior, o outro do principio d'este, e a um dos quaes é dedicado o genero *Rochea.*

Deppe. — Botanico, que viajou no Mexico.

Deschamps. — Botanico francez.

Desf. — *René Louiche Desfontaines.* — Auctor da Flora atlantica, e mui distincto botanico do seu tempo.

Desp. — *N. Desportes* — Auctor de uma monographia do genero *Rosa.*

Desr. — *Louis Auguste Joseph Desrousseaux.* — Medico-naturalista francez do fim do ultimo seculo.

Desv. — *A. N. Desvaux.* — Professor de botanica em Paris; auctor de varios escriptos.

Deutz. — *John Deutz* — Hollandez, promotor dos progressos da botanica; dedicaram-lhe o genero *Deutzia.*

Dicks., *Dickson.* — *James Dickson.* — Cryptogamista inglez.

Dillenius. — *Johann Jakob Dillenius.* — Botanico allemão, auctor de uma *Historia muscorum.*

Don. — *George Don.* — Botanico escriptor inglez.

Douglas. — *David, et James Douglas.* — Botanicos inglezes.

Douy. — *J. Douy.* — Botanico francez.

Dor. — *H. H. Dore.* — Botanico allemão.

Drummond. — *J. L. Drummond.* — Botanico inglez.

Dryand. — *Jonas Dryander.* — Auctor do *Catalogus bibliotheeae historico-naturalis J. Banks.*

Duby. — *Jean Etienne Duby.* — Auctor do *Botanicon gallicum.*

Dufr. — *Pierre Dufresne.* — Escreveu sobre as Valerianeas.

Durante. — *Castore Durante.* — Botanico italiano do 17.° seculo.

Echeveri, *Echevaria.* — Celebre pintor-naturalista mexicano, a quem dedicaram o genero do seu nome.

Edwards. — *Sydhenam Edwards.* — Colaborador com John Lindley do *Botanical Register*, publicação periodica, que existe desde 1815.

Ehrh. — *Friedrich*, *et Projectus Joseph Ehrhart.* — Botanicos allemães do ultimo seculo.

Ellis. — *John*, *et William Ellis.* — Botanicos inglezes do seculo passado.

E. Mey. — *Ernst Heinrich Friedrich Meyer.* — Auctor de numerosos escriptos botanicos.

Endl. — *Stephan Ladislaus Endlicher.* — Auctor do *Enchiridion botanicum*, e de outros muitos importantes escriptos; um dos primeiros botanicos do seculo.

Escallon. — Viajante hespanhol, a quem se dedicou o genero *Escallonia.*

Eschschóltz. — *Dr. Eschscholtz.* — Medico-naturalista, professor na universidade de Derpot; fez explorações na Nova-California, e com Chamisso tambem nos mares do sul.

Eugene principe de Savoia. — Promotor do progresso da botanica.

Euphorbus. — Medico de Juba, rei da Mauritania; foi-lhe dedicado o genero *Euphorbia.*

Fabiano. — *F. Fabiano.* — Botanico hespanhol, a quem dedicaram o genero *Fabiana.*

Fenzl. — *Edward Fenzl.* — Botanico allemão.

Ferrari. — *Jiovani Baptista Ferrari.* — Botanico italiano.

Figueiredo. — *Jeronymo Joaquim de Figueiredo.* — Pro-

fessor da universidade de Coimbra, auctor da *Flora alimentar e phormoceutica lusitana.*

Fisch. — *Friedrich Ernst Loudwig.* — Director do jardim botanico de S. Petersbourg.

Forsk. — *Pchr. Forskal.* — Auctor de uma *Flora Aegyptioeo-Arabica.*

Forst. — *Georg, et Johann Reinhold Forster.* — Acompanharam o capitão Cook nas suas excursões maritimas, deram importantes noticias sobre plantas, especialmente da Australia; a Flora das ilhas da Madeira, dos Açôres, e a de Cabo Verde foram tambem exploradas por estes viajantes

Fortune. — *R. Fortune* — Horticultor enviado á China pela sociedade de horticultura de Londres

Francis. — Imperador de Austria; foi-lhe dedicado o genero *Franciscea.*

Frankenius. — *John Frankenius.* — Professor de botanica em Upsal.

Franzer. — *Antony Franzer.* — Medico-botanico, a quem se dedicou o genero *Franzeria.*

Fuchs. — *Leonhard Fuchs.* — Botanico allemão do 16.° seculo, a quem se dedicou o genero *Fuchsia.*

Goert. — *Joseph Gaertner.* — Celebre carpologista allemão, que viveu no principio d'este seculo.

Gaillard. — *G. de Murantonneau Gaillard.* — Amador botanico, a quem dedicaram o genero *Gaillardia.*

Garden. — *Dr. A. Garden.* — Medico em Charsleton, a quem dedicaram o genero *Gardenia.*

Gaudich — *Charles Gaudichaud-Beaupré.* — Botanico francez, que acompanhou mr. de Freycinet em uma viagem de circumnavegação.

Goy. — *Jacques Gay.* — Auctor de alguns escriptos botanicos monographicos.

Geoffroy. — *Etienne François Geoffroy.* — Professor de botanica em Paris, e auctor de um Tratado de materia medica.

Gentius. — Rei da Illyria, que se diz ser o primeiro que experimentara as virtudes da genciana.

Gesner. — *Conrad Gesner.* — Distincto botanico do 16.° seculo.

Gilio. — *P. S. Gilio.* — Botanico hespanhol.

Gill. — *Dr. Gillies.* — Botanico escocez.

Ging. — *Frederic Charles Jean, baron de Gingins.* — Botanico francez.

Gleditsch. — *Johann Gottlieb Gleditsch.* — Botanico allemão do seculo passado.

Glox. — *Benjamin Peter Gloxin* — Botanico francez.

Gm. — *Johann Georg Gmelin.* — Auctor da *Flora sibirica.*

Gomes. — *Bernardino Antonio Gomes (senior.)* — Medico portuguez, auctor das *Observationes botanico-medicae de nonnullis brasiliae plantis*, e de outros escriptos.

Goodenough (Dr.), *bispo de Carlisle.* — Deriva do seu nome o do genero *Goodenia.*

Gorter — *David de Gorter.* — Auctor da *Flora belgica, zutphanica, et ingrica*

Gouan. — *Antonio Gouan.* — Botanico de Montpellier.

Grah — *John Graham* — Professor de botanica em Bombaim.

Greville. — *C. F. Greville.* — Promotor dos estudos botanicos; foi-lhe dedicado o genero *Grevillia.*

Grew. — *Nchemiah Grew.* — Botanico anatomo-physiologista do 17.º seculo.

Gron. — *Johane Friedrich Gronovius.* — Auctor de uma *Flora virginica*, e *Flora orientalis.*

Guillemin. — *Antoine Guillemin.* — Dirigiu a redacção dos *Archives de botanique*, e escreveu sobre a Flora do Senegal, e a da Australasia.

Guss. — *Giovanni Gussone.* — Auctor de differentes trabalhos sobre a Flora da Sicilia.

H. — *Hortus.* — Jardim botanico, ou dos jardins batanicos.

Haller. — *Albert von Haller.* — O distincto medico e physiologista do meado do seculo passado, que escreveu tambem muito sobre botanica.

Hartweg. — Auctor de um catalogo do jardim botanico em Calsruhe.

Hav. — *Frederic Chretien von Haven.* — Professor em Dinamarca; viajou na Arabia com Forshal, Cramer. Niebuhr. e Baurenfeind.

Haw. — *Adrian Hardy Haworth.* — Botanico inglez, que em especial se occupou do estudo das plantas carnosas.

H. et B. — *Friedrich Heinrich Alexander von Humboldt, et Aimé Bonpland.* — Distinctos viajantes, bem conhecidos por seu vastissimo saber, e pelo muito que fizeram conhecer nos ramos todos da historia natural, assim como em outros, das regiões equinoxiaes, especialmente da America.

Herit. — Vide *L'Herit.*

H. K. — *Hortus Kew.* — Jardim botanico de Kew, perto de Londres, o mais rico e bem cultivado da Europa.

Hochst. — *Christian Friedrich Hochstetter.* — Auctor da *Flora azorica.*

Hoffm. — *Hoffman.* — São muitos os botanicos allemães com este apellido, auctores de trabalhos e escriptos botanicos.

Hoffmanns. — *Johann Centurius Graf von Hoffmannsegg, et Heinrich Friedrich Link.* — Auctores da *Flore portuguaise;* e a quem muito se deve pelo cabedal de sciencia, de tempo, e de fortuna, que generosamente consagraram ao estudo da nossa Flora.

Hook. — *William Jackson Hooker* — Actual director do jardim de Kew, auctor do *Journal of botany* de Londres, de uma *Flora britannica*, e de outros muitos trabalhos e escriptos phytographicos; um dos primeiros botanicos da época presente.

Hoy. — *T. Hoy.* — Horticultor, a quem se dedicou o genero *Hoya.*

Huds. — *William Hudson.* — Auctor da *Flora britannica* publicada em 1778.

Jacq. — *Nicolaus Joseph von Jacquin.* — Distincto professor de botanica e director do jardim de Vienna no seculo passado.

Jaume. — *Jean Henri Jaume Saint Hilaire.* — Auctor de uma Flora dos arredores de París.

Juss. — *Antoine Laurent, Adrien, et Bernard de Jussieu.* — Auctores de importantes e numerosos trabalhos botanicos, especialmente o primeiro, que deve considerar-se o principal fundador do methodo natural applicado á classificação dos vegetaes.

Justice. — *James Justice.* — Distincto horticultor escocez, que dá o nome ao genero *Justicia.*

Kalm. — *Pehr Kalm.* — Botanico allemão do seculo passado.

Karwinski. — *Baron de Karwinski.* — Naturalista da Baviera, que viajou no Mexico; deve-se-lhe o conhecimento e introducção na cultura dos jardins da Europa de muitas especies vegetaes.

Kaulfuss. — *George Friedrich Kaulfuss.* — Auctor de uma *Enumeratio filicum*, ou monographia geral sobre Fetos.

Kennedy. — Horticultor inglez; dá nome ao genero *Kennedya*, que lhe foi dedicado.

Ker. — *John Bellenden Ker.* — Botanico inglez. *William Ker* é outro botanico, collector de plantas do jardim de Kew, a quem dedicaram o genero *Kerria.*

Kitaibel. — *Paul Kitaibel.* — Auctor de um catalogo de plantas do horto botanico da universidade da Hungria.

Klein. — *Jakob Theodor Klein.* — Botanico do seculo passado.

Knaut. — *Christian Knaut.* — Medico saxonio, que cultivou tambem estudos botanicos.

Kniphof. — *Johann Hieronymus Kniphof.* — Botanico allemão do seculo passado.

Koch. — *Wilhelm Daniel Joseph Koch* — Auctor da *Synopsis Florae germanicae et helveticae.*

Koel. — *George Ludwig Koeler.* — Escreveu especialmente sobre as Gramineas de Allemanha e França.

Koenig. — Varios medicos e botanicos allemães com este apellido escreveram no seculo 17.°, 18.° e no actual sobre objectos phytographicos.

Kunth. — *Karl Sigismond Kunth.* — O auctor da *Enumeratio plantarum*, obra que infelizmente deixou no quarto volume este eximio botanico.

Labil. — *De La Billardiere.* — Celebre viajante francez, cujas explorações na Syria, e em viagens, que fez, de circumnavegação, produziram importantes acquisições para a botanica.

La Chenal. — *W. de la Chenal.* — Botanico francez, a quem se dedicou o genero *Lachenalia.*

Lag.—*Mariano Lagasca.*—Distincto botanico hespanhol, discipulo de Cavanilles, e a quem a sciencia esteve para dever uma Flora hespanica, se perseguições politicas, que lhe fizeram perder as suas collecções, e o obrigaram a expatriar-se, não tivessem inutilisado o fructo das laboriosas e extensas explorações, que fez sobre a vegetação da Peninsula.

Lagerstroem. — *Magnus Lagerstroem.* — Amigo de Linneo, a quem este dedicou o genero *Lagerstroemia.*

Lam. — *Jean Baptiste Pierre Antoine de Monnel De La Marck.* — Auctor da *Flore française*, e um dos celebres encyclopedistas.

Lambert. — *Aylmer Bourcke Lambert.* — Occupou-se muito particularmente do estudo das Coniferas; uma importante monographia sobre o genero *Pinus* é o fructo d'este estudo.

Lapeyrouse. — *Phylip Picot Lapeyrouse.* — De Toulouse, escreveu uma monographia sobre as Saxifragas.

Laurence. — *John Laurence.* — Escreveu sobre agricultura e jardinage.

L. C. Richard. — *Louis Claude Marie Richard.* — Escreveu sobre as Orchidaceas, Musaceas, Coniferas e Cicadeas, monographias especiaes.

Leconte. — *Emile Leconte.* — Botanico francez.

Lehm. — *Johann Georg Christian Lehmann.* — Professor de botanica em Hamburgo, auctor de muitos trabalhos monographicos.

Lemaire. — *Charles Lemaire.* — Occupou-se muito do estudo das Cacteas.

Less. — *Christian Friedrich Lessing.* — Occupou-se particularmente do estudo das Compostas.

L'Herit. — *Charles Louis L'Heritier de Brutelle.* — Botanico francez.

Lindl. — *John Lindley.* — Professor de botanica em Londres; deve-se-lhe uma monographia sobre Orchideas, e a muito util obra elementar *The Vegetable Kingdon*, além de outros trabalhos.

Link. — *Heinrich Friedrich Link.* — Distincto professor de botanica prussiano, a quem se devem numerosos e impor-

tantes trabalhos e escriptos; coadjuvou poderosamente o conde de Hoffmannsegg na exploração da Flora portugueza; é dos viajantes, que mais e melhor viu em Portugal; honrou o caracter dos portuguezes, com os quaes viveu muito tempo.

Linn. — *Caroli Linné.* — O principe dos naturalistas.

Lobel, *Lobelus.* — *Mathias de L'Obel.* — Botanico belga.

Lodd. — *Conrad Loddiges.* — Celebre horticultor inglez.

Loefl. — *Pehr Loefling.* — Viajou como botanico na Hespanha e no sul da America; viveu no meio do seculo passado.

Logan. — *James Logan.* — Botanico do seculo passado.

Lois. — *Jean Louis Auguste Loiseleur Deslongchamps.* — Auctor de uma Flora e Iconographia de França, além de outros escriptos.

Lonitzer, *Lonicerus.* — *Adam Lonitzer.* — Botanico allemão do principio do seculo anterior.

Lour. — *Padre João de Loureiro.* — Celebre missionario e naturalista portuguez, o auctor da *Flora cochinchinensis.*

Lowe. — *Richord Thomoz Lowe.* — Inglez residente na Madeira, que muito tem contribuido para fazer conhecer á historia natural d'esta ilha.

Ludwig. — *Christian Gotllieb Ludwig.* — Professor em Leipsik.

Magnol. — *Pierre Magnol.* — Botanico de Montpellier do 17.º seculo; é considerado fundador dos methodos naturaes de classificação.

Mak. C. — *Catalogo de Makay.*

Malcolm. — *William Malcolm.* — Celebre horticultor inglez do seculo passado, de cujo nome derivou o do genero *Malcolmia.*

Maranti. — *B. Maranti.* — Medico veneziano do 16.º seculo, a quem se dedicou o genero *Maranta.*

Martius. — *Karl Friedrich von Martius.* — Auctor da *Flora brasiliensis*, de uma magnifica monographia sobre as Palmeiras, e de outros numerosos escriptos phytographicos; o viajante que mais contribuiu para fazer conhecer a Flora do Brasil.

Musa. — *Antonio Muso.* — Dá o nome ao genero *Muso.*

Mathioli, *Matlioli*, *seu Matthioli.* — *Pietro Andrea Mathioli.* — Botanico italiano do 16.º seculo.

Maurandy (Dr.) — Professor em Carthagena.

Medic., *Medik.* — *Fiedrich Kasimir Medikus.* — Botanico allemão e escriptor do seculo anterior.

Mey. — Com os apellidos de *Meyen* e de *Meyer* existem varios escriptores de botanica allemães; são d'estes os mais notaveis *Franz Julius Ferdinand Meyer*, e *Ernst Heinrich Friedrich Meyer*

Mich. — *Pierantonio Micheli.* — Professor de botanica florentino do principio do seculo passado.

Michaux, *Michx.* — *André*, *et François André (fillius.) Michaux.* — Botanicos francezes; o segundo occupou-se do estudo da Flora norte-americana.

Mik. — *Johann Christian Mikan.* — Escreveu sobre a Flora e a Fauna do Brasil.

Miller. — *Philip Miller.* — Auctor do *Gardner's Dictionary.*

Molina. — *Giovani Ignazio Giovani.* — Escreveu sobre a historia natural do Chili.

Moore. — *R. Moore.* — Botanico em Shrewsbury, a quem se dedicou o genero *Moraea.*

Moq. — *Alfred Moquin-Tandon.* — Escreveu sobre Teratologia vegetal, e sobre as Chenopodiaceas.

Moretti. — *Giuseppe Moretti.* — Auctor de numerosos escriptos botanicos.

Murr. — *Johann Anders Murray.* — O professor de materia medica, auctor do *Apparatus medicaminum.* Existem tambem do mesmo apellido outros escriptores botanicos.

Neck. — *Noel Joseph de Necker.* — Botanico allemão do seculo passado.

Nees. — *Christian Gottfried Nees von Esenbeck.* — Auctor da *Synopsis Hepaticarum*, da *Bryologia germanica*, da *Agrostologia brasiliensis*, e de outros muitos e importantes trabalhos phytographicos.

Nestl. — *Christian Gottfried Nestl.* — Botanico de Strasburgo.

Nicot. — *J. Nicot.* — Personagem, que concorreu para introduzir a cultura da planta do tabaco na Europa.

Noulet. — *J. B. Noulet.* — Escreveu sobre a Flora da região sub-pyrenea.

Nutt. — *Thomaz Nuttal.* — Botanico norte-americano: ajudou a fazer conhecer a Flora do seu paiz.

Ort. — *Casimiro Ortega.* — Botanico hespanhol do seculo passado.

Otto. — *Friedrich Otto.* — Botanico prussiano.

Pall. — *Peter Simon Pallas.* — Auctor da *Flora rossica.*

Parlat. — *Filippo Parlatore.* — Professor de Florença, auctor da *Flora palermitana.*

Paulownia — Princeza herdeira de Netherland; foi-lhe dedicado o genero do seu nome.

Pavon. — *Josef Pavon.* — Um dos auctores da *Flora peruviana et chilensis.*

Paxtan. — *Joseph Paxton.* — Celebre horticultor inglez, auctor do *Magazin Botanical.*

Perrottet. — *G. Samuel Perrottet.* — Botanico francez, que explorou a Flora da Asia.

Pers. — *Christian Heinrich Persoon.* — Estudou particularmente os Fungos; publicou uma *Synopsis fungorum*, e *Mycologia europaeo.*

Petiver. — *J. Petiver.* — Boticario em Londres, a quem foi dedicado o genero *Petiveria.*

Pitcairn. — *W. Pitcairn.* — Medico em Londres, a quem se dedicou o genero *Pitcairnia.*

Planchon. — *J. E. Planchon.* — Botanico francez.

Plumier. — *Charles Plumier.* — Viajou na America, de cuja Flora deu muita noticia.

Pohl. — *Johann Emanuel Pohl.* — Botanico allemão; escreveu sobre plantas do Brasil.

Poinci. — Governador das Antilhas, a quem se dedicou o genero *Poinciana.*

Poinsette. — Viajante mexicano, a quem se dedicou o genero *Poinsettia.*

Poir. — *J. L. Marie Poiret.* — Botanico francez, que viajou na Barbaria.

Poll. — *Ciro Pollini.* — Auctor da *Flora veronensis.*

Pursh. — *Friedrich Traugott Purshvel Pursch.* — Auctor de uma Flora da America Septentrional.

Raddi. — *Giuseppe Raddi.* — Viajou no Brasil, cuja Flora

estudou, mais especialmente as plantas não vasculares, Fetos, e Agrostographia.

Raf. — *Constantino Samuel Rafinesque-Schmaltz.* — Auctor de uma Flora medica dos Estados-Unidos, e de outros trabalhos sobre a Flora d'esta parte da America.

R. Br. — Vide *Brown.*

Ram. — *Louis François Elizabeth, baron Ramond de Carbonniere.* — Botanico francez; explorou os Pyreneos.

Rchb. — *Vide Reich.*

Red. — *Pierre Joseph Redouté.* — Auctor de uma iconographia sobre Liliaceas.

Reich., *Reichenb.* — *Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach.* — Auctor da *Iconographia botanica*, *Icones Florae germanicae et helveticae*, *Flora germanica excursoria*, e de outros trabalhos iconographicos ou phytographicos importantes.

Reinw. — *Kaspar Georg Karl Reinwardt.* — Botanico allemão.

Retz. — *Anders Johan Retzius.* — Auctor do *Florae scandinawiae prodromus.*

Rich. — *Achille Richard.* — Auctor da *Histoire naturelle et medicale des medicamens.*

Risso. — *J. A. Risso.* — Celebre horticultor italiano, auctor de uma monographia do genero *Citrus*, e de uma Flora de Nice, além de outros trabalhos.

Ririnus. — *A. Q. Ririnus.* — Botanico de Saxonia do 17.° seculo.

Robin. — *Jean Robin.* — Botanico francez do 17.° seculo.

Roem. — *Johann Jacob Roemer.* — Auctor, com *Joseph August Schultes*, de uma edição do *Systema vegetabilium* de Linneo, que se publicou em Stuttgard de 1817 a 1836, publicação que ficou por completar.

R. vel Ruiz et Pav. — *Hypolito Ruiz, et Joseph Pavon.* — Distinctos botanicos hespanhoes, auctores da *Flora peruviana et chilensis.*

Rosc. — *William Roscoe.* — Botanico inglez; estudou as Scitamineas.

Roth. — *Albrecht Wilhelm Roth.* — Auctor de uma *Flora germanica.*

Roxb. — *William Roxburgh* — Auctor da *Flora indica.*

Rudbeck. — *Olof Rudbeck, (pater et fillius.)* — Professores de botanica de Upsal no 17.º e 18.º seculos.

Rud. — *Rudolphi.* — Apellido de mais de um botanico allemão.

Ruelle. — *John Ruelle.* — Botanico do 16.º seculo.

Sabine. — *Joseph Sabine.* — Amador de botanica inglez.

Salisb. — *Richard Antony Salisbury.* — Auctor do *Paradisus londinensis*, cujas estampas são de William Hooker.

Salm-Dyck. — *O principe Joseph Furst von Salm Reifferscheid-Dyck.* — Celebre horticultor, cujo jardim perto de Dusseldorf, o horto Dyckense, possue a mais extensa e completa collecção conhecida de especies de Aloes, de Mesembrianthemum, e de Cacteas, ou em geral de plantas carnosas.

Savi. — *Caetano Savi.* — Professor de botanica italiano, auctor da *Flora pisana*, do *Botanicon etruscum*, e de outros escriptos.

Schot. — *R. von der Schot.* — Horticultor, que acompanhou o barão de Jacquin nas suas excursões da America meridional.

Schott. — *Heinrich Schott.* — Botanico de Vienna de Austria, que trabalhou com Stephan Endlicher.

Schrad. — *Heinrich Adolph Schrader.* — Auctor de uma *Flora germanica*, que não se completou, e de outros trabalhos botanicos.

Schrank. — *Franz von Paula von Schrank.* — Auctor da *Flora bavarica*, da *Flora monacensis*, e de outros escriptos.

Schreb. — *Johann Christian Daniel von Schreber.* — Botanico allemão.

Schroed. — *Schroeder.* — É o apellido de mais de um botanico allemão.

Schult. — *Joseph August Schultes.* — Botanico allemão.

Schultz. — *Karl Heinrich Schultzenstein.* — Botanico de Berlim.

Scop. — *Johann Anton Scopoli.* — Naturalista allemão, auctor de uma *Flora carniolica.*

Sellow. — *M. Fr. Sellow.* — Naturalista prussiano, e dos primeiros que exploraram o Brasil, como botanicos

Ser. — *Nicolas Charles Seringe.* — Botanico suisso, auctor de varias monographias phytologicas.

Sibth. — *John Sibthorp.* — Auctor da *Flora graeca.*

Sieb. — *Franz Wilhelm Sieb.* — Escreveu sobre a Flora do Egypto, a de Creta, e a de Jerusalem.

Siebold. — *Philipp Franz von Siebold.* — Auctor da *Flora japonica.*

Sims. — *John Sims.* — Seguiu-se a W. Curtis na direcção do *Botanical Magazine.*

Smith. — *James Edward Smith.* — Auctor da *English Flora*, presidente da sociedade Linneana de Londres, e para quem passou o Herbario de Linneo.

Sol. — *William Sole.* — Escreveu uma monographia sobre as especies britannicas do genero Mentha.

Soland. — *Dr. Solander.* — Sueco, discipulo de Linneo; acompanhou, com Joseph Banks, o capitão Cook em uma de suas expedições; fez explorações no Brasil, no Tahiti, na Nova-Zeelandia, e na Nova-Hollanda.

Sparrman. — *Anders Sparrman.* — Botanico, que viajou no Cabo de Boa-Esperança.

Spielmann. — *Jakob Reinbold Spielmann.* — Auctor de um *Prodromus Florae argentoratensis*, e de uma *Materia medica.*

Spreng. — *Kurt Sprengel.* — Auctor da 16.ª edição do *Systema vegetabilium* de Linneo.

Stapel. — *Dr. J. B. Stapel.* — Editor de Theophrasto.

Steinh. — *Adolph. Steinheil.* — Botanico de Strasbourgh; escreveu sobre physiologia vegetal.

Sternberg. — *Kaspar Graf von Sternberg* — Botanico allemão.

Steudel. — *Erns Gottlieb Steudel.* — Auctor do *Nomenclator botanicus.*

Stev. — *C. Steven.* — Botanico russiano.

Stevens. — *Edward Stevens.* — Consul americano, grande amador de botanica.

Stevenson. — *H. Stevenson.* — Celebre horticultor inglez.

Sutherland. — *James Sutherland.* — Auctor de um catalogo de plantas. o *Hortus medicus edinburgensis*, botanico do 17..° seculo.

Swartz. — *Olof Swartz.* — Escreveu sobre a Flora da India, auctor de importantes monographias sobre Orchideas. Fetos, Musgos, Lycopodiaceas, e de outros escriptos.

Sweert. — *Emanuel Sweert.* — Botanico escriptor do 17.° seculo.

Sweet. — *Robert Sweet.* — Auctor de uma *Flora australasica*, do *British flower-garden*, do *Hortus britanicus*, e outros escriptos.

Tabern. — *Jacobus Theodorus Taberaaemontanus.* — Botanico do principio do seculo passado.

Tages. — Divindade tuscana, a que se dedicou o genero *Tagetes.*

Targioni. — *Aotonio, Giuvani, et Ottaviano Targioni Tozzetti.* — Botanicos toscanos.

Tausch. — *Ignaz Friedrich Tausch.* — Botanico allemão, auctor de um catalogo de plantas com o titulo *Hortus Canalius.*

Ten. — *Michele Tenore.* — Auctor da *Flora neapolitana.*

Thumb. — *Cart. Pehr. Thumberg.* — Auctor da *Flora japonica*, da *Flora capensis*, e de numerosas monographias.

Tournef., *Tourn.* — *Joseph Pitton de Tournefort.* — Celebre botanico do 17.° seculo, auctor do systema de classificação do seu nome.

Tradescant. — *John Tradescant.* — Horticultor de Carlos 1.°, a quem dedicaram o genero *Tradescantia.*

Trin. — *Karl Bernhard von Trinius.* — Occupou-se particularmente do estudo das Gramineas.

Turner. — *Dawson, Robert, Samuel, et Wiliam Turner.* — Botanicos inglezes.

Turp — *Pierre Jean François Turpin.* — Botanico-pintor francez, auctor de differentes trabalhos de physiologia vegetal e de phytographia.

Vachell. — *J. Vachell.* — Colligiu plantas na China.

Vaht. — *Martin Vahl.* — Botanico allemão do fim do seculo passado.

Wahlenbe. — *Georan Wahlenbe.* — Auctor da *Flora lapponica*, *Upsalensis*, *Suecica*, e outros escriptos.

Valle. — *Felix Valle.* — Auctor da *Florula corsica.*

Vandelli. — *Domingos Vandelli.* — Professor da universidade de Coimbra no seculo passado; por uma dissertação sobre o dragoeiro fez conhecer botanicamente esta especie e o genero a que pertence, e além d'isso escreveu sobre a Flora lusitana, e outros objectos de historia natural.

Veltheim. — *F. A. de Veltheim.* — Botanico allemão.

Vent. — *Etienne Pierre Ventenat.* — Botanico francez.

Vill., *Villars.* — *Dominique Villars.* — Botanico francez; escreveu especialmente sobre a Flora do Dauphinè.

Volckamer. — *Johann Georg Volckamer.* — Auctor de uma *Flora noribergensis.*

Wahl. — *Goran Wahlemberg.* — Auctor da *Flora suecica, upsaliensis, carpatorum,* e *laponica.*

Wahlenbe. — *Georan Wahlenbe.* — Auctor da *Flora lapponica, Upsalensis, Suecica,* e outros escriptos.

Wallich. — *Nathanael Wallich.* — Director do jardim de Calcuta, botanico distincto, que muito tem contribuido para o conhecimento da Flora da India.

Wallr. — *C. Friedrich Guilhelm Wallrroth.* — Auctor da *Flora cryptogamica Germaniae.*

Walpers. — *Wilhelm Gerhard Walpers.* — Auctor do *Repertorium botanices systematicae*, continuado no *Annales botanices systematicae.*

Wats. — *Alexander Watson.* — Auctor de uma Flora de S. Helena. Ha outros botanicos do mesmo apellido, que se occuparam da Flora britannica na sua parte geographica.

Weigel. — *Christian Ehrenfried Weigel.* — Auctor da *Flora pomerano-rugica.*

Welw. — *Dr. Friedrich Welwitsch.* — Este naturalisla foi commissionado pela sociedade *Unio itineraria* de Esslingen no Wurtemberg para explorar a vegetação de Portugal, onde reside para isso ha annos; as suas laboriosas e bem aproveitadas excursões tem concorrido para o augmento de conhecimentos da Flora d'este paiz. Compoz uma collecção, justamente apreciada, que corre, distribuida em poucos exemplares, com o titulo de *Flora lusitana exsicata;* e tambem é auctor de uma monographia sobre as Nostochineas do imperio de Austria.

Westring. — *Peter Westring.* — Botanico sueco.

Wight et Arn. — *Robert Wight, et George Arnott Walker-Arnott.* — Auctores do *Prodromus Florae Peninsulae Indiae orientalis*, publicada em 1834.

Willd. — *Karl Ludwig Willdenow.* — Auctor da 15.ª edição do *Systema vegetabilium de Linneo*, do *Prodromus Florae berolinensis*, e de outras obras.

Wistar. — *Gaspar Wistar.* — Professor na Pensylvania.

With. — *William Withering.* — Botanico inglez.

Wright. — *William Wright.* — Deu uma noticia botanica e medica da Simaruba.

Wulf. — *Franz Xaver von Wulfen.* — Occupou-se de cryptogamia aquatica.

Zantedeschi. — *Francesco Zantedeschi.* — Escreveu sobre a influencia da luz na vegetação.

Zinn. — *Johann Gottfried Zinn.* — Professor de botanica de Gottingue.

Signorum Catalogi explicatio.

---

① Planta annua.
② Planta biennis.
♃ Planta perennis herbacea.
♄ Suffrutex.
♄ Frutex.
♄ Arbor; quid in Prodromo D. C. ♄ indicatur.
♄ Arbor 25 ped. superan; quid a D. C. ♄.
◡◠ Planta scandens.

○ = Pleurorhyzeae, seu in Cruciferis plantae radicula laterali et vere rimali.

○ || Notorhizeae, seu in Cruciferis plantae radicula dorsali et cotyledonibus planis.

⊙>> Orthoploceae, seu in Cruciferis plantae radicula dorsali et cotyledonibus spiraliter seu circinatim convolutis.

○ || || || Diplecolobeae, seu in Cruciferis plantae radicula dorsali, et cotyledonibus transverse bis plicatis.

DICOTYLEDONEAE.

ORDO.

RANUNCULACEAE.

TRIBUS.

Clematideae.

1 Clematis Flammula. *Linn. Brot.* — Habitat ad sepes circa *Lagos* et *Monchique* in Algarbiis, Hispania, et alibi in Europa australi, nec non in Algeria ♄ ◡.

2 Clematis Vitalba. *Linn. Brot.* — *Sipó do Reino, ou Vide branca.* — Habitat vulgarissima ad sepes et dumeta Europae mediae, Lusitaniae, Graeciae, et Tauriae ♄ ◡.

3 Clematis integrifolia. *Linn.* — Habitat in Hungaria, Tataria, Sibiria, Pyrenaeis ♃.

4 Clematis campaniflora. *Brot.* — Habitat Lusitaniae ad sepes in Beira ♄ ♃ ◡.

5 Clematis erecta. *D. C.* — Habitat in collibus et sylvis Europae australis ♃.

TRIBUS.

Anemoneae.

6 Thalictrum minus. *Linn.* — Habitat in Europae fere totius pascuis submontosis, et Sibiria ♃.

7 Thalictrum majus. *Murr.* — Habitat in collibus siccis dumosis Helvetiae, Palatinatus, Angliae ♃.

8 Thalictrum medium. *Murr.* — Habitat in collibus Hungariae, Tauriae ♃.

9 Thalictrum flavum. *Linn. Brot.* — *Thalictro ordinario.* — Habitat in Lusitania, Hispania, et alibi Europa, Sibiria, et agro Bizantino ♃.

10 Anemone Pulsatilla. *Linn.* — Habitat in campis sylvestribus collibusque apricis Europae, et Sibiriae ♃.

11 Anemone stellata. *Lam.* — *Anemola róxa estrellada.* — Habitat in sepibus et dümetis Europae ♃.

12 Anemone multifida. *D. C.* — Habitat in America boreali ♃.

13 Anemone palmata. *Linn. Brot.* — Habitat in collibus, ad aggeres Lusitaniae, in Hispania, Algeria ♃.

14 Adonis autumnalis. *Linn.* — *Adonis.* — Habitat inter segetes Europae, etiam in Algeria ①.

TRIBUS.

Ranunculeae.

15 Ranunculus asiaticus. *Linn.* — *Borboletas, ou Flores de quaresma.* — Habitat Oriente ♃.

16 Ranunculus acris. *Linn.* — Colitur in hortis va-

rietas flore pleno — *Botão d'oiro sublime.* — Habitat in pratis Europae ♃.

17 RANUNCULUS REPENS. *Linn. Brot.* — Varietas flore pleno, in hortis frequenter culta, — *Botão d'oiro rasteiro.* — Habitat in locis humidis totius fere Lusitaniae, Hispaniae, et alibi Europae, etiam in Insulis Azoricis, America boreali ♃.

18 RANUNCULUS PHILONOTIS. *Retz.* — Habitat in Europa media et australi ①.

19 RANUNCULUS ARVENSIS. *Linn. Brot.* — Habitat Lusitania, et alibi Europa media et australi, nec non Algeria ①.

20 RANUNCULUS MURICATUS. *Linn. Brot.* — Habitat in fossis, agris humentibus Lusitaniae, Hispaniae, et alibi in tota mediterranea regione, etiam Insulis Azoricis, Algeria ①.

21 RANUNCULUS PARVIFLORUS. *Linn. Brot.* — Habitat in Lusitania, Hispania, et alibi Europa occidentali, australique, etiam Insulis *S. Miguel* et *Terceira*, Algeria ①.

22 RANUNCULUS TRILOBUS. *Desf.* — Habitat in humidis regionibus mediterraneis, etiam Insula *Terceira* prope *Praia da Victoria* ①.

23 FICARIA RANUNCULOIDES. *Moench.* — *Ranunculus Ficaria. Linn. Brot.* — *Celidonia menor.* — Habitat in sepibus, dumetisque totius Europae; Lusitaniae in Beira, Extremadura, et Algarbiis; etiam Algeria ♃.

TRIBUS.

Helleboreae.

24 HELLEBORUS FOETIDUS. *Linn. Brot.* — *Helleboro*

fetido, Herva de Bésteiros, Herva bésteira. — Habitat Europa occidentali; Lusitaniae in Extremadura, Beira, et provinciis borealibus ♃.

25 Nigella Damascena. *Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae inter segetes in Extremadura, et Beira, totaque regione mediterranea ①.

26 Aquilegia vulgaris. *Linn. Brot.* — *Aquilegia, Herva Pombinha.* — Habitat sylvis subumbrosis Europae; Lusitaniae in Beira. et provinciis borealibus, nec non locis editioribus Insulae *Pico* ♃.

27 Delphinium Ajacis. *Linn.* — *Consolda Real, Esporas dos jardins.* — Habitat in Tauria ①.

28 Delphinium grandiflorum. *Linn.* — Habitat in Sibiria ♃.

29 Delphinium Staphysagria. *Linn.* — *Paparraz, Herva Piolheira.* — Habitat in ruderatis Teneriffae, interdum quasi spontanea ad sepes prope Conimbricam occurrit ②.

30 Aconitum Anthora. *Linn.* — Habitat in Pyrenaeis ♃.

31 Aconitum Napellus. *Linn.* — Habitat in Europa ♃.

32 Aconitum lycoctonum. *Linn.* — Habitat in Alpibus, Pyrenaeis ♃.

TRIBUS.

Paeonieae.

33 Paeonia moutan. *Sims.* — *Peonia arborea.* — Habitat in China ♄.

34 Paeonia officinalis. *Retz.* — Habitat Europae sylvaticis montosis ♃.

35 Paeonia Broteroi. *Boiss.* — *Paeonia officinalis. Brot.* — *Peonia*, *Rosa albardeira.* — Habitat in Lusitania, et Hispania ♃.

ORDO.

MAGNOLIACEAE.

TRIBUS.

Wintereae.

36 Illicium Floridanum. *Ellis.* — Habitat in America boreali ♄.

37 Illicium Religiosum. *Sieboldt.* — *Illicium anisatum. Linn. nec Loureiro.* — Habitat in Japonia et China ♄ ♄. — *Illicium anisatum Lour.*, mater *anisi stellati*, stirps botanicis ignota ex Endlichero (Catal. Hort. Acad. Vindob)

TRIBUS.

Magnolieae.

38 Magnolia grandiflora. *Linn.* — *Magnolia.* — Habitat in America boreali ♄.

39 Liriodendron Tulipifera. *Linn.* — *Tulipeiro.* — Habitat Americae borealis locis pinguibus ♄.

ORDO.

ANONACEAE.

40 Anona Cherimolia. *Mill.* — Habitat in Peruvia, et Nova-Granada ♄.

41 Anona squamosa. *Linn.* — Culta in India, verisimile ex America orta ♄.

ORDO.

BERBERIDEAE.

42 Berberis vulgaris. *Linn. Brot.* — *Espinheiro vinheto, Berberis.* — Habitat in Europa, et occurrit quasi spontanea ad sepes in *Portella* prope Conimbricam ♄.

43 Berberis glauca. *D. C.* — Habitat in America meridionali ♄.

44 Nandina Domestica. *Thunb.* — Habitat in Japonia, et China ♄.

45 Mahonia aquifolium. *Nutt.* — *Berberis aquifolium. Pursh.* — Habitat in America boreali, et Asia ♄.

46 Mahonia fascicularis. *D. C.* — *Berberis pinnata. Lag.* — Habitat in Nova-Hispania ♄.

ORDO.

NYMPHAEACEAE.

47 Nymphaea alba. *Linn. Brot.* — *Golfão branco.* — Habitat in aquis stagnantibus aut lente fluentibus ad Tagum, Mundam, et alibi Lusitaniae, sicut tota Europa, et Algeria ♃.

ORDO.

PAPAVERACEAE.

48 Papaver somniferum. *Linn.* — *Dormideiras.* — Habitat in agris Peloponesi, Aegypto, et occurrit quasi spontanea Lusitaniae ad magnum aquaeductum prope Olisiponem, in arenosis circa *Setubal*, et alibi ad pagos. Colitur etiam in hortis varietas flore pleno — *Papoilas d'Hollanda, ou Dormideiras dobradas* ①.

49 Papaver Rhaeas. *Linn. Brot.* — *Papoila ordinaria.* — Habitat inter segetes Europae, Asiae, Americae, et Africae ①.

50 Argemone Mexicana. *Linn.* — Habitat in campestribus montanis Mexici ①.

51 Glaucium flavum. *Crantz.* — *Chelidonium Glaucium. Linn. Brot.* — *Papoila pontuda.* — Habitat in arenosis maritimis Europae australis; Lusitaniae prope *Figueira* et alibi ② ♃.

52 Eschscholtzia Californica. *Cham.* — Habitat in California. — Genus medium inter Nymphaeaceas et Papaveraceas, seu recte Loaseis conforme? (D. C.) ①.

53 Chelidonium majus. *Mill.* — *Celidonia, Herva andorinha.* — Habitat in umbrosis secus muros Europae totius; Lusitaniae quasi spontanea occurrit ♃.

54 Hypecoum procumbens. *Linn. Brot.* — Habitat in agris, praesertim maritimis et sabulosis regionis meditterraneae; Lusitaniae in Algarbiis, et ad Durium ①.

ORDO.

FUMARIACEAE.

55 Fumaria officinalis. *Linn. Brot.* — *Fumaria, Herva molarinha ordinaria.* — Habitat in tota Lusitania, et alibi Europa et Africa boreali ①.

56 Fumaria media. *Lois.* — *Fumaria maior, Herva molarinha maior.* — Habitat in agris, oleraceisque Europae, et Africae borealis; Lusitaniae praesertim in provinciis borealibus ①.

57 Fumaria spicata. *Linn. Brot.* — Habitat inter segetes ad *Arco do carvalhão* prope Olisiponem, et alibi Lusitaniae, Hispaniae, et Africae borealis ①.

ORDO.

CRUCIFERAE.

TRIBUS.

Arabideae. O =

58 Mathiola incana. *R. Br.* — *Cheiranthus incanus. Linn.* — *Goivos encarnados.* — Habitat in maritimis regionis mediterraneae ♄ ♃.

59 Barbarea vulgaris. *R. Br.* — *Erysinum Barbarea. Linn. Brot.* — *Herva de Santa Barbara.* — Habitat frequens prope *Obidos,* et ad Mundam prope Conimbricam; alibi in Europa ♃.

60 Barbarea praecox. *R. Br.* — *Erysinum praecox. Smith.* — Habitat in Anglia ② ♃.

61 Turritis glabra. *Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae circa Herminium, alibi Europae pascuis siccis ②.

62 Cheiranthus Cheiri. *Linn.* — *Goivos amarellos.* — Habitat in muris, tectis, et lapidosis Europae ② ♃.

63 Arabis hirsuta. *Scop.* — *Turritis hirsuta. Linn. Brot.* — Habitat in Europa; Lusitaniae vulgaris ②.

64 Cardamine pratensis. *Linn. Brot.* — Habitat in pratis humidis Europae totius, et Asiae borealis; Lusitaniae in Beira ♃.

65 Nasturtium officinale. *R. Br.* — *Sisymbrium nasturtium. Linn. Brot.* — *Agrião.* — Habitat in rivulis orbis fere totius ① ②.

TRIBUS.

Alyssineae. ○ =

66 Lunaria biennis. *Moench.* — *Lunaria annua. Linn.* — Habitat in Suecia, et Germania ② ③.

67 Alyssum maritimum. *Lam. Brot.* — *Clypeola maritima. Linn.* — Habitat in maritimis Lusitaniae, Hispaniae, Africae borealis, et alibi tota regione mediterranea, Insulis Azoricis ♃.

68 Cochlearia glastifolia. *Linn. Brot.* — Habitat in Lusitania, Hispania, et alibi Europa ①.

69 Cochlearia officinalis. *Linn.*—Habitat in littoribus maritimis Europae septentrionalis ②.

70 Cochlearia armoracia. *Linn.* — *Rabão rustico.* —Habitat in aquosis, submontanis Europae ♃.

TRIBUS.

Thlaspideae. ○ =

71 Iberis umbellata. *Linn.* — *Assembléas.* — Habitat in Italia, Graecia, Hispania ①.

72 Iberis amara. *Linn.*—Habitat in agris Europae; Lusitaniae quasi spontanea occurrit prope *Collares* ①.

TRIBUS.

Sisymbreae. ○ ||

73 Erysimum virgatum. *Roth. Brot.*—Habitat Lusitaniae inter *Céa* et *Sabugueiro;* in arenosis Moguntiae, et alibi Europae ②.

74 Malcomia maritima. *R. Br.*—*Cheiranthus maritimus. Linn.* — *Hesperis maritima. Brot.* — Habitat in arenosis Europae australis, nec non in Africa boreali; Lusitaniae ad littora Tagi salsi prope *Belem*, et alibi ①.

TRIBUS.

Lepidineae. ○ ||

75 Lepidium sativum. *Linn.*—*Mastruço ordinario.*

— Habitat in Persia, et Insula Cypro, in hortis Europae frequenter culta ①.

76 LEPIDIUM LATIFOLIUM. *Linn. Brot.* — *Herva pimenteira maior, Lepidio vulgar.* — Habitat in umbrosis humidis Lusitaniae, Hispaniae, et alibi Europa, Africa boreali ♃.

77 CAPSELLA BURSA-PASTORIS. *Moench.* — *Thlaspi bursa-pastoris. Linn. Brot.* — *Bolsa de pastor.* — Habitat in Europa, Asia, America, Africa; frequens in agris et arvis totius fere Lusitaniae ①.

78 IONOPSIDIUM ACAULE. *Rechb.* — *Cochlearia olisiponensis. Brot.* — *Cochlearia pussilla. Brot. Phyt.* — *Cochlearia acaulis. Desf.!* — Habitat frequens in collibus basalticis *da Ajuda* et *Alcantara* prope Olisiponem, etiam, sed rarius, in calcareis *de Mont'agraço*, et alibi Extremadura ①.

TRIBUS.

Isatideae. ○ ||

79 ISATIS TINCTORIA. *Linn.* — *Pastel dos tintureiros.* — Habitat in Europa australi, et media ②.

TRIBUS.

Brassiceae. ○ >>

80 SINAPIS NIGRA. *Linn.* — *Mostarda preta ou ordinaria.* — Habitat in Europa ①.

81 SINAPIS ALBA. *Linn. Brot.* — *Mostarda branca.*

— Habitat Lusitaniae in Beira; etiam Hispania, et alibi Europa ①.

82 Sinapis arvensis. *Linn. Brot.* — *Eruca arvensis. Noulet.* — Habitat in arvis Lusitaniae, totiusque Europae ①.

83 Brassica oleracea. *Linn.* — *Couve.* — Patria? ②.

84 Brassica adpressa. *Boiss.* — *Hirschfeldia adpressa. Moench.* — *Cordylocarpos pubescens. Sibthp.* — *Sinapis incana. Linn. Brot.* — Habitat frequens in tota fere Lusitania, etiam Hispania, et alibi Europa ②.

85 Eruca sativa. *Lam.* — *Brassica Eruca. Linn. Brot.* — *Eruca.* — Habitat Lusitaniae prope *Péso da Regua*, Transmontana; Hispania, et alibi Europa, nec non Algeria ①.

TRIBUS.

Raphaneae. O>>

86 Crambe maritima. *Linn.* — *Couve das praias.* — Habitat in arenosis maritimis secus Oceanum et Mediterraneum ♃.

87 Raphanus sativus. *Linn.* — *Rabão.* — Varietas minor — *Rabiças.* — Habitat in China, Japonia, et Asia occidentali ① ②.

TRIBUS.

Buniadeae. O || ||

88 Bunias Orientalis. *Linn.* — Habitat in graminosis Transylvaniae, Tauriae, Arabiae felicis, in Russia europeana, Sibiriaque ♃.

TRIBUS.

Senebiereae. ◯ || || ||

89 Senebiera pinnatifida. *D. C.* — *Lepidium didymum. Linn.* — Habitat in ruderatis praesertim maritimis Europae occidentalis, vulgarissima in Insulis Azoricis; etiam in Lusitania a Cl. Valorado et Welwitsch invenita ① ②.

ORDO.

CAPPARIDEAE.

90 Capparis spinosa. *Linn.* — *Alcaparra.* — Habitat in muris et rupestribus Europae australioris, Orientis, et Africae borealis; quasi spontanea in Lusitania australiori occurrit ♄.

ORDO.

RESEDACEAE.

91 Reseda Luteola. *Linn. Brot.* — *Reseda crispata. Link.* — *Lirio dos tintureiros.* — Habitat in Europa, Lusitaniae in Extremadura et Beira frequens, etiam in Africa boreali ① ②.

92 Reseda odorata. *Linn.* — *Resedá de cheiro, ou Minonéte.* — Habitat in Aegypto, et Algeria ①.

93 Reseda purpurascens. *Linn. Brot.* — Habitat

Lusitaniae in glareosis, ad aggeres sabulosos rupesque Extremadurae et Beirae; in Hispania, et Gallia australi ♃.

ORDO.

CISTINEAE.

94 Cistus crispus. *Linn. Brot.* — Habitat in Lusitania, Gallia, Hispania ♄.

95 Cistus albidus. *Linn. Brot.* — *Roselha grande.* — Habitat in Lusitania, Hispania, Gallia, Algeria ♄.

96 Cistus salvifolius. *Linn. Brot.* — Habitat in Lusitania, Helvetia, Gallia australi, Italia, Hispania, et Algeria ♄.

97 Cistus monspeliensis. *Linn. Brot.* — Habitat in Lusitania, Hispania, Gallia australi, Barbaria ♄.

98 Cistus populifolius: *Linn. Brot.* — *Estevão.* — Habitat in Lusitania, Hispania, et alibi Europa australi, Mauritania ♄.

99 Cistus ladaniferus. *Linn. Brot.* — *Esteva.* — Habitat in Lusitania, Hispania, Algeria, et alibi regione mediterranea ♄.

100 Helianthemum Libanotis. *Willd.* — *Cistus Libanotis. Linn. Brot.* — Habitat in Lusitania, Baetica, et Mauritania ♄.

101 Helianthemum guttatum. *Mill.* — *Cistus guttatus. Linn. Brot.* — Habitat tota fere Lusitania, Hispania, Italia, Gallia, Anglia ①.

102 Helianthemum Niloticum. *Pers.* — *Cistus Ni-*

loticus. Linn. — Habitat in Aegypto, Barbaria, Hispania, et Gallia australi ♃.

103 Helianthemum grandiflorum. *D. C.* — Habitat in Alpestribus, Pyrenaeis ♄.

ORDO.

VIOLARIEAE.

104 Viola odorata. *Linn. Brot.* — *Viólas, ou violettas.* — Habitat castanetis *de Monchique* in Algarbiis, in Insulis Azoricis, et alibi Europa, Africa boreali, et Asia ♃.

105 Viola tricolor. *Linn. Brot.* — *Flor Seraphica, Amor perfeito dos floristas, Herva da Trindade.* — Habitat in vineis et inter segetes circa Olisiponem, et alibi Europa, Sibiria, America boreali ① ②.

ORDO.

DROSERACEAE.

106 Drosera rotundifolia. *Linn. Brot.* — *Borella, ou Orvalhinha.* — Habitat in Europa; Lusitaniae in *Gerez* ①.

107 Drosophyllum Lusitanicum. *Link.* — *Drosera Lusitanica. Linn.* — *Spergula droseroides. Brot.* — *Herva pinheira orvalhada.* — Habitat in collibus et arenosis Lusitaniae ad maritima ♃ ♄.

ORDO.

FRANKENIACEAE.

108 Frankenia laevis. *Linn. Brot.* — Habitat in maritimis Europae, Insulis canariensibus, Africa boreali; Lusitaniae ad Tagum et alibi ♃ ♄.

ORDO.

POLYGALEAE.

109 Polygala cordifolia. *Thunb.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

110 Polygala myrtifolia. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

111 Polygala speciosa. *Sims.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

112 Polygala microphylla. *Linn. Brot.* — Habitat in dumetis Lusitaniae borealis ♄.

ORDO.

CARYOPHYLLEAE.

TRIBUS.

Sileneae.

113 Gypsophila Saxifraga. *Linn. Brot.* — Habitat in saxosis Europae australis; Lusitaniae in Dariminia et Transmontana ♃.

114 Dianthus barbatus. *Linn.* — *Mauritanias.* — Habitat in Gallia australi, et Germania ♃.

115 Dianthus capitatus. *D. C.* — *Dianthus atropurpureus. Bieb.* — Habitat in Tauria, et Caucaso ♃.

116 Dianthus polymorphus. *Bieb.* — Habitat in Tauria, et Caucaso ♃.

117 Dianthus campestris. *Bieb.* — Habitat in Tauria ♃.

118 Dianthus corymbosus. *Sibth.* — Habitat in Asia minori ①.

119 Dianthus attenuatus. *Smith.* — *Dianthus Lusitanicus. Brot.* — Habitat in maritimis Hispaniae, Galliae meridionalis; Lusitaniae in Beira et alibi ♃.

120 Dianthus Caryophyllus. *Linn.* — *Cravos ou Cravinas dos jardins.* — Habitat in Gallia meridionali ♃.

121 Dianthus plumarius. *Linn.* — *Cravina, Corôa de Rei.* — Habitat in Europa, America boreali, et Sibiria ♃.

122 Saponaria officinalis. *Linn. Brot.* — *Saboeira legitima.* — Habitat in Europa; Lusitaniae frequens ad Mundam, et alibi in Beira ♃.

123 Cucubalus bacciferus. *Linn.* — *Silene baccifera. Willd. Brot.* — Habitat in umbrosis Lusitaniae, Hispaniae, et alibi Europa ♃.

124 Silene fruticosa. *Linn.* — Habitat in Sicilia ♃.

125 Silene sericea. *All.* — *β. minor. Otth.* — *Silene littorea. Brot.* — Habitat ad Tagum, et in Corsica ①.

126 Silene noctiflora. *Linn.* — Habitat in Suecia, et Germania ①.

127 Silene muscipula. *Linn.* — Habitat in Hispania, et Africa boreali ①.

128 Silene stricta. *Linn. Brot.* — Habitat in His-

pania, Graecia, et Lusitaniae in agris prope *Bemfica* circa Olisiponem ①.

129 SILENE PENDULA. *Linn.* — *β. erectiflora. Oth.* — *Silene scabrifolia. Brot.* — Habitat in regione mediterranea; Lusitaniae ad ripas Mundae ac Durii, trans Tagum, et alibi in Extremadura et Beira ①.

130 SILENE ARMERIA. *Linn.* — Habitat in Anglia, Gallia, et alibi Europa ①.

131 SILENE ITALICA. *D. C.* — *Cucubalus Italicus. Linn.* — Habitat in Italia, et Hungaria ♃.

132 SILENE LUSITANICA. *Linn. Brot.* — Habitat in agris macris, sabulosis, ad vias, frequens circa Conimbricam, Olisiponem, et alibi in Beira et Extremadura; etiam in Hispania, Insulis Azoricis, et Algeria ①.

133 SILENE INFLATA. *Smith.* — *Cucubalus Behen. Linn. Brot.* — *Herva traqueira.* — Habitat frequens tota Lusitania, Hispania, et alibi Europa, Insulis Azoricis, nec non Africa boreali ♃.

134 LYCHNIS CHALCEDONICA. *Linn.* — *Cruz de Malta.* — Habitat circa *Barnaoul*, et in Japonia ♃.

135 LYCHNIS GRANDIFLORA. *Jacq.* — Habitat in China, Japonia ♃.

136 LYCHNIS COELI-ROSA. *Desrouss.* — *Agrostema Coeli-rosa. Linn.* — Habitat in Sicilia, Barbaria, et Oriente ①.

137 LYCHNIS LAETA. *Ait.* — *Lychnis palustris. Brot.* — Habitat Lusitaniae in uliginosis et pratis udis Beirae et Duriminiae, rarius trans Tagum, et Extremadura ①.

138 LYCHNIS CORONARIA. *Lam.* — *Agrostema coronaria. Linn. Brot.* — *Candelarias dos jardins.* — Habitat Lusitaniae ad ima montium circa *Bussaco* et

alibi in Beira boreali, in Hispania, Alpibus, et Tauria ♃.

139 Lychnis Githago. *Lam.* — *Agrostema Githago. Linn. Brot.* — *Githago segetum. Desf.* — *Nigella bastarda.* — Habitat inter segetes frequens in tota fere Lusitania, Hispania, Gallia, et alibi Europa, etiam Africa boreali ♃.

TRIBUS.

Alsineae.

140 Cerastium aquaticum. *Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae mediae et borealis in umbrosis humidis, et alibi Europa ♃.

141 Cerastium vulgatum. *Linn. Brot.* — Habitat in Europae ruderatis, Lusitaniae ubique frequens, etiam in Insulis Azoricis ①.

142 Stellaria media. *Smith.* — *Alsine media. Linn. Brot.* — *Morugem vulgar ou branca, Orelha de rato dos hervolarios.* — Habitat frequens Lusitaniae ad sepes, in cultis et agris; alibi in Europa ①.

143 Stellaria aquatica. *Poll.* — *Stellaria uliginosa. Brot.* — Habitat in paludosis Europae; Lusitaniae in Beira, et provinciis borealibus ①.

144 Arenaria rubra. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa, et Africa; Lusitaniae frequens in arenosis ①.

145 Arenaria emarginata. *Brot.* — Habitat Lusitaniae collibus siccis in Transtagana, et Algarbiis ①.

146 Arenaria Conimbricensis. *Brot.* — Habitat in solo sabuloso prope Conimbricam ①.

147 Sagina procumbens. *Linn. Brot.* — Habitat ad muros et in arvis sabulosis Europae; Lusitaniae frequens ①.

148 SAGINA ERECTA. *Linn. Brot.* — Habitat in sterilibus glareosis Europae; Lusitaniae frequens ①.

ORDO.

MALVACEAE.

TRIBUS.

Malopeae.

149 MALOPE TRIFIDA. *Cav.* — Habitat in pratis Baeticae, et Mauritania ①.

150 KITAIBELIA VITIFOLIA. *Willd.* — Habitat in Slavonia ♃

TRIBUS.

Malveae.

151 LAVATERA OLBIA. *Linn. Brot.* — Habitat in sepibus circa Olbiam, Lusitaniae ad *Azeitão* et in Algarbiis, etiam in Gallia ♄.

152 LAVATERA ARBOREA. *Linn. Brot.* — Habitat in Italia, Hispania, Anglia, Africa boreali, Canariis; Lusitaniae ad Durium, et in Transmontana, sed raro ②.

153 MALVA MAURITIANA. *Linn. Brot.* — Habitat in regione mediterranea; Lusitaniae haud frequens ①.

154 MALVA SYLVESTRIS. *Linn. Brot.* — *Malva syl-*

vestre. — Habitat in Europae campestribus, Lusitaniae ubique fere ②.

155 Malva rotundifolia. *Linn. Brot.* — *Malva redonda.* — Habitat in Europae campestribus; Lusitaniae ubique fere ① ♃.

156 Malva Caroliniana *Linn.* — Habitat in Carolina ♃.

157 Althaea officinalis. *Linn. Brot.* — *Althéa, Malvaisco.* — Habitat in palustribus Europae, praesertim maritimis; Lusitaniae ad Tagum, ad Mundam, et alibi ♃.

158 Althaea cannabina. *Linn.* — Habitat in Gallia australi, Italia, Hungaria ♃.

159 Althaea rosea. *Cav.* — *Alcea rosea. Linn.* — *Malva da India.* — Habitat in Oriente ②.

160 Pavonia praemorsa. *Willd.* — *Hibiscus praemorsus. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Speci ♄.

161 Urena scabriuscula. *D. C.* — Habitat in India, et Napaulia ①.

162 Malvaviscus arboreus. *Cav.* — Habitat in petrosis calcareis Jamaicae, Novae-Granadae, et Mexici ♄.

TRIBUS.

Hibisceae.

163 Abelmoschus officinalis. *Medik.* — *Hibiscus Abelmoschus. Linn.* — Habitat in India, et America meridionali ♄.

164 Abelmoschus Venustus. *Medik.* — Habitat in Java ♄.

165 Hibiscus Manihot. *Linn.* — Habitat in India orientali ♄

166 Hibiscus Rosa-sinensis. *Linn.* — Habitat in India orientali ♄.

167 Hibiscus Syriacus. *Linn.* — Habitat in Syria, Carniolia ♄.

168 Hibiscus bifurcatus. *Cav.* — Habitat in Brasilia, et *Porto Rico* ♄.

169 Hibiscus esculentus. *Linn.* — *Guiabo, Guingombo.* — Habitat in Africa, culta in India, et Brasilia ①.

170 Hibiscus militaris. *Cav.* — Habitat ad ripas fluminum Americae borealis ♃.

171 Hibiscus speciosus. *Ait.* — Habitat in Carolina, et Florida ♃.

172 Hibiscus mutabilis. *Linn.* — *Rosas de S. Francisco.* — Habitat in India orientali ♄.

173 Hibiscus Trionum. *Linn.* — Habitat in Italia, et Carniolia ①.

174 Hibiscus Africanus. *Both.* — *Hibiscus Trionum. Linn. β. cordifolius. Moench.* — Habitat in Africa ①.

175 Hibiscus vesicarius. *Cav.* — Habitat in Africa ①.

176 Gossypium herbaceum. *Linn.* — *Algodoeiro.* — Habitat in Oriente ① ③ ♃.

177 Gossypium arboreum. *Linn.* — Habitat in Indiae arenosis ♄.

TRIBUS.

Sideae.

178 Sida angustifolia. *Lam.* — Habitat in Insula Borbonia ♄.

179 Sida ramosa. *Cav.* — Habitat in Senegal ♄.

180 Abutilon striatum. *Dichs.* — *Sida picta. Hook.* — Habitat in Brasilia ♄.

181 Abutilon Bedfordianum. *Hook.* — Habitat in Brasilia ♄.

182 Abutilon venosum. *Hort.* — Habitat in Brasilia ♄.

ORDO.

STERCULIACEAE.

183 Sterculia platanifolia. *Linn.* — Habitat in China, et Japonia ♄.

ORDO.

BYTTNERIACEAE.

184 Abroma augusta. *Linn.* — Habitat in India ♄.

ORDO.

TILIACEAE.

185 Tilia platyphylla. *Scop.* — *Til, ou Tillia.* — Habitat in Tauria, forsam in Etruria, et Graecia ♄.

186 Corchorus olitorius. *Linn.* — Habitat inter tropicos Asiae, Africae, et Americae ①.

187 Sparmannia Africana. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

188 Grewia Occidentalis. *Linn.*—Habitat in Aethyopia, et ad Cap. B. Spei ♄.

ORDO.

TERNSTROEMIACEAE.

189 Camellia Japonica. *Linn.*—*Camellia, Roseira do Japão.*—Habitat in Japonia ♄.

ORDO.

HYPERICINEAE.

190 Hypericum Olympicum. *Linn.*—Habitat ad montem Olympum, et in China ♄.

191 Hypericum Chinense. *Linn.*—Habitat in India, Japonia, China, et ad Cap. B. Spei ♄.

192 Hypericum calycinum. *Linn.*—Habitat in Oriente ♄.

193 Hypericum Balearicum *Linn.*—Habitat in Insula Majorca ♄.

194 Hypericum perforatum. *Linn. Brot.*—*Hypericão, ou Milfurada.*—Habitat in sepibus, dumetis, collibus sylvaticis, versuris, arvis, pratisque, frequens in tota fere Lusitania, et alibi vulgatissimum ♃.

195 Hypericum tomentosum. *Linn. Brot.*—Habitat Lusitaniae in collibus siccis Extremadurae, et alibi in regione mediterranea ♃.

196 ANDROSAEMUM OFFICINALE. *All.* — Habitat in humidis Europae borealis, Caucasi, et Graeciae ♄.

ORDO.

AURANTIACEAE.

197 CITRUS MEDICA. *Risso.* — *Cidreira, e Zamboeira.* — Habitat in Asia, colitur in Europa et alibi ♄.

198 CITRUS LIMETTA. *Risso.* — *Limeira.* Fructus — *Limas,* et cum maiores et fragantiores — *Vergamottas.* — Habitat in Asia, Europae culta ♄.

199 CITRUS LIMONUM. *Risso.* — *Limoeiro.* — Habitat in Asia, colitur in Europa ♄ ♄.

200 CITRUS AURANTIUM. *Risso.* — *Larangeira, e Larangeira tangeriná.* — Habitat in Asia, colitur in Europa, et alibi ♄.

201 CITRUS VULGARIS. *Risso.* — *Larangëira azeda.* — Habitat in Asia, Europa australi culta ♄.

202 CITRUS DECUMANA. *Linn.* — Habitat in India orientali, Lusitaniae culta ♄.

ORDO.

MELIACEAE.

203 MELIA AZEDARACH. *Linn.* — *Sycomoro bastardo.* — Habitat in Syria, Zeylona ♄.

ORDO.

AMPELIDEAE.

204 Ampelopsis hederacea. *Michx.* — *Hedera quinquefolia. Linn.* — Habitat a Canada ad Virginiam ♄.

205 Ampelopsis bipinnata. *Michx.* — Habitat in Carolina, et Virginea ♄.

206 Vitis vinifera. *Linn.* — *Videira.* — Habitat in Asia, Lusitaniae ut alibi quamplurimae varietates cultae ♄.

207 Vitis laciniosa. *Linn.* — *Videira laciniada.* — Prioris potius varietas ♄.

ORDO.

HIPPOCASTANEAE.

208 Aesculus Hippocastanum. *Linn.* — *Castanheiro da India.* — Habitat in India boreali; ad vias, in ambulacris, et hortis, quamplurimum Lusitaniae et alibi iu Europa culta ♄.

ORDO.

SAPINDACEAE.

209 Cardiospermum Halicacabum. *Linn.* — Habitat in India ①.

ORDO.

ACERINEAE.

210 Negundo fraxinifolium. *Nutt.* — *Acer Negunda. Linn.* — *Bordo com folhas de freixo.* — Habitat in America boreali ♄.

211 Acer Pseudo-Platanus. *Linn. Brot.* — *Platano bastardo.* — Habitat in sylvis Europae; Lusitaniae in *Gerez* ♄.

ORDO.

CORIARIEAE.

212 Coriaria myrtifolia. *Linn.* — Habitat in sepibus et dumetis Europae, et Africae mediterraneae ♄.

ORDO.

GERANIACEAE.

213 Geranium sanguineum. *Linn. Brot.* — *Geranio sanguineo, ou Bico de grou sanguinho.* — Habitat in sylvaticis Europae, Lusitaniae in Extremadura et alibi ♃.

214 Geranium cristatum. *Stev.* — Habitat in Iberia ♃.

215 Geranium columbinum. *Linn. Brot.*—*Bico de pomba maior.*—Habitat in arvis Lusitaniae, et alibi Europa ①.

216 Geranium Carolinianum. *Linn.*—Habitat in arvis Americae borealis ①.

217 Geranium Robertianum. *Linn. Brot.*—*Herva Roberta ou de S. Roberto, Bico de grou Robertino.*—Habitat in rupibus Europae frequens, ad sepes et muros in tota Lusitania ①.

218 Erodium cicutarium. *Leman.*—*Geranium citutarium. Linn. Brot.*—Habitat in Lusitania, ut Europa tota, Africa boreali, et Oriente in ruderatis ①.

219 Erodium moschatum. *Willd.*—*Geranium moschatum. Linn. Brot.*—*Bico de grou ou de cegonha moscado, Agulheira, ou Agulha de pastor moscada.*—Habitat in Lusitania, praesertim australi, et alibi Europa australi ①.

220 Erodium malachoides. *Willd.*—*Geranium malachoides. Linn. Brot.*—Habitat in Europa australi, Africa boreali, et Canariis; Lusitaniae frequens in Beira, et Extremadura ①.

221 Erodium Gussoni. *Tenor.*—Habitat in pratis apricis regni Neapolitani ♃.

222 Pelargonium zonale. *Willd.*—*Geranium zonale. Linn.*—Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

223 Pelargonium inquinans. *Ait.*—*Geranium inquinans. Linn.*—Habitat in Insula St. Helenae, et ad Cap. B. Spei ♄.

224 Pelargonium odoratissimum. *Ait.*—*Malva de cheiro.*—Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

225 Pelargonium cucullatum. *Ait.*—*Geranium cucullatum. Linn.*—Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

226 Pelargonium angulosum. *Ait.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.
227 Pelargonium exstipulatum. *Ait.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.
228 Pelargonium anceps. *Ait.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.
229 Pelargonium triste. *Ait.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.
230 Pelargonium peltatum. *Ait.* — *Geranium peltatum. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.
231 Pelargonium Dennisianum. *Sweet.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.
232 Pelargonium vitifolium. *Ait.* — *Geranium vitifolium. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.
233 Pelargonium capitatum. *Ait.* — *Geranium capitatum. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.
234 Pelargonium graveolens. *Ait.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.
235 Pelargonium glutinosum. *Ait.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

ORDO.

LINEAE.

236 Linum maritimum. *Linn.* — Habitat in Europae australis herbosis maritimis, et in Africa boreali ♃.
237 Linum agreste. *Brot.* — Habitat in Lusitania. An varietas Lini angustifolii Huds.? (Link.), an varietas Lini usitatissimi Linn.? (Brot.) ① ② ③.
238 Linum tenue. *Desf.* — *Linum melianthum.*

Brot. — Habitat in Algeriae collibus; Lusitaniae circa *Thomar*, et in *Serra da Arrabida* (Link.) ①.

239 LINUM TRIGYNUM. *Roxb.* — Habitat in Indiae montibus ♄.

240 LINUM USITATISSIMUM. *Linn.* — *Linho.* — Habitat in arvis Europae; Lusitaniae, praesertim borealis, coluntur nonnullae varietates, vulgo dictae — *Linho da terra, Linho Gallego, Linho Mourisco* ①.

241 LINUM AUSTRIACUM. *Linn.* — Habitat in Austriae collibus ②.

242 LINUM ANGUSTIFOLIUM. *Huds.*—Habitat in pascuis Italiae, Galliae, Angliae ♃.

243 LINUM CATHARTICUM. *Linn. Brot.*—Habitat in Europae pascuis ①.

ORDO.

OXALIDEAE.

244 AVERRHOA BILIMBI. *Linn.* — Habitat in India ♄.

245 OXALIS CORNICULATA. *Linn. Brot.* — Habitat in cultis, et ad sepes, tota fere Lusitania, ut alibi in Europa, Asia, Africa, et America ♃.

246 OXALIS CERNUA. *Thunb.* — Habitat ad Cap. B. Spei, Lusitaniae in hortis frequens et quasi spontanea occurrit ♃.

247 OXALIS SPECIOSA. *Willd.*—Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

248 OXALIS DEPPEI. *Lodd.*—Habitat in Mexico ♃.

ORDO.

BALSAMINEAE.

249 Balsamina hortensis. *Desp.* — *Impatiens Balsamina. Linn.* — *Melindres.* — Habitat in India ①.

ORDO.

TROPAEOLEAE.

250 Tropaeolum majus. *Linn.* — *Chagas, ou Mastruço do Perú.* — Habitat in Peruvia ① ♃.

ORDO.

ZYGOPHYLLEAE.

251 Tribulus terrestris. *Linn. Brot.* — *Abrolho terrestre.* — Habitat in arenosis Lusitaniae, praesertim australioris, et alibi Europa australi, Barbaria, et inter tropicos ①.

252 Melianthus major. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

253 Melianthus minor. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

ORDO.

RUTEAE.

254 Peganum Harmala. *Linn.* — Habitat in Hispania, et Oriente ♃.

255 Ruta montana. *Clus.*—Habitat in siccis, collinis lapidosis Europae australis, et Africae ♃ ♄.

256 Ruta graveolens. *Linn. Brot.* — *Ruda, ou Arruda.* — Habitat in collibus calcareis Lusitaniae, et alibi Europa australi; frequens in hortis ♃ ♄.

ORDO.

DIOSMEAE.

257 Correa alba. *Andr.* — Habitat in Nova-Hollandia ♄.

258 Diosma rubra. *Linn.* — *Alecrim do Norte.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

259 Dictamnus Fraxinella. *Persoon.* — *Dictamnus albus. Linn.* — Habitat in Europa australi ♃.

ORDO.

ZANTHOXYLACEAE.

TRIBUS.

Zanthoxyleae.

260 PTELEA TRIFOLIATA. *Linn.* — Habitat in America boreali ♄.

TRIBUS.

Ailantheae.

261 AILANTHUS GLANDULOSA. *Desf.* — Habitat in China, et Moluccis ♄.

ORDO.

PITTOSPOREAE.

262 BILLARDIERA FUSIFORMIS. *Labill.* — Habitat in Insula *Von Diemen* ♄ ◡.

263 PITTOSPORUM TOBIRA. *Ait.* — *Tobira do Japão.* — Habitat in Japonia ♄.

264 PITTOSPORUM UNDULATUM. *Andr.* — Habitat in Nova-Hollandia ♄ ♄.

ORDO.

CELASTRINEAE.

265 EVONYMUS EUROPAEUS. *Linn.* — Habitat in sepibus Europae ♄.

266 CELASTRUS LUCIDUS. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

ORDO.

RHAMNEAE.

267 RHAMNUS ALATERNUS. *Linn.* — Habitat in Europa australi ♄.

268 RHAMNUS FRANGULA. *Linn. Brot.* — *Frangula, Sanguinho d'agua, Amieiro negro.* — Habitat in humidis, ad sylvas, ad rivulos inter *Semide* et *Lousãa.* et alibi in Lusitania boreali, ut in Europa ♄

269 ZIZYPHUS VULGARIS. *Lam.* — *Ramnus Zizyphus. Linn.* — *Açufeifa maior, Anafega maior, ou Maceira de anafega maior.* — Habitat in Syria, unde in Europam migravit ♄.

270 PALIURUS ACULEATUS. *Lam.* — *Ramnus paliurus. Linn.* — *Paliuro.* — Habitat in Europae mediterraneae sterilibus ♄.

271 CEANOTHUS AMERICANUS. *Linn.* — Habitat in America boreali ♄.

272 CEANOTHUS OVATUS. *Desf.* — Habitat in America boreali ♄.

273 CEANOTHUS AFRICANUS. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

ORDO.

TEREBINTHACEAE.

TRIBUS.

Juglandeae.

274 JUGLANS REGIA. *Linn.* — *Nogueira.* — Habitat in Persia, et regione caspica inter 35°—40° L.; passim per Europam culta, ut in Lusitania ♄.

275 JUGLANS NIGRA. *Linn.* — Habitat in America boreali ♄.

276 PTEROCARYA CAUCASICA, *Kunth.* — *Juglans fraxinifolia. Lamond.* — *Fraxinus laevigata. Hort. Paris.* — Habitat in Caucaso ♄.

TRIBUS.

Cassuvieae.

277 SCHINUS MOLLE. *Linn.* — Habitat in Brasilia ♄.

278 SCHINUS MOLLE. *Linn.* — *Var. Areira.* — Habitat in Brasilia ♄.

279 SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS. *Raddi.* — Habitat in Brasilia, prope *Rio-Janeiro* frequens ♄.

280 RHUS COTINUS. *Linn.* — Habitat Europae australis ab Hispania ad Caucasum in apricis ♄.

281 RHUS CORIAREA. *Linn. Brot.* — *Sumagre.* — Habitat in Europa austr., Lusitaniae in Algarbiis ♄.

282 Rhus glabra. *Linn.* — Habitat in America boreali ♄.

283 Rhus Toxicodendron. *Linn.*—Habitat in America boreali ♄.

284 Rhus pubescens. *Thunb.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

285 Pistacia vera. *Linn.* — Habitat in Syria, unde in Italiam tulit Vitellius, nunc in regione mediterranea tota ♄.

286 Pistacia Lentiscus. *Linn. Brot.* — *Aroeira. ou Almessigueira.*—Habitat in Europa australi, Africa boreali et Oriente; Lusitaniae in collibus, et ad sepes ♄.

287 Pistacia terebinthus. *Linn. Brot.* — *Terebintho, ou Cornalheira.* — Habitat in Europa australi, Africa boreali, et Oriente; Lusitaniae in Transmontana ♄.

288 Mangifera indica. *Linn.* — Habitat in India. Brasiliae valde culta ♄.

ORDO.

LEGUMINOSAE.

TRIBUS.

Sophoreae.

289 Sophora Japonica. *Linn.* — Habitat in Japonia, et China ♄.

290 Edwardsia mycrophylla. *Salisb.* — Habitat in Nova-Zeelandia ♄.

291 Anagyris foetida. *Linn. Brot.* — *Anagyris fedegosa.* — Habitat in collibus apricis Europae australis; Lusitaniae prope *Loulé* et *Tavira* ad sepes ♄.

292 Cladrastis tinctoria. *Raf.* — *Virgilia lutea. Michx.* — Habitat in America boreali ♄.

293 Podalyria sericea. *R. Br.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

TRIBUS.

Loteae.

SUB-TRIBUS.

GENISTEAE.

294 Crotalaria arborescens. *Lam.* — Habitat ad Cap. B. Spei, et in Insulis Mauritianis ♄.

295 Stauracanthus aphyllus. *Link.* — *Ulex genistoides. Brot.* — *Tôjo.* — Habitat Lusitaniae in pinetis sabulosis ♄.

296 Ulex Welwitschianus. *Planchon.* — *Ulex australis. Welw. Fl. exs. nec Clemente.* — *Ulex Europaeus. Brot. nec. Linn.* — *Tôjo.* — Habitat Lusitaniae in provinciis australibus, etiam in Hispania ♃.

297 Spartium junceum. *Linn. Brot.* — *Giesta ordinaria, ou Giesteira dos jardins.* — Habitat in Europa australi, Lusitaniae in collibus calcareis Beirae, Extremaduraeque, etiam Insulis Azoricis, et Algeria ♄.

298 Genista candicans. *Linn.* — *Cytisus candicans. Linn.* — Habitat in Gallia australi, Italia, Oriente ♄.

299 Genista triacantha. *Brot. Phyt.* — *Spartium Lusitanicum. Tournef.* — *Tôjo mollar.* — Habitat syl-

vis et montosis Lusitaniae in Beira, etiam circa *Setubal* in *Maratéca* ♄.

300 Genista falcata. *Brot. Phyt.* — *Genista Spartium Lusitanicum. Tournef.* — *Tójo gadanho.* — Habitat solo raro subumbroso Lusitaniae in Beira et Extremadura ♄.

301 Genista monosperma, *Lam.* — *Genista Spartium monospermum. Linn. Brot.* — *Ractam monospermum. Forsk.* — *Piorno branco.* — Habitat in sterilibus Lusitaniae, Hispaniae, Barbariae, Aegypti ♄ ♄.

302 Genista sphaerocarpa. *Lam.* — *Spartium sphaerocarpon. Linn. Brot.* — *Piorno amarello.* — Habitat Europae australioris, et Barbariae asperis; Lusitaniae in Transtagana ♄.

303 Genista tinctoria. *Linn.* — Habitat frequens in pascuis et sylvulis Europae ♄.

304 Genista tridentata. *Linn. Brot.* — *Carqueja.* — Habitat in collibus incultis et dumetis Lusitaniae, etiam Mauritania ♄.

305 Cytisus albus. *Link.* — *Spartium album. Desf. Brot.* — *Cytisus Lusitanicus. Tournef.* — *Giesteira branca.* — Habitat Lusitaniae in Beira, et in Atlante ♄.

306 Cytisus Laburnum. *Linn.* — *Codeço dos Alpes.* — Habitat in alpinis et subalpinis Europae ♄ ♄.

307 Cytisus mollis. *Willd.* — Patria ignota ♄.

308 Cytisus grandiflorus. *D. C.* — *Spartium grandiflorum. Brot.* — *Giesteira das seves.* — Habitat ad sepes, in montibus sabulosis frigidis, ad rivolorum margines, et locis subumbrosis in Beira, et alibi Lusitania boreali, raro Extremadura ♄.

309 Cytisus scoparius. *Link.* — *Genista scoparia. Lam.* — *Spartium scoparium. Linn.* — Habitat Europae, praesertim occidentalis, in arenosis et sylvaticis ♄.

310 Cytisus argenteus. *Brot. Phyt.* — *Lotus argenteus. Brot.* — Habitat in asperis Lusitaniae, Hispaniae, Galliae australis, Italiae, Mauritaniae ♃ ♄.

311 Adenocarpus Hispanicus. *D. C.* — *Cytisus Hispanicus. Lam. Brot.* — *Codeço alto.* — Habitat in Lusitania boreali, et Hispania ♄.

312 Adenocarpus intermedius. — *Cytisus complicatus. Brot.* — *Spartium complicatum. Linn.* — *Codeço rasteiro.* — Habitat in Lusitania boreali, Hispania, Italia ♄.

313 Anthyllis Babba-Jovis. *Linn.* — Habitat in Hispania, Italia, Barbaria, et Oriente ♄.

314 Anthyllis Vulneraria. *Linn. Brot.* — *Vulneraria.* — Habitat in Europae pratis et pascuis, Lusitaniae frequens Beira et Extremadura; etiam in Mauritania ♃.

315 Ononis Hispanica. *Linn. Brot.* — *Joina dos mattos.* — Habitat secus mediterraneum in arenosis maritimis; Lusitaniae in provinciis australibus ♄.

316 Ononis rotundifolia. *Linn.* — Habitat in Pyrenaeis, et Alpibus ♄.

317 Ononis Cintrana. *Brot. Phyt.* — Habitat ad ima montium *Cintra* et ex *Estoril* ad *Cascaes*, sed raro. Inventa a Cl. J. F. Vallorado ①.

318 Ononis spinosa. *Roth. Brot.* — *Restaboy, Rilhaboy, ou Unhagata.* — Habitat frequens in tota fere Lusitania, et alibi Europa ♃ ♄.

SUB-TRIBUS.

TRIFOLIEAE.

319 Medicago arborea. *Linn.* — *Luserna arborea.* — Habitat in Italia ♄.

320 Medicago sativa. *Linn.* — *Luserna, Melga dos prados.* — Habitat in Hispania. Colitur in pratis Europae ♃.

321 Medicago marina. *Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae in arenosis prope *Figueira, Costa da Trafaria,* et alibi maritimis Europae ♃.

322 Medicago ciliaris *Willd. Brot.* — Habitat in Europa australi; Lusitaniae frequens in arvis, cultis, gramineis, et ad vias ①.

323 Lotus arenarius. *Brot.* — Habitat in arenosis maritimis *Costa da Trafaria* trans Tagum ①.

324 Lotus Jacobaeus. *Linn.* — Habitat in Insula *S. Iago* ♄.

325 Bonjeania recta. *Reichenb.* — *Lotus rectus. Linn. Brot.* — Habitat in Europa australi; ad rivulorum margines in tota fere Lusitania ♃.

326 Trigonella Foenum-graecum. *Linn. Brot.* — *Feno grego, Alforvas, ou Hervinha.* — Habitat in Gallia australi; Lusitaniae inter segetes in Extremadura, et Transtagana ①.

327 Melilotus officinalis. *Willd.* — *Trifolium Melilotus officinalis. Linn. Brot.* — *Meliloto, Trevo de cheiro, ou Corôa de Rei.* — Habitat in Europae campestribus; Lusitaniae in Transtagana, et ad Durium; etiam Mauritania ①.

328 Melilotus Messanensis. *Desf.* — *Trifolium Messanense. Linn.* — Habitat in Barbaria, et Italia ①.

329 Melilotus Indica. *Desv.* — *Trifolium Melilotus Indica. Linn.* — *Anaphe.* — Habitat in India; colitur in Europa cum subsequenti, et inter segetes quasi spontanea occurrit ①.

330 Melilotus Italica. *Lam* — *Trifolium Melilotus Italica. Linn.* — *Anaphe.* — Habitat in Italia, Lu-

sitaniae inter segetes quasi spontanea occurrit; etiam in Mauritania ①.

331 TRIFOLIUM PURPUREUM. *Loisel.* — Habitat in Gallia australi, Italia, Oriente ①.

332 TRIFOLIUM ARVENSE. *Linn. Brot.* — *Pé de lebre.* — Habitat in arvis Europae; Lusitaniae frequens, praesertim Beira et Extremadura ①.

SUB-TRIBUS.

CLITORIEAE.

333 PSORALEA PINNATA. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

334 PSORALEA ACULEATA. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

335 PSORALEA PALAESTINA. *Gouan.* — Habitat in Palaestina, Tauria, per Europam australem disseminata ♃.

336 PSORALEA BITUMINOSA. *Linn. Brot.* — *Trevo betuminoso.* — Habitat in Europae australis apricis, Lusitaniae provinciis australibus; etiam in Madera, et Mauritania ♃ ♄.

337 PSORALEA GLANDULOSA. *Linn.* — Habitat in Chili ♃.

338 INDIGOFERA ANIL. *Linn.* — Habitat in America aequinoxiali, in India culta ♄.

SUB-TRIBUS.

CALEGEAE.

339 DAUBENTONIA TRIPETIANA. *Poir.* — Habitat in *Buenos-Ayres* ♄.

340 Colutea arborescens. *Linn.* — Habitat in Europae australis sepibus et dumetis, etiam in Algeria ♄.

341 Sutherlandia frutescens. *R. Br.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

342 Glycyrrhiza glabra. *Linn.* — *Alcaçuz ordinario, ou Regoliz.* — Habitat in Europa australiori a Lusitania ad Tauriam; Lusitaniae in humidiusculis circa *Torres Vedras*, prope *Vallada*, et alibi ♃.

343 Glycyrrhiza echinata. *Linn.* — Habitat in Apulia, Tataria ♃.

344 Galega officinalis. *Linn.* — Habitat in Europa australi, Tauria, Barbaria ♃.

345 Clianthus puniceus. *Soland.* — Habitat in Nova-Hollandia ♄.

346 Robinia pseudacacia. *Linn.* — Habitat in America boreali ♄.

347 Robinia hispida. *Linn.* — Habitat in America boreali ♄.

348 Amorpha fruticosa. *Linn.* — Habitat in America boreali ♄ ♄.

SUB-TRIBUS.

ASTRAGALEAE.

349 Phaca baetica. *Linn. Brot.* — Habitat in Hispania, Lusitania, et Mauritania ♃.

350 Astragalus hamosus. *Linn.* — Habitat ab. Hispania ad Taurium, in Mauritania; Lusitaniae inter segetes Extremadura, et alibi ①.

351 Astragalus Baeticus. *Linn. Brot.* — Habitat in regione mediterranea; Lusitaniae certe in Algarbiis (Welw.) ①.

352 Astragalus Ponticus. *Pall.* — Habitat in Tauria, et Bessarabia ♃.

353 Bisserrula Pelecinus. *Linn. Brot.* — *Serradella larga.* — Habitat in ruderatis Europae australis, Algeriae, et Orientis; Lusitaniae in agris sabulosis trans Tagum et alibi ①.

TRIBUS.

Hedysareae.

SUB-TRIBUS.

CORONILLEAE.

354 Securigera Coronilla. *D. C.* — *Coronilla securidaca. Linn.* — Habitat in arvis Europae australis ①.

355 Coronilla glauca. *Linn. Brot.* — *Senna do Reino.* — Habitat in Gallia Narbonensi, Sicilia, et Lusitaniae ad sepes, ad rupes, et in calcareis umbrosiusculis circa Olisiponem, Conimbricam, et alibi ♄.

356 Scorpiurus sulcata. *Linn.* — *Scorpiurus echinata. Lam. Brot.* — *Var. sulcata.* — *Cornilhão.* — Habitat in arvis cultis per regionem mediterraneam; Lusitaniae frequens ①.

357 Scorpiurus muricata. *Linn.* — *Scorpiurus echinata. Lam. Brot.* — *Var. muricata.* — *Cornilhão.* — Habitat in arvis cultis per regionem mediterraneam; Lusitaniae frequens ①.

358 Scorpiurus vermiculata. *Linn. Brot.* — *Cornilhão.* — Habitat in arvis cultis per regionem medi-

terraneam; Lusitaniae frequens cum praecedentibus ①.

359 Arthrolodium durum *D. C.* — *Ornithopus heterophyllus. Brot. Phyt.* — Habitat in provinciis borealibus Lusitaniae, et Hispania ① ex Brot. ♃ ex Cav.

360 Ornithopus perpusillus. *Linn.* — *Var. intermedius. Roth.* — *Ornithopus sativus. Brot.* — *Serradella cultivada.* — Habitat in arenosis Europae, Barbariae; Lusitaniae in Beira, et Extremadura, colitur etiam praesertim in provinciis borealibus ①.

361 Ornithopus compressus. *Linn. Brot.* — *Serradella estreita.* — Habitat in arenosis Europae australis et Barbariae; Lusitaniae australis frequens in agris macris ①.

362 Hippocrepis unisiliquosa. *Linn. Brot* — *Ferradurinha, ou Esferra-cavallo.* — Habitat Europae australis, Barbariae, et Orientis apricis lapidosis; Lusitaniae circa Olisiponem, sed raro ①.

SUB-TRIBUS.

EUHEDYSAREAE.

363 Hedysarum coronarium. *Linn.* — Habitat in pratis Italiae, Algeria, valde culta in Malta nomine *Sulla* ♃.

364 Hedysarum canadense. *Linn.* — Habitat in America boreali ♃.

365 Onobrychis sativa. *Lam.* — *Hedysarum onobrychis. Linn.* — *Sanfeno, ou Esparzetta.* — Habitat Europae in collibus cretaceis siccis ♃.

366 Onobrychis caput-galli. *Lam. Brot.* — *Hedysarum Caput-galli. Linn.* — Habitat in Europae australis apricis asperis, et Algeria; Lusitaniae in collibus calcareis circa Olisiponem ♃.

TRIBUS.

Vicieae.

367 Cicer arietinum. *Linn.* — *Grãos de bico, ou Ervanço.* — Habitat in Europa australi, et Oriente. Colitur frequens in agris ①.

368 Faba vulgaris. *Moench.* — *Vicia Faba. Linn.* — *Orobus Faba. Brot.* — *Fava, ou Faveira ordinaria.* — Habitat ad mare Caspium, et in hortis culta ①.

369 Vicia Broteriana. *Ser.* — *Vicia villosa. Brot.* — Habitat inter segetes circa Conimbricam, et alibi in Beira ①.

370 Vicia calcarata. *Desf.* — Habitat in Algeria ①.

371 Vicia sativa. *Linn. Brot.* — *Ervilhaca ordinaria.* — Habitat inter segetes Europae, in Algeria; frequens tota Lusitania ②.

372 Vicia Narbonensis. *Linn. Brot.* — Habitat in Transmontana, et alibi Europa australi ①.

373 Ervum Lens. *Linn.* — *Lentilhas.* — Habitat in arvis, et inter segetes Europae; colitur in hortis ①.

374 Ervum Ervilia. *Linn. Brot.* — *Orobo das Boticas, ou Ervilha de pombo.* — Habitat calcareis inter segetes in Beira, et alibi Europa australi ①.

375 Pisum sativum. *Linn.* — *Ervilha, ou Ervilheira ordinaria.* — Patria ignota, colitur in hortis et agris ①.

376 Lathyrus sativus. *Linn. Brot.* — *Chicharos grossos ou ordinarios.* — Habitat in Hispania, et Algeria; colitur frequens in agris ①.

377 Lathyrus odoratus. *Linn.* — *Ervilhas de cheiro.* — Habitat in Sicilia, et Zeylona ①.

378 Orobus niger. *Linn. Brot.* — Habitat in subalpinis Europae; Lusitaniae in Beira boreali ♃.

TRIBUS.

Phaseoleae.

379 Lupinus albus. *Linn.* — *Tremoço ordinario.* — Habitat in Oriente, colitur in arvis ①.

380 Lupinus varius. *Linn.* — Habitat in Hispania, et Gallia australi ①.

381 Lupinus angustifolius. *Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae in collibus, agris sabulosis Extremadurae et Beirae, etiam in Hispania, et alibi Europa australi, nec non Algeria ①.

382 Lupinus luteus. *Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae in sabulosis, et alibi Europa australi, etiam in Algeria ♃.

383 Abrus precatorius. *Linn.* — Habitat in America, et Africa, sed migratione ab India ♄ ◡.

384 Wisteria Chinensis. *D. C.* — *Glycine Chinensis. Sims.* — Habitat in China ♄ ⌒.

385 Wisteria frutescens. *D C.* — *Glycine frutescens. Linn.* — Habitat in America boreali ♄ ⌒.

386 Lablab vulgaris. *Savi.* — *Dolichos Lablab. Linn.* — *Feijão cutelinho.* — Habitat in India, hortis Lusitaniae valde culta ①.

387 Mucuna pruriens. *D. C.* — *Dolichos pruriens. Linn.* — Habitat in Malabaria ♃ ⌒.

388 Erythrina Corallodendron. *Linn.* — *Arvore do Coral, ou Caralleira vulgar.* — Habitat in Insulis Caribaeis. In viridariis Lusitaniae a longo tempore culta ♄.

389 Erythrina poiantes. *Brot.* — Patria ignota, colitur a longo tempore in Lusitania ♄.

390 Erythrina secundifrora. *Brot.* — Habitat in Brasilia? ♄.

391 Erythrina Crista-galli. *Linn.* — *Coralleira cristada.* — Habitat in Brasilia. In hortis Lusitaniae a longo tempore culta; in *Quinta de Bellas* Comitis *Pombeiro* vetustissimum et magnificum specimen existit ♄.

392 Kennedya rubicunda. *Vent.* — Habitat in Nova-Hollandia ♄ ⌒.

393 Dolichos lignosus. *Linn.* — *Dolichos.* — Habitat in India ♄ ⌒.

394 Dolichos Sinensis. *Linn.* — Habitat in India, et China ① ⌒.

395 Dolichos monachalis. *Brot.* — *Feijão fradinho.* — Colitur in vallibus subhumidis totae fere Lusitaniae. Ex Brotero fortasse varietas D. Sinensis. Linn., seu var. hybrida D. Sinensis et D. Catiang. Linn., ab Asia olim exportatae a Lusitanis ①.

396 Phaseolus Caracalla. *Linn.* — *Caracoleiro.* — Habitat in India ♃ ♄.

TRIBUS.

Mimoseae.

397 MIMOSA SENSITIVA. *Linn.* — *Sensitiva.* — Habitat in Brasilia ♄.

398 MIMOSA PUDICA. *Linn.* — Habitat in Brasilia ①.

399 MIMOSA ASPERATA. *Willd.* — *Mimosa pigra. Linn.* — Habitat in Jamaica, Vera-Cruz, et circa *Demerari* ♄.

400 MIMOSA TRINERVIA. *Hort.*—Patria ignota ♄.

401 DESMANTHUS VIRGATUS. *Willd.* — Habitat in India ♄.

402 ACACIA FALCATA. *Willd.*— Habitat in Nova-Hollandia ♄.

403 ACACIA HETEROPHYLLA. *Willd.* — Habitat in Insula Borbonia ♄.

404 ACACIA VESTITA. *Ker.* — Habitat in Nova-Hollandia ♄.

405 ACACIA LOPHANTA. *Willd.* — Habitat in Nova-Hollandia ♄.

406 ACACIA DEALBATA. *Link.* — Patria ignota ♄.

407 ACACIA EBURNEA. *Willd.*—Habitat in India ♄

408 ACACIA LEUCOCEPHALA. *Link.* — Habitat in America tropica ♄.

409 ACACIA JULIBRISSIN. *Willd.* — *Mimosa Julibrissin. Scop.* — Habitat in Oriente ♄.

410 ACACIA ESTERHAZIA. *Ma. C.* — Habitat in Nova-Hollandia ♄.

411 VACHELIA FARNESIANA. *Wright et Arn.* — *Acacia*

Farnesiana. Willd. — *Mimosa Farnesiana. Linn.* — *Espongeira.* — Habitat in India, Europa valde culta ♄.

TRIBUS.

Caesalpineae.

SUB-TRIBUS.

GEOFFREAE.

412 Andira inermis. *H. B. Kunth.* — *Geoffraea inermis. Swartz.* — Habitat in America centrali ♄.

413 Arachis hypogaea. *Linn.* — *Arachis Asiatica. Lour.* — Habitat in Asia, et migratione in America, Africa, et Europa ①.

SUB-TRIBUS.

CASSIEAE.

414 Tamarindus Indica. *Linn.* — Habitat in India ♄.

415 Schotia speciosa. *Jacq.* — *Schocia escarlate ou do Cabo.* — Habitat in Africa ad *Senegal* et Cap. B. Spei ♄.

416 Gymnocladus Canadensis. *Lam.* — *Guilandina dioica. Linn.* — Habitat in Canada ♄.

417 Caesalpinia Sappan. *Linn.* — Habitat in India ♄.

418 Poinciana pulcherrima. *Linn.* — Habitat in India ♄.

419 Poinciana Gilliesii. *Hook.*—Habitat in America australi ♄.

420 Cercis Siliquastrum. *Linn.* — *Olaia.* — Habitat in Europae australis apricis, et rivorum ripis ♄.

421 Cercis canadensis. *Linn.* — *Olaia do Canadá.* — Habitat in America boreali ♄.

422 Cassia corymbosa. — *Lam.* — Habitat in America australi ♄.

423 Cassia tomentosa. *Lam.* — Habitat in America meridionali ♄.

424 Cassia pubescens. *Jacq.* — Patria ignota ♄.

425 Cassia laevigata. *Willd.* — Habitat in America tropica ♄.

426 Gleditschia Triacanthos. *Linn.* — *Espinheiro do norte.* — Habitat in Virginia, et Carolina ♄.

427 Ceratonia siliqua. *Linn. Brot.* — *Alfarrobeira.* — Habitat in Europa australiori, Mauritania, et Oriente; Lusitaniae in Algarbiis, et *Serra da Arrabida* frequens ♄.

ORDO.

ROSACEAE.

TRIBUS.

Amygdaleae.

428 Amygdalus communis. *Linn.* — Habitat in Mauritaniae sepibus. Coluntur Lusitaniae varietates, *Amara* — *Amendoeira amarga, Dulcis* — *Amendoeira doce. Fragilis,* et *Macrocarpa* ♄.

429 Persica vulgaris. *Mill.* — *Amygdalus Persica. Linn. Pecegueiro.* — Habitat in Persia; colitur in Lusitania, nec non varietas floribus plenis elegantissimis ♄.

430 Armeniaca vulgaris. *Linn* — *Prunus armeniaca. Linn.* — *Damasqueiro, ou Albricoqueiro.* — Habitat in Armenia: colitur in hortis, vineis, pomariis totae fere Lusitaniae ♄.

431 Prunus spinosa. *Linn. Brot.* — *Abrunheiro bravo, ou Ameixieira brava.* — Habitat in collibus apricis Europae, Americae; Lusitaniae frequens in dumetis et sepibus ♄.

432 Prunus domestica. *Linn.* — *Ameixieira mansa, ou Abrunheiro manso.* — Habitat in Europae australioris locis elevatis ♄.

433 Cerasus Padus. *D. C.* — *Prunus Padus. Linn. Brot.* — *Pado, Azereiro dos damnados ou de Traz-os-Montes.* — Habitat in Europa, Asia, America boreali; Lusitaniae in Transmontana, et Beira circa Herminium ♄.

434 Cerasus Lusitanicus. *Loisel.* — *Prunus Lusitanicus. Linn. Brot.* — *Azereiro.* — Habitat Lusitaniae ad *Gerez*, et Herminium; nec non in Pensylvania ♄.

435 Cerasus lauro-cerasus. *Loisel.* — *Prunus Lauro-cerasus. Linn.* — *Azereiro da Turquia.* — Habitat in Trapisunte, unde in Europam venit anno 1574 ♄.

436 Cerasus Duracina. *D. C.* — *Prunus cerasus. Linn.* — *Cerejeira.* — Habitat in Europa australi; Lusitaniae coluntur quamplurimae varietates, quorum fructus vocant — *Cerejas de sacco, pretas, miudas, e de Agosto, Ginjas gallegas, garrafaes, etc.* ♄.

TRIBUS.

Spiraeaceae.

437 Spiraea betulaefolia. *Pall.* — Habitat in Sibiria ♄.

438 Spiraea Ulmaria. *Linn.* — *Herva ulmeira.* — Habitat in pratis Europae; Lusitaniae in Transmontana ♃.

439 Spiraea Filipendula. *Linn. Brot.* — *Filipendula.* — Habitat in pascuis Europae; Lusitaniae circa Herminium, inter *Torres Vedras, Obidos,* et alibi ♃.

440 Keria Japonica. *D. C.* — Habitat in Japonia ♄.

TRIBUS.

Dryadeae.

441 Agrimonia Eupatoria. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa ad margines sylvorum, Algeria, Azoricis, et Madera; Lusitaniae ad sepes, vias, muros circa Olisiponem et alibi ♃.

442 Geum Canadense. *Mur.* — Habitat in America septentrionali ♃.

443 Geum urbanum. *Linn. Brot.* — *Herva benta, Sanamunda, ou Caryophylada.* — Habitat in sepibus Europae; Lusitaniae in castanetis ad *Manteigas* circa Herminium, et alibi ♃.

444 Geum coccineum. *Sibth et Smith.* — Habitat in monte Olympo Bithynico ♃.

445 Potentilla Tormentilla. *Nestl.* — *Tormentilla erecta. Linn. Brot* — *Sete em rama, Tormentilla.*

— Habitat Lusitaniae, et alibi in Europa, nec non Azoricis ♃.

446 POTENTILLA REPTANS. *Linn. Brot.* — *Potentilla, ou Sinco em rama.* — Habitat in Europa, Asia, Mauritania, America boreali, et Azoricis ♃.

447 POTENTILLA ARGENTEA. *Linn.* — Habitat in Europa ♃.

448 POTENTILLA ANSERINA. *Linn.* — Habitat in Europa, America, et Azoricis ♃.

449 POTENTILLA RUPESTRIS. *Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae in rupestribus supra *Melgaço*, et alibi in regionibus montosis Europae, Sibiriaeque ♃.

450 FRAGARIA VESCA. *Linn. Brot.* — *Fragaria, ou Morango.* — Habitat in umbrosis sylvaticis, et apricis montosis Lusitaniae; alibi in Europa, Azoricis, et Mauritania ♃.

451 RUBUS IDAEUS. *Linn.* — *Sylva framboeza, ou Sarça idéa.* — Habitat in Europa ♄.

452 RUBUS FRUTICOSUS. *Linn. Brot.* — *Sylva, ou Sarça.* — Habitat in Europa, Africa boreali; frequens Lusitaniae in collibus, dumetis, nemorosis, sepibusque, nec non in Azoricis ♄.

TRIBUS.

Sanguisorbeae.

453 ALCHEMILLA VULGARIS. *Linn. Brot.* — *Pé de Leão.* — Habitat in sylvis et pascuis Europae; Lusitaniae in montosis umbrosis *Cintra* ♃.

454 POTERIUM SANGUISORBA. *Linn. Brot.* — *Pimpinella menor ou hortense.* — Habitat Europae in pra-

lis asperis, Lusitaniae frequens; etiam in Azoricis ♃.

455 Poterium agrimonifolium. *Cav.* — *Poterium hybridum. Linn. Brot.* — *Agrimonia bastarda.* — Habitat in Hispania, et Lusitania círca Conimbricam ♃.

TRIBUS.

Roseae.

Rosarum Sectio. — Synstylae.

456 Rosa scandens. *Brot.* — Habitat in Beira, et Lusitania boreali. Varietas *Rosae sempervirentis. Linn.?* ♄.

457 Rosa moschata. *Mill.* — *Rosa mosqueta.* — Habitat in agro Tunetano, vel potius Napaulia (D. C.) ♄.

458 Rosa multiflora. *Thunb.* — Habitat in Japonia, et China ♄.

Rosarum Sectio. — Chinenses.

459 Rosa Indica. *Linn.* — Habitat in China. Varietas — *Rosa Indica fragrans. Red.* — *Rosa de chá* ♄.

460 Rosa atro-purpurea. *Brot.* — *Rosa sempreverde.* — Colitur in hortis olisiponensibus ab initio hujus centuriae. Pro varietate *Rosae Indicae sempervirentis Linn.* habetur, ast nondum probatum ♄.

461 Rosa Banksiae. *R. Br.* — Habitat in China ♄ ⌣.

462 Rosa microphylla. *Roxb.* — Habitat in China ♄.

Rosarum Sectio. — Cinnamomeae.

463 Rosa Gallica. *Linn.* — *Rosa franceza.* — Habitat in Europa ♄.

464 Rosa eglanteria. *Linn.* — Patria ignota. Varietas *lutea* — *Rosa amarella* ♄.

Rosarum Sectio. — Caninae.

465 Rosa canina. *Linn. Brot.* — *Rosa de cão, ou Sylva macha.* — Habitat in sepibus et dumetis Lusitaniae borealis, et alibi in Europa ♄.

466 Rosa centifolia. *Linn.* — *Rosa de repolho, Rosa cheirosa de Jericó, Rosa de cem folhas verdadeira.* — Patria ignota ♄.

467 Rosa muscosa. *Ait.* — *Rosa de musgo.* — Patria ignota. Varietas *Rosae centifol.* (Ser. et D. C.) ♄.

468 Rosa Burgundiaca. *Pers.* — *Rosinhas de toucar.* — Patria ignota. *Rosa Burgundiaca* varietas *Rosae centifol. Linn.* (Endich.) ♄.

469 Rosa Damascena. — *Rosa de Damasco.* — Habitat in Syria ♄.

470 Rosa alba. *Linn.* — *Rosa branca.* — Habitat in Europa ♄.

TRIBUS.

Pomaceae.

471 Crataegus Pyracantha. *Pers.* — *Mespilus Py-*

racantha. Linn. — *Espinheiro de Italia.* — Habitat in dumetis Europae australis ♄.

472 CRATAEGUS OXYACANTHA. *Linn. Brot.* — *Pirliteiro, Espinheiro alvar de casca verde, ou Espinheiro ordinario de flor branca.* — Habitat in collibus, et sepibus frequens in tota fere Lusitania, et alibi Europa ♄.

473 CRATAEGUS AZAROLUS. *Linn.* — *Azarola.* — Habitat in Italia, et Gallia ♄.

474 COTONEASTER MICROPHYLLA. *Wallich.* — Habitat in Nepalia ♄.

475 COTONEASTER BUXIFOLIA. *Wallich.* — Habitat in India ♄.

476 MESPILUS GERMANICA. *Linn.* — *Nespereira.* — Habitat in sylvis et dumetis Europae ♄ ♄.

477 AMELANCHIER VULGARIS. *Moench.* — *Mespilus Amelanchier. Linn. Brot.* — Habitat in asperis Europae; Lusitaniae in *Gerez* ♄.

478 PHOTINIA SERRULATA. *Lindl.* — Habitat in China, et Japonia ♄.

479 ERIOBOTRYA JAPONICA. *Lindl.* — *Mespilus Japonica. Thunb.* — *Nespereira do Japão.* — Habitat in Japonia, et China ♄.

480 PYRUS COMMUNIS. *Linn.* — *Pereira.* — Habitat in Europae nemoribus sylvestribus; Lusitaniae quamplurimae varietates coluntur, quarum fructus vocantur — *Peras Flamengas, Bojardas, Carvalhaes, de Refego, Lambe-lhe os dedos, de cheiro, de S. Antonio, de S. Bento, Marquezas, do Conde, do Rei, Virgulosas, de Tres em Prato, Codernes, Pigaças, de Rosa, de Pé curto, de Pé de Perdiz, Bergamotas, Cornicabras, de Rio frio, de Engonxo, Gervasias, Verdeaes, Corrêas, etc.* ♄.

481 Pyrus malus. *Linn.* — *Maceira.* — Habitat in nemoribus Europae; Lusitaniae occurrit spontanea circa Herminium, et in Transmontana, coluntur quamplurimae varietates, quarum fructus vocantur — *Maçãas Leiriôas, Reguengas, Baunezas, Reinetas, e de Neldo, Camoezas, Pêros, Melapios, Repinaldos, Verdeaes, Martingiras, Pipos, etc.* ♄.

482 Pyrus aucuparia. *Gaertn.* — *Sorbus aucuparia. Linn. Brot.* — *Tramazeira, ou Cornogodinho.* — Habitat in Europa; Lusitaniae in subalpinis sylvaticis Herminii, et *Gerez* ♄.

483 Pyrus sorbus *Gaertn.* — *Sorbus domestica. Linn.* — *Sorveira.* — Habitat in montosis sylvaticis versuris Europae ♄.

484 Cydonia vulgaris. *Pers.* — *Pyrus Cydonia. Linn. Brot.* — *Marmeleiro.* — Habitat Europae australis in petrosis et sepibus; Lusitaniae valde cultae varietates — *Maliformis Mill.* seu *Minor Brot.*, cujus fructus vocantur — *Marmellos meudos*, et *Lusitanica Mill.* seu *Maior Lusitanica Brot.*, cujus fructus vocantur — *Gambôas, ou marmellos mollares* ♄.

485 Cydonia Japonica. *Pers.* — *Pereira do Japão.* — Habitat in Japonia ♄.

ORDO.

CALYCANTHEAE.

486 Calycanthus floridus. *Linn.* — *Caneleira.* — Habitat in ripis umbrosis rivulorum Carolinae ♄.

487 Chimonanthus fragrans. *Lindl.* — *Calycanthus praecox. Linn.* — Habitat in Japonia ♄.

ORDO.

MYRTINEAE.

SUB-ORDO.

GRANATEAE.

488 Punica Granatum. *Linn.*—*Romeira.*—Habitat in Mauritania, Lusitaniae quasi spontanea. Coluntur etiam varietates, flore pleno, fructu maiori dulci aut subacido, cortici viridi aut purpureo, et inermis aut subinermis ♄ ♄.

489 Punica nana. *Linn.*—*Romeira anãa.*—Habitat in Insulis Caribaeis, et America calidiori circa *Demerari*. Varietas prioris ex Brotero, et aliis ♄.

SUB-ORDO.

MYRTACEAE.

TRIBUS.

Leptospermeae.

490 Melaleuca pulchella. *R. Br.*—Habitat in Nova-Hollandia ♄.

491 Eucalyptus robusta. *Smith.*—Habitat in Nova-Hollandia ♄.

492 Callistemon lanceolatum. *D. C.*—*Metrosideros lophanthus. Vent.*—Habitat in Nova-Hollandia ♄.

TRIBUS.

Myrteae.

493 Psidium Guajava. *Raddi.* — Habitat in Insulis Caribaeis, et America australi. Raddi et Martius sub hoc nomine conjungunt, ut varietates, *Psidium pomiferum Linn.* — *Araçá-guaçú*, et *Psidium pyriferum. Linn.* — *Guaiába* ♄ ♄.

494 Psidium Araça. *Raddi.* — *Psidium pyriferum. Vell.* — *Araçá-iba, ou Araçá-mirim.* — Habitat circa *Rio-Janeiro* in Brasilia ♄ ♄.

495 Myrtus communis. *Linn.* — *Var. Lusitanica. Linn. Brot.* — *Murta ordinaria.* — Habitat in Europa australi, Lusitaniae frequens in dumetis et sepibus. Colitur etiam in horto varietas *Tarentina* — *Murta dos jardins*, et *Baetica* — *Murta de Hespanha* dicta, nec non varietas flore pleno — *Murta de flor dobrada* ♄.

496 Eugenia uniflora. *Linn.* — *Pitangueira.* — Habitat in Brasilia ♄.

497 Jamboza vulgaris. *D. C.* — *Eugenia Jambos. Linn.* — *Jambo.* — Habitat in India orientali, valde culta in omnibus regionibus intertropicis ♄.

SUB-ORDO.

PHILADELPHEAE.

498 Philadelphus coronarius. *Linn.* — *Sylindra.* — Habitat in Europa australi ♄.

499 Deutzia scabra. *Thunb.* — Habitat in Japonia ♄.

ORDO.

LYTHRARIEAE.

500 Lagerstroemia indica. *Linn.*—Habitat in China, Cochinchina, Japonia, nec in India nisi culta ♄ ♄.

501 Cuphaea Strigillosa. *Lindl.*—Habitat in Mexico ♄.

502 Lythrum hyssopifolia. *Brot.*—*Lythrum meonanthum. Link.* —Habitat in uliginosis, humidis, inundatis totius Europae, etiam in America boreali et australi, Nova-Hollandia, et ad Cap. B. Spei ①.

503 Lythrum Salicaria. *Linn. Brot.*—*Salgueirinha.*—Habitat in humidis Europae totius, Asia occidentali, etiam Nova-Hollandia; Lusitaniae frequens ♃.

ORDO.

ONAGRACEAE.

504 Ludwigia palustris. *Linn.*—Habitat in aquis lente fluentibus Europae, Sibiriae, Persiae ♃.

505 Clarckia pulchella. *Pursh.*—Habitat in California ① ②.

506 Clarckia elegans. *Lindl.*—Habitat in California ①.

507 Epilobium hirsutum. *Linn. Brot.*—Habitat in fossis Europae; Lusitaniae ad ripas fluviorum in provinciis borealibus ♃.

508 Epilobium tetragonum. *Linn. Brot.*—Habitat in inundatis Europae; Lusitaniae in Beira ♃.

509 Oenothera molissima. *Linn.* — Habitat in agris *Buenos-Ayres*, et *Chili* ①.

510 Oenothera rosea. *Ait.*—Habitat in Mexico ♃.

511 Oenothera biennis. *Linn.* — Habitat in Virginia, unde migravit anno 1614, nunc vulgaris in Europa ②.

512 Gaura mutabilis. *Cav* — *Oenothera anomala. Cur.* — Habitat in Nova-Hispania ♃.

513 Fuchsia microphylla. *H. B. et Kunth.*—Habitat in Mexico ♄.

514 Fuchsia coccinea. *Ait.* — *Quelusia.* — Habitat in uliginosis *Chili* usque ad fretum Magellanicum ♄.

515 Fuchsia fulgens. *D. C.*—Habitat in Mexico ♄.

516 Fuchsia corymbiflora. *R. et Pav.* — Habitat in Peruvia ♄.

517 Fuchsia macrostemona. *R. et Pav.* — Var. *Globosa.* — *Brincos de Princeza.* — Habitat in *Chili* ♄.

518 Cercodia erecta. *Murr.* — *Haloragis Cercodia. Ait.* — Habitat in Nova-Zeelandia ♄.

519 Ceratophyllum demersum. *Linn.* — Habitat in fossis et aquis stagnantibus Europae; Lusitaniae ad Mundam, Tagum, et alibi ♃.

ORDO.

PAPAYACEAE.

520 Carica Papaya. *Linn.* — *Mamoeira, ou Mamão* — Habitat in India ♄.

ORDO.

TURNERACEAE.

521 TURNERA ULMIFOLIA. *Linn.* — Habitat in Jamaica ♃.

ORDO.

PASSIFLORACEAE.

522 PASSIFLORA RUBRA. *Linn.* — Habitat in Insulis Caribaeis ♄ ⌒.

523 PASSIFLORA QUADRANGULARIS. *Linn.* — Habitat in America calidiori ♄ ⌒.

524 PASSIFLORA ALATA. *Ait.* — *Murucujá* — Habitat in Peruvia ♄ ⌒.

525 PASSIFLORA INCARNATA. *Linn.* — Habitat in America ♄ ⌒.

526 PASSIFLORA EDULIS. *Sims.* — *Murucujá suspiro.* — Habitat in Brasilia ♄ ⌒.

527 PASSIFLORA PALMATA. *Lodd.* — Habitat in Brasilia ♄ ⌒.

528 PASSIFLORA COERULEA. *Linn.* — *Martyrio, ou Flór da Paixão.* — Habitat in Brasilia, et Peruvia ♄ ⌒.

529 TACSONIA MOLLISSIMA. *H. B. et Kunth.* — Habitat in Quito ♄ ⌒.

ORDO.

LOASEAE.

530 Loasa ambrosiaefolia. *Juss.* — *Var. Hispida.* — *Loasa hispida. Linn.* — Habitat in Peruvia ♃.

ORDO.

CUCURBITACEAE.

531 Momordica Balsamina. *Linn.* — *Balsamina conica ou pequena.* — Habitat in India orientali ①.

532 Momordica Charantia. *Linn.* — *Balsamina longa, ou Caramello.* — Habitat in India ①.

533 Momordica Elaterium. *Linn. Brot.* — *Pepino de S. Gregorio.* — Habitat in Europa australi, Algeria; Lusitaniae in Extremadura, et Beira ① ♃.

534 Cucurbita Pepo. *Linn.* — Habitat in Oriente. Lusitaniae coluntur quamplurimae varietates — *Abobora porqueira, menina, moganga, chila, chilacaiota* ①.

535 Cucurbita Mammeata. *Molina.* — *Abobora mamillar ou terrea.* — Habitat in *Chili* ①.

536 Cucurbita Melopepo. *Linn.* — *Barrete de eleitor ou de Padre, Abobora de coróa.* — Patria ignota ①.

537 Cucurbita verrucosa. *Linn.* — *Cabacinha verrugosa.* — Patria ignota ①.

538 CUCURBITA AURANTIA. *Willd.* — *Abobora laranja.* — Patria ignota ①.

539 CUCURBITA OVIFERA. *Linn.* — *Abobora péra, ou Cabacinha riscada.* — Habitat ad Astrakhan ①.

540 BRYONIA DIOICA. *Brot.* — *Bryonia, Norça branca.* — Habitat ad sepes Lusitaniae ♃.

541 BRYONIA DISSECTA. *Thunb.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

542 LAGENARIA VULGARIS. *Ser.* — *Cucurbita Lagenaria. Linn.* — *Colombro, Cabaço, Abobara de carneiro, Abobara cabaça de vinho.* — Habitat inter tropicos ①.

543 CUCUMIS MELO. *Linn.* — *Melão.* — Habitat in Asia. Coluntur quamplurimae varietates Lusitaniae ①.

544 CUCUMIS DELICIOSUS. *Roth.* — *Melão de cheiro.* — Patria ignota ①.

545 CUCUMIS SATIVUS. — *Linn.* — *Pepino.* — Habitat in Tataria, et India orientali ①.

546 CUCUMIS FLEXUOSUS. *Linn.* — *Melão serpentario.* — Habitat in India orientali? ①

547 CUCUMIS DUDAIM. *Linn.* — Habitat in Persia ①.

548 CUCUMIS AFRICANUS. *Linn.* — *Machichos.* — Habitat ad Cap. B. Spei ②.

549 CUCUMIS CITRULLUS. *Ser.* — *Cucurbita Citrullus. Linn.* — *Melancia.* — Habitat in Africa, et India. Coluntur quamplurimae varietates Lusitaniae, praesertim ad Tagum ①.

550 CUCUMIS COLOCYNTHIS. *Linn.* — *Coloquintidas.* — Habitat in Japonia ①.

551 SECHIUM EDULE. *Swartz.* — *Chayota edulis. Jacq.* — *Caiota, ou Chócho.* — Culta in Madera, et alibi in regionibus tropicis ①.

ORDO.

CACTEAE.

552 Mammillaria simplex. *Haw.* — *Cactus mammillaria. Linn.* — Habitat in Insulis Americae calidioris ♄.

553 Mammillaria coronaria. *Haw.* — *Cactus coronatus. Willd.* — Habitat in Mexico ♄.

554 Melocactus communis. *Link et Otto.* — *Cactus melocactus. Linn.* — Habitat in Insulis Caribaeis. ♄

555 Echinocatus Eyriesii. *Turp.* — *Cereus Eyriesii. Hort. Berol.* — Habitat in *Buenos-Ayres* ♄.

556 Cereus Peruvianus. *Tabern.* — *Cactus Peruvianus. Linn.* — *Cacto do Perú.* — Habitat in Peruvia ♄.

557 Cereus tetragonus. *Haw.* — *Cactus tetragonus. Linn.* — Habitat in America meridionali ♄.

558 Cereus flagelliformis. *Mill.* — *Cactus flagelliformis. Linn.* — *Rabo de macaco.* — Habitat in America calidiori ♄.

559 Cereus grandiflorus. *Mill.* — *Cactus grandiflorus. Linn.* — Habitat in Insulis Caribaeis ♄.

560 Cereus pentagonus. *Linn.* — Habitat in America calidiori ♄.

561 Cereus triangularis. *Haw.* — *Cactus triangularis. Linn.* — Habitat in Insulis Caribaeis, Mexico ♄.

562 Cereus speciosissimus. *Desf.* — Habitat in Mexico ♄.

563 Cereus phyllanthoides. *D. C.* — Habitat in Mexico ♄.

564 Epiphyllum truncatum. *Haw.* — Habitat in Brasilia ♄.

565 Opuntia cylindrica. *D. C.* — *Cactus cylindricus. Lam.* — Habitat in Peruvia ♄.

566 Opuntia Curassavica. *Mill.*— Habitat in *Curaçáo,* et *S. Thomaz* ♄.

567 Opuntia spinosissima. *Mill.* — *Cactus spinosissimus. Lam.* — Habitat in Jamaica ♄.

568 Opuntia Tuna. *Mill.* — Habitat in America meridionali ♄.

569 Opuntia ferox. *Haw.* — *Cactus ferox. Willd.* — Habitat in America calidiori ♄.

570 Opuntia cochinillifera. *Mill.* — *Cactus cochinillifer. Linn.* — *Nopal, Cato da cochenilha.* — Habitat in America tropica ♄.

571 Opuntia Ficus-Indica. *Haw.* — *Cactus Ficus-Indica. Linn.* — Habitat in America meridionali ♄.

572 Opuntia Pseudo-Tuna. *Salm-Dych.* — Habitat in America calidiori ♄.

573 Opuntia crassa. *Haw.* — Habitat in Mexico? ♄.

574 Opuntia vulgaris. *Mill.* — *Cactus Opuntia. Linn.* — *Figueira da India.* — Habitat Americae borealis provinciis australibus, et nunc frequens Europa australiori; Lusitaniae in sepibus macris spontanea fere ubique ♄.

575 Pereskia aculeata. *Mill.* — Habitat in Insulis Caribaeis ♄.

576 Rhipsalis salicornioides. *Haw.* — Habitat in America calidiori ♄.

ORDO.

GROSSULARIEAE.

577 Ribes Uva-crispa. *Linn.* — *Groselheira espinhosa, Uva espim.* — Habitat in Europa, Sibiria ♄.

578 Ribes rubrum. *Linn.* — *Groselheira ordinaria.* — Habitat in sylvis Europae ♄.

579 Ribes aureum. *Pursh.* — Habitat in America boreali ad fluvia Missouri et Columbiam ♄.

ORDO.

FICOIDEAE.

580 Mesembryanthemum depressum. *Haw.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

581 Mesembryanthemum diversifolium. *Haw.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

582 Mesembryanthemum acinaciforme. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

583 Mesembryanthemum uncinatum. *Mill.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

584 Mesembryanthemum glaucum. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

585 Mesembryanthemum tenuifolium. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

586 Mesembryanthemum barbatum. *Curt.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

587 Mesembryanthemum hispidum. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

588 MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM. *Linn.* — *Herva do orvalho.* — Habitat in arenosis maritimis ad Cap. B. Spei, in Canariis, et ad *Athenas.* Lusitaniae quasi spontanea prope Salaciam et ad hortos; in insula *Troya*, ubi a nobis visa fuit, spontanea occurrere videtur ex Welw. ① ②.

589 MESEMBRYANTHEMUM CORDIFOLIUM. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ①.

590 TETRAGONIA EXPANSA. *Ait.* — Habitat in Nova-Zeelandia, et Japonia ①.

ORDO.

TAMARISCINEAE.

591 TAMARIX GALLICA. *Linn. Brot.* — *Tamargueira, ou Tamariz.* — Habitat ad fluviorum ripas, et ad maris littora in Anglia, Gallia, Hispania, Lusitania, ut tota regione mediterranea ♄.

ORDO.

PORTULACEAE.

592 PORTULACA OLERACEA. *Linn.* — *Beldroega.* — Habitat in America australi, Java, nunc culta et spontanea in Europa; Lusitaniae ad ripas Tagi, Mundae, in pratis, et arvis humidis ①.

593 PORTULACA GILLIESII. *Hook.* — Habitat in *Chili* ♃.

594 PORTULACA GRANDIFLORA. *Hook.* — Habitat in *Chili* ♃.

595 Calandrinia grandiflora. *Lindl.* — Habitat in *Chili* ♃.

596 Talinum crassifolium. *Willd.* — Patria ignota ♄.

597 Portulacaria afra. *Jacq.* — *Crassula Portulacaria. Linn.* — *Portulaca fruticosa. Thunb.* — Habitat in Africa australi ♄.

ORDO.

PARONYCHIACEAE.

598 Corrigiola littoralis. *Linn. Brot.* — Habitat in arenosis littoribusque Europae totius, et Mauritaniae ①.

599 Herniaria glabra. *Linn. Brot.* — *Herniaria, ou Herva Turca.* — Habitat in apricis glareosis et campestribus Europae, Sibiriae, Mauritaniae; Lusitaniae in Beira, et provinciis borealibus ♃.

600 Illecebrum verticillatum. *Linn. Brot.* — Habitat in Europae uliginosis, Barbaria; Lusitaniae in Beira, et provinciis borealibus ①.

601 Paronychia argentea. *Lam.* — *Illecebrum Paronychia. Linn. Brot.* — *Herva Prata, Paronychia de Clusio, ou Herva dos unheiros.* — Habitat in siccis asperis Europae australis, et Mauritaniae; Lusitaniae frequens ♃.

ORDO.

CRASSULACEAE.

602 Sedum Telephium. *Linn.* — *Favaria maior,*

ou Herva dos callos. — Habitat in Europae apricis, Lusitaniae in vineis circa Olisiponem ♃.

603 SEDUM RUBENS. *Linn. Brot.* — Habitat in arvis cultis arenosis et apricis Europae mediae et australis; Lusitaniae in Extremadura, raro in provinciis borealibus ①.

604 SEDUM DASYPHYLLUM. *Brot. nec Linn.* — Habitat Lusitaniae, praesertim in provinciis borealibus. Stirps Linnaeana haud obvia in Lusitania (Welw.) ♃.

605 SEDUM ALBUM. *Linn. Brot.* — *Arroz dos telhados, ou Pinhões de rato.* — Habitat ad rupes, saxa, in muris, tectorum tejulis, et alibi frequens Lusitaniae, Europae ♃.

606 SEDUM ACRE. *Linn. Brot.* — *Vermicularia.* — Habitat in siccis, sterilibus Lusitaniae, Europae frequens ♃.

607 SEDUM REFLEXUM. *Linn. Brot.* — Habitat ad sepes et rupes in Lusitania boreali, Europa ♃.

608 SEDUM FRUTICULOSUM. *Brot.* — *Herva pinheira enxuta.* — Habitat in solo macro, sabulosoque Extremadurae, et trans Tagum ad ora maritima *Caparica* ♃.

609 SEMPERVIVUM ARBOREUM. *Linn. Brot.* — *Saião.* — Habitat ad rupes et muros Lusitaniae, Barbariae, Cretae, Zacinthae ♄.

610 SEMPERVIVUM TECTORUM. *Linn.* — Habitat in Europae rupibus, muris, tectis ♃.

611 CRASSULA ARBORESCENS. *Willd.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

612 CRASSULA PORTULACEA. *Lam.* — Habitat ad C. B. Spei ♄.

613 CRASSULA TETRAGONA. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

614 Rochea falcata. *D. C.* — *Crassula falcata. Willd.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

615 Rochea coccinea. *D. C.* — *Crassula coccinea. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

616 Echeveria coccinea. *D. C.* — Habitat in Mexico ♄.

617 Cotyledon ramosissima. *Haw.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

618 Umbilicus hispidus. *D. C.* — *Cotyledon hispida. Lam. Brot.* — Habitat in montosis Hispaniae, Barbariae, et Teneriffae; Lusitaniae prope *Alcantara* ad saxeta et rupes calcareas humidas, ast rarissima ①.

619 Umbilicus pendulinus. *D. C.* — *Cotyledon Umbilicus. Linn. Brot.* — *Conchelos, Sombreirinhos dos telhados, ou Orelha de monge.* — Habitat in lapidosis, rupibus, et muris Europae occidentalis et australis, in Mauritania; Lusitaniae frequentissima ♃.

620 Bryophyllum calycinum. *Salisb.* — *Cotyledon pinnata Lam.* — Habitat in Moluccis, Insulis Mauritiis ♃.

ORDO.

SAXIFRAGACEAE.

621 Saxifraga crassifolia. *Linn.* — Habitat in alpibus Sibiriae ♃.

622 Saxifraga umbrosa. *Linn.* — *Saxifraga spathularis. Brot.* — Habitat in Pyrenaeis, Hibernia; Lusitaniae in Herminio, Gerez, et alibi provinciis borealibus ♃.

623 Saxifraga sarmentosa. *Linn.* — Habitat in China, et Japonia ♃.

624 Saxifraga granulata. *Linn. Brot.* — *Saxifragia branca.* — Habitat *Cintra* ad ima montium, et alibi Lusitania, sicut in collibus sylvaticis Europae totius, et Mauritania ♃.

625 Hydrangea Hortensia. — *D. C.* — *Hortensia, Novêllos da China.* — Habitat in China, Japonia ♄.

626 Escallonia rubra. *Pers.* — Habitat in montibus *Chili* ♄.

ORDO.

UMBELLIFERAE.

TRIBUS.

Hydrocotyleae.

627 Hydrocotyle bonariensis. *Lam.* — Habitat Americae meridionalis maritimis humidis ♃.

TRIBUS.

Saniculeae.

628 Sanicula Europaea. *Linn.* — *Sanicula officinalis. Gouan.* — *Sanicula.* — Habitat in sylvis montosis Europae totius; Lusitaniae in Bussaco, Gerez, Herminio, et alibi provinciis borealibus ♃.

629 Eryngium maritimum. *Linn. Brot.* — Habitat Europae, et Mauritaniae littoribus arenosis; Lusitaniae prope Olisiponem, *Figueira*, et alibi ♃.

630 Eryngium dilatatum. *Lam. Brot.* — Habitat Lusitaniae frequens in collibus calcareis, in Hispania, Mauritania, Etruria, Styria, agro Bysantino ♃.

TRIBUS.

Ammineae.

631 Bupleurum Gerardi. *Jacq.* — *Bupleurum filicaule. Brot.* — Habitat Lusitaniae in calcareis siccis montosis prope Conimbricam, et alibi Europa ①.

632 Bupleurum protractum. *Link.* — *Bupleurum rotundifolium. Brot. nec Linn.* — *Perfolhada.* — Habitat Lusitaniae in Beira et Extremadura, sicut alibi in Europa australi et Africa boreali ①.

633 Bupleurum fruticosum. *Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae ad sepes *Caparica* trans Tagum, et alibi Europa, Mauritania ♄.

634 Apium graveolens. *Linn. Brot.* — *Aipo.* — Habitat ad rivulos, et in humidis praecipue maritimis Lusitaniae, sicut Europae totius, et in Mauritania ♃.

635 Carum carvi. *Linn.* — Habitat in pratis, et pascuis totius Europae ♃.

636 Petroselinum sativum. *Hoffm.* — *Apium petroselinum. Linn.* — *Salsa.* — Habitat in rupestribus umbrosis Sardiniae, Graeciae; Lusitaniae quasi spontanea ♃.

637 Sison sylvaticum. *Brot. Phyt.* — *Physospermum aquilegifolium. Koch.* — Habitat in sylvis um-

brosis et asperis Lusitaniae in Beira, loco *Brejo* et *Bussaco;* etiam in Hispania, Italia, et Tauria ♃.

638 Helosciadium nodiflorum. *Koch.* — *Sison nodiflorum. Brot.* — *Sium nodiflorum. Linn.* — *Rabaças.* — Habitat frequens in fossis, ad rivula Lusitaniae, sicut Europae totius, et in Mauritania ♃.

639 Ammi Visnaga. *Brot.* — *Daucus Visnaga. Linn.* — *Bisnaga das searas, ou Paliteiro.* — Habitat in Europa australi, Asia minori, et Africa boreali; Lusitaniae inter segetes, et alibi ①.

640 Ammi majus *Linn. Brot.* — *Ammeos bastardo, Ammi, Ammio vulgar ou maior.* — Habitat in agris Europae mediae et australis, in Oriente, et Africa boreali ①.

641 Pimpinella Anisum. *Linn.* — *Herva doce.* — Habitat in Aegypto, et Insula *Scio;* colitur in Europa ①.

642 Pimpinella bubonoides. *Brot. Phyt.* — *Tragium Broteri. Spreng.* — Habitat in sabulosis aridis Lusitaniae, Siciliae, Calabriae ♃.

TRIBUS.

Seselineae.

643 Crithmum maritimum. *Linn. Brot.* — *Perrexil. ou Funcho do mar.* — Habitat ad littora Maris nigri, mediterranei, et atlantici; Lusitaniae maxime ex *Buarcos* ad *Cabo da Roca* ♃.

644 Oenanthe pimpinelloides. *Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae ad ima collium in Extremadura, Beira, et alibi Europa, Tauria ♃.

645 Oenanthe apiifolia. *Brot. Phyt.* — *Embude.* — Habitat Lusitaniae ad rivorum margines, et in umbrosis humidis; in Boetica, Corsica ♃.

646 Oenanthe crocata. *Linn.* — Habitat frequens in aquosis, et ad ripas fluviorum Europae mediae, et australis ♃.

647 Oenanthe Phellandrium. *Lam.* — *Phellandrium aquaticum. Linn. Brot.* — *Phelandrio.* — Habitat in aquosis Europae, Tauriae, Sibiriae; Lusitaniae trans Tagum, et in Durimiuia, ast non frequens ②.

648 Seseli pusillum. *Brot. Phyt.* — *Ptychotis verticillata. Duby.* — Habitat in agris Lusitaniae, Siciliae, Boeticae, Corsicae, Sardiniae, Etruriae, Dalmatiae, et in Mauritania ①.

649 Foeniculum vulgare. *Gaertn.* — *Anethum foeniculum. Linn. Brot.* — *Funcho.* — Habitat frequens ad vias, muros, sepes, in saxosis asperis totius fere Lusitaniae, sicut alibi Europa, et Mauritania ②.

650 Foeniculum dulce. *C. Bauh.* — *Anethum Foeniculum dulce. Brot.* — *Funcho doce.* — Habitat in Lusitania, Italia, et alibi ①.

651 Turbith Matthioli. *Tausch.* — *Athamantha Matthioli. Wulf.* — *Athamantha Turbith. Brot.* — *Seseli Turbith. Linn.* — Habitat prope *Cintra*, et in Alpibus ♃.

TRIBUS.

Pachypleureae.

652 Krubera leptophylla. *Hoffm.* — *Tordylium peregrinum. Linn. Brot. Phyt.* — Habitat Lusitaniae inter segetes ex Olisipone usque ad *Cintra*, in His-

pania, et alibi Europa australi, Oriente, Africa boreali, Madera, et Canariis ①.

TRIBUS.

Angeliceae.

653 Angelica lucida. *Linn.*—Habitat in Canada ♃.

654 Angelica sylvestris. *Linn. Brot.* — *Angelica sylvestre.* — Habitat in Europae humidis, Lusitaniae prope *Cintra* ♃.

655 Archangelica officinalis. *Hoffm. et Koch.* — *Angelica Archangelica. Linn.* — Habitat in montosis Europae borealis et mediae ad rivulos ♃.

TRIBUS.

Peucedaneae.

656 Ferula communis. *Linn. Brot.* — *Canafrecha.* — Habitat in collibus apricis regionis mediterraneae a Lusitania ad Graeciam, et in Mauritania ♃.

657 Peucedanum officinale. *Linn. Brot.* — *Funcho de porco, Hervatão porcino, ou Brinça.* — Habitat in pratis humidis et umbrosis Europae; Lusitaniae in provinciis borealibus ♃.

658 Imperatoria ostruthium. *Linn.*—Habitat sylvis Europae frequens, etiam in *Terra-Nova* ♃.

659 Pastinaca sativa. *Linn.* — *Pastinaga, ou Chirivia.* — Habitat in Europae pratis, colitur Lusitaniae ②.

660 Heracleum sphondylium. *Linn. Brot.* — *Ca-*

nabras, Sphondylio, Branca ursina de Allemanha. — Habitat in pratis totius Europae, et forsan Sibiriae; Lusitaniae frequens ②, ♃ (Brot.).

661 Anethum graveolens. *Linn. Brot.* — *Pastinaca anethum. Spreng.* — *Endro maior.* — Habitat inter segetes Europae praesertim australis, in Africa boreali, ad Cap. B. Spei; Lusitaniae frequens ①.

TRIBUS.

Cumineae.

662 Cuminum Cyminum. *Linn.* — *Cominhos.* — Habitat in Hispania, Lusitaniae culta ①.

TRIBUS.

Thapsieae.

663 Thapsia villosa. *Linn. Brot.* — Habitat in collibus et dumetis Lusitaniae, Hispaniae, Galliae australis, Mauritaniae, Cypri ♃.

664 Laserpitium gummiferum. *Desf.* — *Laserpitium thapsiaeforme. Brot. Phyt.* — Habitat solo macro et sabuloso Lusitaniae australis, et in Mauritania ♃.

665 Laserpitium hirsutum. *Lam.* — Habitat in pratis alpium ♃.

TRIBUS.

Daucineae.

666 Daucus carota. *Linn. Brot.* — *Cenoira brava.* — Habitat in collibus exaridis, agris, dumetis, et

ad sepes, vias in tota fere Lusitania, Europa, Mauritania ① ②.

667 Daucus halophilus. *Brot. Phyt.* — Habitat in rupibus, et sterilibus arenosis ad maris littora ex *Ericeira* usque ad *Collares* ②.

TRIBUS.

Scandicineae.

668 Anthriscus Cerefolium. *Hoffm.* — *Scandix cerefolium. Chaerophyllum sativum. Lam.* — *Cerefolio, ou Cerefolho.* — Habitat in arvis et agris Europae ①.

TRIBUS.

Smyrneae.

669 Conium maculatum. *Linn. Brot.* — *Cegude, Cicuta ordinaria, Cicuta maior ou terrestre, Ansarinha malhada.* — Habitat in ruderatis Europae totius, Asiae orientalis; Lusitaniae non frequens ②.

670 Cachrys laevigata. *Lam. Brot.* — Habitat Lusitaniae collibus calcareis Beirae, etiam in Gallia ♃.

671 Cachrys Sicula. *Linn. Brot.* — Habitat in collibus calcareis et basalticis olisiponensibus, et alibi Lusitania, Europa, Mauritania ♃.

672 Smyrnium Olusatrum. *Linn. Brot.* — *Salsa de cavallo.* — Habitat Europae mediae et australis locis humidis; Lusitaniae frequens ② ③.

TRIBUS.

Coriandreae.

673 Coriandrum sativum. *Linn.* — *Coentro.* — Habitat in Tataria, Oriente, Graecia ①.

ORDO.

ARALIACEAE.

674 Cussonia thyrsiflora. *Thunb.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

675 Hedera Helix. *Linn. Brot.* — *Héra.* — Habitat frequens ad sepes, muros, scopulos, arbores parasitice in Lusitania, Europa ♄.

676 Aralia spinosa. *Linn.* — Habitat in America boreali ♄.

ORDO.

CORNEAE.

677 Cornus sanguinea. *Linn. Brot.* — *Sanguinho legitimo.* — Habitat in Europa ♄.

678 Aucuba Japonica. *Thunb.* — Habitat in Japonia ♄.

ORDO.

CAPRIFOLIACEAE.

679 Sambucus Ebulus. *Linn. Brot.* — *Engos.* — Habitat Europae et Caucasi cultis; Lusitaniae in Extremadura, et alibi ♃.

680 Sambucus nigra. *Linn. Brot.* — *Sabugueiro.* — Habitat in Europa, Caucaso, Sibiria; Lusitaniae valde frequens ♄ ♄.

681 Sambucus nigra. *Linn.* — Var. *Laciniata. Smith.* — *Sambucus laciniata. Mill.* — Habitat in Europa ♄ ♄.

682 Viburnum Tinus. *Linn. Brot.* — *Folhado.* — Habitat in sylvaticis montosis Lusitaniae borealis, et alibi Europa australi, Azoricis, Mauritania ♄ ♄.

683 Viburnum Opulus. *Linn.* — *Rosa de Gueldres, Novéllos, ou Sabugueiro d'agua.* — Habitat in sepibus, et dumetis Europae, Caucasi ♄.

684 Viburnum odoratissimum. *Ker.* — Habitat in China ♄.

685 Lonicera Caprifolium. *Linn. Brot.* — *Madresylva caprina.* — Habitat in Europa australi; Lusitaniae valde frequens ad sepes ♄ ⌒.

686 Lonicera Periclymenum. *Linn. Brot.* — *Madresylva das Boticas.* — Habitat ad sepes in tota fere Lusitania, Europa media et australi ♄ ⌒.

687 Lonicera Chinensis. *Wats.* — Habitat in China, Nepalia, Japonia ♄ ⌒.

688 Symphoricarpos vulgaris. *Mich.* — Habitat in America boreali ♄.

689 Symphoricarpos racemosus. *Mich* — Habitat in America boreali ♄.

ORDO.

RUBIACEAE.

690 Bouvardia Jacquini. *Hum.* — Habitat in Mexico ♃.

691 Gardenia florida. *Linn.* — Habitat in China ♄.

692 Coffea arabica. *Linn.* — Habitat in Arabia felici, et Aethiopia ♄.

693 Cephalanthus occidentalis. *Linn* — Habitat in America boreali ♄.

694 Scherardia arvensis. *Linn. Brot.* — Habitat in agris Europae et Tauriae; Lusitaniae inter segetes ①.

695 Vaillantia muralis. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa australi ad muros, in agris; Lusitaniae frequens ①.

696 Galium Mollugo. *Linn. Brot.* — *Solda branca.* — Habitat ad sepes Europae totius; Lusitaniae in provinciis borealibus ♃.

697 Galium rubrum. *Linn.* — Habitat in pratis, dumetisque Europae australis ♃.

698 Rubia tinctorum. *Linn.* — *Granza, ou Ruiva dos tintureiros.* — Habitat in Oriente, Europa australi spontanea ♃.

699 Rubia sylvestris. *Brot.* — *Granza brava.* — Habitat frequens ad sepes totius fere Lusitaniae, etiam in collibus ♃.

700 Crucianella stylosa. *Trin.* — Habitat in Persia ♃.

701 Crucianella maritima. *Linn. Brot.* — Habitat ad littora maritima Lusitaniae, et in tota regione mediterranea ♃ ♄.

ORDO.

VALERIANEAE.

702 Valerianella olitoria. *Moench.* — *Valeriana olitoria. Brot.* — *Alface de cordeiro.* — Habitat in arvis Europae; Lusitaniae in solo raro Beirae ①.

703 Valerianella Marisonii. *D. C.* — Habitat in Europae et Tauriae arvis ①.

704 Centranthus ruber. *D. C.* — *Valeriana rubra. Linn.* — Habitat in ruderatis Europae, colitur passim in hortis, et quasi spontanea in Lusitania occurrit ♃.

705 Centranthus Calcitrapa. *Dufr.* — *Valeriana calcitrapa. Linn. Brot.* — Habitat ad muros et sepes in Lusitania, et alibi Europa mediterranea ①.

706 Valeriana tuberosa. *Linn. Brot.* — Habitat in campestribus Europae australis a Lusitania ad Caucasum; Lusitaniae in collibus prope *Setubal* ♃.

707 Valeriana phu. *Linn.* — *Valeriana branca.* — Habitat in subalpinis Europae ♃.

708 Valeriana officinalis. *Linn.* — Habitat in sylvis depressis humidis totius Europae ♃.

ORDO.

DIPSACEAE.

709 Dipsacus sylvestris. *Brot.* — *Dipsacus fullonum sylvestris. Linn.* — *Cardo penteador bravo.* — Habitat in Europa; Lusitaniae fere ubique ②.

710 Dipsacus fullonum. *Mill.* — *Dipsacus fullonum sativus. Linn.* — *Cardo penteador.* — Habitat in Europa australi spontanea, et culta ① ②.

711 Cephalaria Transsylvanica. *Schrad.* — Habitat in arvis et agris Europae australis ①.

712 Cephalaria leucantha. *Schrad.* — *Scabiosa leucantha. Linn. Brot.* — *Saudades, ou suspiros brancos do monte.* — Habitat in Europa australi, et Oriente; Lusitaniae in *Serra da Arrabida* ♃.

713 Knautia orientalis. *Linn.* — Habitat in Oriente ①.

714 Knautia arvensis. *Coult.* — Habitat in Europae pratis et agris ♃.

715 Scabiosa Cretica. *Linn.* — Habitat in rupibus calcareis Siciliae, et Creta ♄.

716 Scabiosa Atro-purpurea. *Linn.* — *Saudades, ou suspiros rôxos dos jardins.* — Patria ignota, in India spontanea dicitur ① ♃.

717 Scabiosa Succisa. *Linn. Brot.* — *Escabiosa, ou Morso diabolico.* — Habitat in Europa frequens a Lusitania usque ad Caucasum ♃.

ORDO.

COMPOSITAE.

SUB-ORDO.

TUBULIFLORAE.

TRIBUS.

Vernoniaceae.

718 VERNONIA ANTHELMINTHICA. *Willd.* — *Conyza anthelmintica. Linn.* — Habitat in India ①.

719 CENTHRATERUM INTERMEDIUM. *Less.* — *Amphecephis intermedia. Link.* — Habitat in Brasilia ①.

TRIBUS.

Eupatoriaceae.

720 AGERATUM CONYZOIDES. *Linn.* — *Ageratum caeruleum. Desf.* — Habitat in America, Africa, Madera, Ins. Sandwich, et alibi inter tropicos ①.

721 STEVIA SERRATA. *Cav.* — Habitat in Mexico ♃.

722 CONOCLINIUM COELESTINUM. *D. C.* — *Eupatorium coelestinum. Linn.* — Habitat in America boreali ♃.

723 Eupatorium aromaticum. *Linn.* — Habitat in America boreali ♃.

724 Eupatorium ageratoides. *Linn.* — Habitat in America boreali ♃.

725 Eupatorium album. *Linn.* — Habitat in America boreali ♃.

726 Eupatorium cannabinum. *Linn. Brot.* — *Eupatorio de Avicena, Trévo cervino.* — Habitat in fossis et inundatis totius Europae, Persiae, Tauriae; Lusitaniae in provinciis borealibus praesertim ♃.

727 Nardosmia fragrans. *Reichenb.* — *Tussilago fragrans. Willars.* — Habitat in Italia, et Gallia ♃.

728 Petasites vulgaris. *Desf.* — *Tussilago Petasites. Willd.* — *Petasite, Sombreiro.* — Habitat in humidis Europae, et Algeria ♃.

729 Tussilago Farfara. *Linn.* — *Tussilago vulgaris. Lam.* — *Tussilagem, Unha de cavallo ou de asno.* — Habitat in saxosis et argilosis totius Europae, Bysantii, Tauriae, Persiae, in montibus Sibiriae, in India, et China boreali (Lour.); Lusitaniae in Durimінia ex *Christovão dos Reis*, ast non ibi visa a Cl. Brot., nec ab aliis ♃.

TRIBUS.

Asteroideae.

730 Dahlia variabilis. *Desf.* — Habitat in Mexico; circa annum 1790 in hortis Europae introducta, et postea innumeris varietatibus multiplicata ♃.

731 Agathaea amelloides. *D. C* — *Cineraria amelloides. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

732 Aster Lusitanus. *Brot. Phyt.* — *Aster fugax. Brot.* — *Aster alpinus. Poir.* — Var. *fugax.* — Habitat Lusitaniae circa *Montejunto*, et in dumetis ad viam militarem inter sacellum *Ameixoeira* et *Carregado* ♃.

733 Aster adulterinus. *Willd.* — Habitat in America boreali ♃.

734 Aster Alpinus. *Linn.* — Habitat in pratis apricis Pyrenaeorum et Alpium, Sybiriaque ♃.

735 Eurybia argophylla. *Cass.* — Habitat in Nova-Hollandia ♄.

736 Callistephus chinensis. *Nees.* — *Aster chinensis. Linn.* — *Malmequer da Secia ou da China.* — Habitat in China, et Japonia ①.

737 Erigeron acre. *Brot.* — *Erigero acrimonioso.* — Habitat in ruderatis, agris, et ad vias tota fere Lusitania. Ex Cl. Brot. ab *Erigeron acri Linn.* especies diversa, et potius varietas *Erigeron canadensis Linn.* (vide *Flora alimentar e Pharmaceutica de Figueiredo, pag.* 468) ② ♃.

738 Erigeron speciosus. *D. C.* — Habitat in America boreali ♃.

739 Rhynchospermum jasminoides. *Lindl.* — Habitat in *Shanghal* ♄.

740 Bellis annua. *Linn. Brot.* — Habitat frequens in Lusitania, et alibi Europa, Barbaria, Oriente ①.

741 Bellis perennis. *Linn.* — Habitat vulgarissima in pratis et pascuis Europae, et Tauriae; etiam in Madera, sed probabiliter introducta. Colitur in hortis varietas flore pleno — *Margarita dos jardins* ♃.

742 Bellis sylvestris. *Brot.* — Var. *Bellis perennis. Linn.?* — Habitat in collibus calcaribus Lusitaniae ♃.

743 SOLIDAGO ASPERA. *Ait.* — Habitat in America boreali ♃.

744 SOLIDAGO VIRGA-AUREA. *Linn. Brot.* — *Virgaurea verdadeira, Vara d'oiro.* — Habitat in Europa, et Asia boreali; Lusitaniae in Herminio et *Gerez* ♃.

745 SOLIDAGO LIMONIIFOLIA. *Pers.* — *Solidago Mexicana. Linn.* — Habitat in America boreali ♃.

746 SOLIDAGO AZORICA. *Hochst.* — Habitat ad littora marina in Azoricis, praesertim Insula *Flores*, cujus nomen a copia hujus plantae et ejus florum splendore provenire dicitur ♃.

747 CONYZA IVAEFOLIA. *Less.* — *Baccharis ivaefolia. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

748 PHAGNALON SAXATILE. *Cass.* — *Conyza saxàtile. Linn. Brot.* — *Alecrim das paredes, ou Macella da isca.* — Habitat in tota regione mediterranea, etiam in Madera, et Canariis; Lusitaniae ad muros et in rupibus frequens ♃.

749 EVAX PYGMAEA. *Pers. Brot.* — *Filago acaulis. Linn.* — Habitat Lusitaniae in arenosis maritimis, collibus, ad inundata sicca, ad sepes in Beira, etiam prope *Setubal;* omnique regione mediterranea ①.

750 INULA HELENIUM. *Linn.* — *Enula campana.* — Habitat in Anglia, Belgio, Gallia, et Germania ♃.

751 INULA CONYZA. *D. C.* — *Conyza squarrosa. Linn. Brot.* — *Taveda.* — Habitat in tota fere Europa; Lusitaniae in umbrosis et humidis Beirae, Extremadurae, et alibi ①.

752 INULA CRITHMOIDES. *Linn.* — *Inula crithmifolia. Willd. Brot.* — Habitat ad rupes maritimas secus Oceanum et Mediterraneum totum; Lusitaniae in Transtagana et alibi ♄.

753 INULA VISCOSA. *Ait.* — *Erigeron viscosum. Linn.*

— *Solidago viscosa. Lam. Brot.* — *Taveda de Dioscorides.* — Habitat frequens Lusitaniae in ruderatis, collibus, ad vias, ut in tota regione mediterranea, et Teneriffa ♃.

754 PALLENIS SPINOSA. *Cass.* — *Buphthalmum spinosum. Linn. Brot.* — *Pampilho.* — Habitat in Europa australi, Africa boreali, et Canariis; Lusitaniae ad margines agrorum, et in collibus calcareis Beirae, Extremadurae ①.

TRIBUS.

Senecionideae.

755 SILPHIUM TEREBINTHINACEUM. *Linn.* — Habitat in Carolina et Louisiana ♃.

756 VERBESINA SERRATA. *Cav.* — Habitat in Mexico, et Cuba ♃.

757 VERBESINA CROCATA. *Less.* — *Bidens crocata. Cav.* — Habitat in Mexico ♃.

758 SPILANTHES OLERACEA. *Jacq.* — *Pyrethrum Spilanthes. Medic.* — *Bidens fervida. Lam.* — *Agrião do Pará.* — Habitat in America meridionali; cultura vulgaris in Lusitania, Gallia, Italia ①.

759 ZINNIA ELEGANS. *Jacq.* — Habitat in Mexico ①.

760 RUDBECKIA AMPLEXIFOLIA. *Jacq.* — Habitat in Louisiana ♃.

761 CALLIOPSIS TINCTORIA. *D. C.* — *Calliopsis bicolor. Reich.* — *Coreopsis tinctoria. Nutt.* — Habitat in territorio Arkansano ①.

762 HELIANTHUS ANNUUS. *Linn.* — *Gyrasol.* — Habitat in Peruvia, et Mexico; vulgarissima in hortis Europae ①.

763 HELIANTHUS MULTIFLORUS. *Linn.* — *Monte de*

oiro. — Habitat in America boreali; vulgarissima in hortis Europae ♃.

764 HELIANTHUS TUBEROSUS. *Linn.* — *Gyrasol batateiro. Batatas topinambas ou do Brasil.* — Habitat in Brasilia, valde culta in hortis ob tuberes edules ♃.

765 PULICARIA VULGARIS. *Gaert.* — *Inula Pulicaria. Linn. Brot.* — Habitat in locis humidis Lusitaniae, Europae ①.

766 PULICARIA ODORA. *Reich.* — *Inula odora. Linn. Brot.* — *Herva Montãa.* — Habitat frequens Lusitaniae in glareosis montosis, et dumetis prope Olisiponem, et alibi, sicut in tota fere regione mediterranea ♃.

767 BIDENS TRIPARTITA. *Linn. Brot.* — Habitat in fossis et inundatis Europae totius, ad Caucasum, in Sibiria, et Dahuria; Lusitaniae praesertim in provinciis borealibus ①.

768 BIDENS COREOPSIDIS. *D. C.* — *Coreopsis ferulaefolia. Jacq.* — Habitat in Jamaica ♃.

769 TAGETES LUCIDA. *Cav.* — Habitat in Mexico ①.

770 TAGETES PATULA. *Linn.* — *Cravos de Tunes.* — Habitat in Mexico ①.

771 TAGETES ERECTA. *Linn.* — *Cravos de defunto.* — Habitat in Mexico ①.

772 GAILLARDIA DRUMMONDI. *D. C.* — Habitat in Mexico ①.

773 GAILLARDIA LANCEOLATA. *Mich.* — *Gaillardia bicolor. Ell.* — Habitat in America boreali ♃.

774 HELENIUM QUADRIDENTATUM. *Labil.* — *Gyrasolzinho de Allemanha.* — Habitat in Mexico, et America boreali ①.

775 ANTHEMIS AUREA. *Brot.* — *Macella doirada.* — Habitat iu *Gerez*, et ad Durium ① ②.

776 ANTHEMIS NOBILIS. *Linn.* — Habitat in pratis, et arvis siccis Europae, praesertim australioris ♃.

777 LEPIDOPHORUM REPANDUM. *Neck.* — *Anthemis repanda. Linn. Brot. Phyt.* — *Chrysanthemum Lusitanicum ageratifolio. Tourn.* — *Macella espatulada (Figueiredo).* — Habitat Lusitaniae in dumetis, montosis, sabulosisque circa Conimbricam, in *Caparica* trans Tagum, et alibi ① ②.

778 ANACYCLUS RADIATUS. *Lois.* — *Anthemis valentina. Linn. Brot.* — *Pãoposto.* — Habitat in agris et arvis Lusitaniae, Hispaniae, et Galliae australis, etiam in Mauritania ①.

779 ANACYCLUS AUREUS. *Linn Brot.* — *Anthemis aurea. D. C.* — *Macella gallega ordinaria ou maior.* — Habitat in Europa australi, Oriente, etiam Azoricis; Lusitaniae ubique fere ♃.

780 ANACYCLUS PYRETHRUM. *D. C.* — *Anthemis Pyrethrum.* — Habitat in Barbaria, Arabia, Syria ♃.

781 XANTHIUM STRUMARIUM. *Linn. Brot.* — *Bardana menor.* — Habitat ad vias, agros, vineas, rudera totius Europae, in Sibiria, Africa boreali; Lusitaniae prope *Caldas*, ad Tagum, et alibi ①.

782 XANTHIUM SPINOSUM. *Linn. Brot.* — Habitat ad vias et agros Europae, Barbariae; Lusitaniae prope Olisiponem, et alibi ①.

783 FRANZERIA ARTEMISIOIDES. *Willd.* — *Xanthium fructicosum. Linn.* — Habitat in Peruvia ♄.

784 PTARMICA MACROPHYLLA. *D. C.* — *Achillea macrophylla. Linn.* — Habitat in Alpibus ♃.

785 ACHILLEA MILLEFOLIUM. *Linn. Brot.* — *Millefolio.* — Habitat in pratis et pascuis totius Europae, et Asiae borealis; Lusitaniae prope *Gerez* et Herminium, inter *Lamego* et *Vizeu* ♃.

786 ACHILLEA TOMENTOSA. *Linn.* — Habitat in apricis siccis sterilibus Hispaniae, et alibi in Europa australi ♃.

787 ACHILLEA FILIPENDULINA. *Lam.* — Habitat in Caucaso ♃.

788 ACHILLEA PECTINATA. *Willd.* — Habitat in arenosis Hungariae, Podoliae, Tauriae, Caucasi ♃.

789 ACHILLEA AGERATUM. *Linn. Brot.* — *Macella de S. João, Agerato, Eupatorio de Mesué, Herva de S. João de Grisley* — Habitat Lusitaniae, Hispaniae, Italiae, Galliae australis, et insulis mediterraneis, in apricis humidiusculis ♃.

790 ACHILLEA ASPLENIFOLIA. *Vent.* — Patria non satis nota ♃.

791 ACHILLEA TOURNEFORTII. *D. C.* — *Achillea Aegyptiaca. Linn.* — Habitat in Graecia, nec in Aegypto ♃.

792 MARUTA FUSCATA. *Cass.* — *Anthemis fuscata. Brot. Phyt.* — *Anthemis praecox. Link.* — *Margaça fusca, Margaça do inverno.* — Habitat in arvis Lusitaniae, et alibi regione mediterranea ①.

793 DIOTIS CANDIDISSIMA. *Desf.* — *Santolina maritima. Brot.* — *Athanasia maritima. Linn.* — *Otanthus maritimus. Link.* — Habitat in maritimis Europae, Africae, et Asiae; Lusitaniae ad *Figueira, Aveiro, Vianna,* et alibi ♃.

794 SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS. *Linn.* — *Abrotano femea.* — Habitat frequens in Europa australi ♄.

795 SANTOLINA ROSMARINIFOLIA. *Mill. Brot.* — Habitat Lusitaniae prope *Setubal,* et alibi in Europa australi ♄.

796 MATRICARIA CHAMOMILLA. *Linn. Brot.* — *Cha-*

momilla, Margaça das Boticas. Macella gallega legitima de Grisley. — Habitat in Europa; Lusitaniae inter segetes *Alcantara,* et alibi prope Olisiponem, sed raro ①.

797 Pyrethrum Parthenium. *Smith.* — *Matricaria parthenium. Linn.* — *Matricaria, Artemisia bastarda dos herbolarios.* — Habitat in Europa; Lusitaniae fere spontanea prope pagos in provinciis borealibus ♃.

798 Pyrethrum Myconis. *Moench.* — *Chrysanthemum Myconis. Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae frequens inter segetes, et alibi in tota fere regione mediterranea, etiam in Azoricis ①.

799 Pyrethrum Indicum. *Cass.* — *Chrysanthemum Indicum. Linn.* — Habitat in China, et India ♄.

800 Pyrethrum Sinense. *D. C.* — *Chrysanthemum sinense. Sabine.* — *Despedidas de verão.* — Habitat in Japonia ♄.

801 Chrysanthemum segetum. *Linn. Brot.* — *Pampilho das searas.* — Habitat in Europa, Africa boreali; Lusitaniae fere ubique ①.

802 Chrysanthemum coronarium. *Linn. Brot.* — *Malmequer, Pampilho ordinario.* — Habitat Europae australis in arvis et segetibus, in Mauritania; Lusitaniae prope Olisiponem et alibi frequens ①.

803 Leucanthemum vulgare. *Lam.* — *Chrysanthemum Leucanthemum. Linn. Brot.* — *Margarita maior, Bemmequer, Olho de boi dos hervolarios.* — Habitat in Europa; Lusitaniae in umbrosis sylvaticis ad *Cintra* et alibi ♃.

804 Leucanthemum latifolium. *D. C.* — Var. *Lacustre.* — *Chrysanthemum lacustre. Brot.* — Habitat Lusitaniae ad *Lagôa de Obidos* ♃.

805 DIMORPHOTHECA FRUTICOSA. *D. C.* — *Calendula fruticosa. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

806 LONAS INODORA. *Gaertner.* — *Athanasia annua. Linn.* — *Achillea inodora. Linn.* — Habitat in Mauritania, et Sicilia ①.

807 ARTEMISIA DRACUNCULUS. *Linn.* — *Estragão.* — Habitat in Russia et Sibiria ♃.

808 ARTEMISIA VULGARIS. *Linn. Brot.* — *Artemisia verdadeira.* — Habitat in campestribus Europae, Africae borealis, Orientis, Sibiriae; Lusitaniae in provinciis borealibus ♃.

809 ARTEMISIA ARBORESCENS. *Linn.* — *Absinthium arborescens. Lob. Brot.* — *Losna menor ou do Algarve.* — Habitat in Italia, Oriente, Mauritania; Lusitaniae in Algarbiis ♄.

810 ARTEMISIA MOLLIS. *Gay?* — *Herva das sezões.* — Verae artemisiae mollis patria ignota ♃.

811 ARTEMISIA ABSYNTHIUM. *Linn.* — *Absinthium officinale. Brot.* — *Losna maior de Dioscorides, Absinthio vulgar.* — Habitat in Europa, Sibiria, Mauritania, America boreali; Lusitaniae ad Durium ♃ ♄.

812 ARTEMISIA PALMATA. *Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae in Algarbiis, et in Transtagana ♃.

813 TANACETUM VULGARE. *Linn. Brot.* — *Tanaceto, Athanasia das boticas.* — Habitat in Europa et Tauria; Lusitaniae in *Serra do Marão*, in Transtagana ad pagos ♃.

814 TANACETUM SIBIRICUM. *Linn.* — Habitat in Sibiria, et Dahuria ad limites Chinae ♃.

815 SOLIVA LUSITANICA. — *Hippia stolonifera. Brot. Phyt.* — Habitat frequens in humescentibus ad vias circa Olisiponem, et alibi in Lusitania ①.

816 Kleinia ficoides. *Haw.* — *Cacalia ficoides. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

817 Kleinia Anteuphorbium. *D. C.* — *Cacalia Anteuphorbium. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

818 Emilia sagittata. *D. C.* — *Cacalia sagittata. Vahl.* — Habitat in India, et Philippinis ①.

819 Emilia sonchifolia. *D. C.* — *Cacalia sonchifolia. Linn.* — Habitat in India, China, Timor ①.

820 Senecio vulgaris. *Linn. Brot.* — *Tasneirinha, ou Cardo morto.* — Habitat in cultis regionum extratropicarum totius orbis; Lusitaniae vulgarissima ①.

821 Senecio Jacobaea. *Linn. Brot.* — *Tasna, Tasneira.* — Habitat frequens in Lusitania, ut alibi in Europa, et Sibiria ♃.

822 Senecio Cineraria. *D. C.* — *Cineraria maritima. Linn.* — Habitat in rupestribus regionis mediterraneae ♄ ♃.

823 Senecio elegans. *Linn.* — *Não me deixes dos floristas.* — Habitat ad Cap. B. Spei ①.

824 Senecio solidagineus. *Spreng.* — *Senecio populifolius. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

825 Senecio mikanoides. *Otto.* — *Delairia odorata. Lemaire.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

826 Doronicum Pardalianches. *Linn. Brot.* — *Doronico.* — Habitat in sylvis montanis Europae, in cacumine Atlantis; Lusitaniae in Gerez ♃.

827 Arnica montana. *Linn. Brot.* — *Arnica.* — Habitat in pratis sylvestribus frigidioribus Europae; Lusitaniae prope Conimbricam ad *S. Martinho*, in Extremadura, et trans Tagum ♃.

828 Filago Gallica. *Linn.* — Habitat in agris argilosis et arvis arenosis Europae fere totius, Made-

iae, Teneriffae; Lusitaniae prope *Alcantara*, et alibi, praesertim in provinciis borealibus ①.

829 Gnaphalium luteo-album. *Linn.*—Habitat in arenosis sterilibus et udis totius fere orbis; Lusitaniae ad ripas Mundae, et provinciis borealibus ①.

830 Helichrysum Stoechas. *D. C.* — *Gnaphalium Stoechas. Linn. Brot.* — *Perpetuas das arêas.* — Habitat in arenosis aridis et rupestribus maritimis Europae, et in omnia regione mediterranea; Lusitaniae frequens ♄.

831 Helichrysum orientale. *Tourn.*—*Gnafalium orientale. Linn.* — *Perpetuas amarellas dos floristas ou dos jardins.* — Habitat in Insula Creta, vulgaris per culturam in Lusitaniae hortis ♃.

832 Helipterum eximium. *D. C.* — *Gnaphalium eximium. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

TRIBUS.

Cynareae.

833 Calendula officinalis. *Linn.* — *Maravilhas.* — Habitat in arvis Europae australis ①.

834 Calendula arvensis. *Linn. Brot.* — *Herva vaqueira.* — Habitat in arvis Europae, Mauritaniae, in Madera, et Canariis; Lusitaniae fere ubique ①.

835 Osteospermum moniliferum. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

836 Arctotis acaulis. *Lam. Brot.* — Habitat ad Cap. B. Spei; Lusitaniae spontanea prope *Setubal* ♃.

837 Gazania rigens. *R. Br.* — *Gorteria rigens. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

838 Echinops persicus. *Stev. et Fisch.* — Habitat in Caucaso ♃.

839 Echinops strigocus. *Linn. Brot.* — *Cardo da isca.* — Habitat in arvis, et segetibus Lusitaniae, Hispaniae, et Barbariae ①.

840 Chardinia xeranthemoides. *Desf.* — *Xeranthemum annuum. Linn. Brot.* — *Saudades perpetuas.* — Habitat in Armenia, Persia, Syria ①.

841 Staehelina dubia. *Linn.* — *Serratula dubia. Brot.* — Habitat in apricis sterilibus Lusitaniae, Hispaniae, Galliae australis, et Italiae ♄.

842 Carlina gummifera. *Less.* — *Chamaeleon gummifer. Cass.* — *Atractylis gummifera. Linn.* — *Carlina bastarda, Chameleão branco, ou Cardo do visgo.* — Habitat Lusitaniae in collibus calcareis prope Olisiponem et alibi, ut in tota fere regione mediterranea ♃.

843 Onopordon illyricum. *Linn.* — Habitat in ruderatis Illirici ②.

844 Carduus acanthoides. *Linn.* — Habitat in ruderatis Europae totius, et Tauriae; Lusitaniae frequens ②.

845 Cinara Scolymus. *Linn.* — *Alcachofra hortense.* — Patria ignota. In hortis valde culta ob receptacula carnosa edulia ♃.

846 Cinara cardunculus. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa australi, et Mauritania; Lusitaniae prope Olisiponem, in Transtagana, et alibi frequens ♃.

847 Chamaepeuce stellata. *D. C.* — *Carduus stellatus. Linn.* — Habitat in arvis Italiae ①.

848 Chamaepeuce Casabonae. *D. C.* — *Carduus casabonae. Linn.* — Habitat in sterilibus insulae Ilvensis, et circa Olbiam ②.

849 Cirsium palustre. *Scop.* — *Cnicus pallustris. Willd. Brot.* — *Carduus palustris. Linn.* — Habitat in pratis paludosis Europae totius et Sibiriae; Lusitaniae in Beira ♃.

850 Lappa major. *Gaertn.* — *Arctium lappa. Linn. Brot.* — *Bardana maior, Bardana ordinaria.* — Habitat in Lusitania praesertim boreali, ut in tota Europa, et in India ②.

851 Notobasis syriaca. *Cass.* — *Cnicus syriacus. Willd. Brot.* — *Carduus syriacus. Linn.* — Habitat in arvis regionis mediterraneae, in Madera ①.

852 Rhaponticum pulchrum. *Fisch.* — Habitat in Caucaso ♃.

853 Serratula tinctoria. *Linn. Brot.* — Habitat in pratis et sepibus Europae totius; Lusitaniae prope *Lousã* et *Miranda do Corvo* ♃.

854 Microlonchus Salmanticus. *D. C.* — *Centaurea Salmantica. Linn. Brot.* — Habitat frequens circa Olisiponem, et alibi in Lusitania, Europa australi, Mauritania ♃.

855 Centaurea Tagana. *Brot. Phyt.* — *Rhapontico bastardo, ou Rhapontico da terra.* — Habitat in Lusitania ad Tagum et alibi, in sabulosis et dumetis aridis; etiam in Hispania, Mauritania ♃.

856 Centaurea Cyanus. *Linn.* — *Loios, ou Fidalguinhos dos jardins.* — Habitat inter segetes Europae fere totius ①.

857 Centaurea pullata. *Linn. Brot.* — *Cardinho das almorreimas.* — Habitat in arvis apricis regionis mediterraneae; Lusitaniae circa Olisiponem, et alibi ♃.

858 Centaurea calocephala. *D. C.* — *Centaurea atro-purpurea. Spreng.* — Habitat in rupibus Europae orientalis ♃.

859 CENTAUREA RAGUSINA. *Linn.* — Habitat in Dalmatia, Ragusa ♃.

860 CENTAUREA CALCITRAPA. *Linn. Brot.* — *Cardo estrellado, ou Calcatripa.* — Habitat in Europa australi, Tauria, Mauritania; Lusitaniae circa Olisiponem et alibi ①.

861 CENTAUREA SEMPERVIRENS. *Linn. Brot.* — *Lavapé, Viomal.* — Habitat in montosis calcareis Lusitaniae, Hispaniae, Italiae ♄.

862 CENTAREA AUSTRIACA *Willd.* — Habitat in pratis montosis Austriae, Hungariae, et Italiae ♃.

863 CENTAUREA AMERICANA. *Nutt.* — Habitat in Americae borealis locis graminosis inundatis ♃.

864 CENTAUREA CROCODYLIUM. *Linn.* — Habitat in Syria, et Creta ①.

865 CNICUS BENEDICTUS. *Linn.* — *Centaurea benedicta. Linn. Brot.* — *Cardo Santo.* — Habitat in lapidosis et cultis Greciae, Orientis, et Tauriae; Lusitaniae prope Conimbricam in montibus *de Arregaça* ①.

866 CARTHAMUS TINCTORIUS. *Linn.* — *Açafrôa.* — Habitat in India, unde per culturam aliis regionibus Asiae, Africae et Europae propagata ①.

867 KENTROPHYLLUM TAURICUM. *Fisch.* — *Carthamus creticus. Linn.* — Habitat in Creta, Tauria, Persia ①.

868 CARDUNCELLUS CAERULEUS. *Adans.* — *Carthamus caeruleus. Linn.* — *Carduus coeruleus. Brot.* — Habitat in Lusitania prope *Alcantara* et alibi, in Hispania, Corsica, Graecia, et Barbarea ♃.

869 SILYBUM MARIANUM. *Gaertn.* — *Carduus Marianus. Linn. Brot.* — *Cardo de Santa Maria, ou Cardo leiteiro.* — Habitat in Europa praesertim australi, in

Asia, Madera, Chili; Lusitaniae in calcareis ad vias, et alibi frequens ①.

SUB-ORDO.

LIGULIFLORAE.

TRIBUS.

Cichoraceae.

870 SCOLYMUS HISPANICUS. *Linn. Brot.* — *Cardo d'oiro, ou Cangarinha.* — Habitat Lusitaniae in calcareis et agris frequens, in tota regione mediterranea, Madera, Canariis ♃.

871 HYPOCHAERIS RADICATA. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa, Mauritania; frequens circa Olisiponem, et alibi in Lusitania ♃.

872 RHAGADIOLUS STELLATUS. *D. C.* — *Var. Edulis.* — *Lapsana rhagadiolus. Linn.* — *Rhagadiolus edulis. Brot.* — Habitat in Europa australi, et Africa boreali; Lusitaniae prope Olisiponem, et alibi ①.

873 CATANANCHE CAERULEA. *Linn.* — Habitat in Europa australi, et Africa boreali ♃.

874 TOLPIS BARBATA. *Gaertn. Lam. Brot.* — *Crepis barbata. Linn.* — *Leituga.* — Habitat in apricis sterilibus Europae australis, et Africae borealis; Lusitaniae frequens ①.

875 HYOSERIS SCABRA. *Linn. Brot.* — *Hyoseris microcephala. Cass.* — Habitat in regione mediterranea, Lusitaniae in *Alcantara* et alibi ①.

876 CICHORIUM INTYBUS. *Linn. Brot.* — *Almeirão.*

—Habitat in Europa, ut omni Lusitania, ad vias, in arvis, inter segetes, et alibi; etiam in Mauritania ♃.

877 Cichorium Endivia. *Linn.* — *Chicoria, Escarolla, ou Endivia.* — Coluntur in hortis quamplurimae varietates — *Chicorea crespa, Chicorea branca, etc* ①.

878 Scorzonera Hispanica. *Linn. Brot.* — *Escorcioneira ordinaria ou maior.* — Habitat in Hispania, Lusitania in Beira et Transmontana, et alibi Europa ♃.

879 Trogopogon porrifolium. *Linn.* — *Cersefi, ou Barba de bode.* — Habitat in collibus et pratis Europae, hortis valde culta ♃.

880 Helminthia echioides. *Gaertn. Brot.* — *Picris echioides. Linn.* — Habitat Lusitaniae inter segetes frequens, in Hispania, Gallia, Anglia, Italia, et etiam Azoricis ①.

881 Helminthia lusitanica. *Welw.* — Habitat in collibus calcareis prope Olisiponem et alibi Lusitania ♃.

882 Picris hieracioides. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa omni, Lusitaniae in provinciis borealibus ②.

883 Podospermum calcitrapifolium. *D. C.* — *Scorzonera calcitrapifolia. Vahl.* — Habitat in regione mediterranea ♃.

884 Lactuca virosa. *Linn. Brot.* — *Alface brava maior.* — Habitat in aggeribus et sepibus Europae mediae et australis; Lusitaniae in provinciis borealibus ①.

885 Lactuca sativa. *Linn.* — *Alface.* — Patria dubia, probabiliter India. Coluntur quamplurimae varietates — *Alface repolhuda, crespa, orelha de mula, etc.* ①.

886 Chondrilla juncea. *Linn. Brot.* — Habitat in

glareosis Europae fere totius, et Sibiriae; Lusitaniae prope *Caparica* trans Tagum, et alibi ①.

887 Taraxacum dens-leonis. *Desf.* — *Taraxacum officinale. Brot.* — *Leontodon taraxacum. Linn* — *Taraxaco, Dente de Leão.* — Habitat in Europa, Asia occidentali, Africa boreali; Lusitaniae in Beira et provinciis borealibus ♃.

888 Aetheorhiza bulbosa. *Cass.* — *Hieratium tuberosum. Brot.* — *Leontodon bulbosum. Linn.* — *Chondrilla de Dioscorides.* — Habitat in agris, sepibus, et pratis trans Tagum, et alibi in Lusitania, ut in tota fere regione mediterranea ♃.

889 Crepis intybacea. *Brot. Phyt* — *Almeirôa.* — Habitat in cultis pinguibus, in solo calcareo, humoso, et ad vias prope Olisiponem, et alibi in Lusitania ①.

890 Barkhausia rubra. *Monch.* — *Crepis rubra. Linn.* — Habitat in pascuis Europae mediterraneae ①.

891 Picridium Tingitanus. *Desf.* — *Sonchus Tingitanus. Lam. Brot.* — *Scorzonera Tringitana. Linn.* — Habitat Lusitaniae in Algarbiis, in maritimis Siciliae, Aegypti, et Barbariae ①.

892 Picridium vulgare. *Desf.* — *Sonchus picroides. Lam. Brot.* — *Scorzonera picroides. Linn.* — Habitat in arvis cultis et asperis regionis mediterraneae; Lusitaniae prope Olisiponem et alibi ① ②.

893 Sonchus oleraceus. *Linn. Brot.* — *Sonchus ciliatus. Lam.* et *Sonchus fallax. Wallr.* — *Serralha branca, e Serralha preta.* — Habitat in arvis Europae; Lusitaniae valde frequens ①.

894 Andryala corymbosa. *Brot.* — *Andryala integrifolia. Linn.* — Habitat Lusitaniae prope *Alcantara*, trans Tagum, in Beira, et alibi ①.

ORDO.

GOODENIACEAE.

895 Goodenia grandiflora. *Cav.*—Habitat in Nova-Hollandia ♃.

ORDO.

LOBELIACEAE.

896 Clintonia pulchella. *Lindl.*—Habitat in California ①.

897 Lobelia syphilitica. *Linn.* — Habitat in humidis Americae borealis a Canada ad Caroliniam ♃.

898 Lobelia urens. *Linn. Brot.*—Habitat in paludosis, et humidis Lusitaniae, Hispaniae, Galliae, Angliae, et in Madera ①.

899 Laurentia Michelli. *D. C.* — *Lobelia Laurentia. Linn. Brot.*—Habitat in stagnis et juxta rivulos regionis mediterraneae; Lusitaniae ad Tagum, Mundamque ①.

900 Siphocampylus bicolor. *D. Don.*—Habitat in Georgia ♄.

ORDO.

CAMPANULACEAE.

901 Jasione montana. *Linn. Brot.*—Habitat in

regione mediterranea, et Europa media; Lusitaniae in montosis siccis, et arenosis, praesertim in Beira, et provinciis borealibus ① ♃.

902 ROELLA CILIATA. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

903 CAMPANULA MEDIUM. *Linn.* — Habitat in montosis Europae australis ②.

904 CAMPANULA BONONIENSIS. *Linn.* — Habitat in Europa orientali, Sibiria, et Caucaso ♃.

905 CAMPANULA PYRAMIDALIS. *Linn.* — *Pyramides.* — Habitat in Austria prope mare Adriaticum ♃.

906 CAMPANULA PRIMULAEFOLIA. *Brot. Phyt.* — *Campanula peregrina. Hoffm. et Link* — Habitat Lusitaniae in subalpinis Algarbiorum, et in Beira ♃.

907 CAMPANULA LOEFLINGII. *Brot. Phyt.* — Habitat Lusitaniae in Beira, et provinciis borealibus, rarior in Extremadura, et Transtagana ①.

908 CAMPANULA RAPUNCULUS. *Linn. Brot.* — *Rapuncio, ou Raponcio.* — Habitat in Europa media, et regione mediterranea ②.

909 TRACHELIUM CAERULEUM. *Linn.* — Habitat in rupestribus Africae septentrionalis, Hispaniae, et Italiae ♃.

ORDO.

VACCINIEAE.

910 VACCINIUM MADERENSIS. *Link.* — Habitat in Madera, et Azoricis ♄.

911 VACCINIUM VITIS IDAEA. *Linn.* — Habitat in Europa, America boreali in sylvis et solo sabuloso ♄.

912 VACCINIUM MYRTILLUS. *Linn. Brot.* — *Aranda.* — Habitat in Europa; Lusitaniae in Duriminia prope *Portella do Homem*, et etiam prope *Villar da Veiga* in montosis umbrosissimis et sylvaticis Welw. ♄.

ORDO.

ERICACEAE.

TRIBUS.

. Ericeae.

913 ERICA UMBELLATA. *Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae frequens trans Tagum, in Hispania, et Africa boreali ♄.

914 ERICA SCOPARIA. *Linn. Brot.* — *Urze das Vassoiras.* — Habitat in collibus sabulosis incultisque frequens Lusitaniae, etiam in Madera, Azoricis, et alibi in Europa ♄.

915 ERICA LUSITANICA. *Reid.* — *Erica arborea. Brot* — *Torga, ou Urze branca.* — Habitat in humidis pinetorum trans Tagum prope *Calhariz*, in *Serra da Arrabida*, *Serra de Cintra*, et alibi Lusitaniae ♄.

916 ERICA AZORICA. *Hochst.* — *Erica scoparia.* — *Var. parviflora. D. C.* — Habitat frequentissima in incultis omnium Insularum Azoricarum, ubi ascendit usque ad regiones editiores, ultra 6000 alt. in monte *do Pico* ex Cl. Hochestettero ♄.

917 CALLUNA VULGARIS. *Salisb.* — *Erica vulgaris. Linn. Brot.* — *Urze, Torga ordinaria.* — Habitat in

Europa occidentali et boreali, vulgaris etiam in Islandia et Terra-Nova: totae fere Lusitaniae vulgarissima in collibus, incultisque aridis, sicut in omnibus Insulis Azoricis ♄.

TRIBUS.

Andromedeae.

918 Daboecia polyfolia. *D. et G. Don.* — *Erica Daboecia. Brot.* — Habitat Lusitaniae in Duriminia, et alibi in Europa ♄.

919 Rhododendron arboreum. *Smith.* — Habitat in Indiae montibus Hymalaianis ♄.

920 Rhododendron Ponticum. *Linn.* — Algarbiensibus *Adelpheira* dicta. — Habitat in Asia minori, Iberia et Armenia; nuper a Webbio reperta in Hispania australiori in sylvis umbrosis montium freto Herculeo impendentium juxta rivulorum alpestrium margines inter Algesiras et Asindonem. Lusitaniae frequentissima in editioribus *da Serra de Monchique* in Algarbiis, ubi visa a Welw. et antea ab Hoffmans. et aliis; a botanophyllo et amico nostro *Visconde de Oliveira* habitare dicitur etiam in Duriminia ad rivulum *de Bostello* prope *Oliveira de Azemeis*, unde nobis advenit specimen in horto scholari cultum ♄.

921 Rhododendron Indicum. *Sweet.* — *Azalea Indica. Linn.* — Habitat in Java, forte etiam spontanea in China, et Japonia ♄ ♄.

922 Kalmia latifolia. *Linn.* — Habitat in America boreali a Canada ad Carolinam in collibus rupestribus et montanis ♄.

923 Azalea Pontica. *Linn.* — Habitat in monti-

bus Caucasicis demissioribus infra Rhododendra, in Ponto, Armenia, Iberia ♄.

TRIBUS.

Arbuteae.

924 ARBUTUS UNEDO. *Linn. Brot.* — *Medronheiro, ou Ervodo.* — Habitat in asperis et rupestribus regionis Mediterraneae, et secus Oceanum in Gallia occidentali et Hibernia; Lusitaniae in editioribus *da Serra da Arrabida*, in *Serra de Monchique*, *Serra de Cintra*, *Gerez*, et alibi ♄.

925 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI *Spreng.* — *Arbutus Uva-ursi. Linn.* — *Uva ursina.* — Habitat in regionibus alpinis Europae borealis et mediae, Asiae, et Americae borealis ♄.

926 ARCTOSTAPHYLOS ALPINA. *Spreng.* — *Arbutus alpina. Linn.* — Habitat in regionibus alpinis Europae, et Asiae borealis ♄.

TRIBUS.

Clethreae.

927 CLETHRA ALNIFOLIA. *Linn.* — Habitat in America boreali in paludosis et sylvis humidis a Canada ad Georgiam ♄.

928 CLETHRA ARBOREA. *Ait.* — Maderensibus *Folhado* dicta. — Habitat in sylvis Maderae ♄ ♄.

ORDO.

EPACRIDEAE.

929 Epacris impressa. *Lobill.* — Habitat in Nova-Hollandia ♄.

930 Epacris nivea. *D. C.* — Habitat in Nova-Hollandia ♄.

ORDO.

STYRACEAE.

931 Styrax officinalis. *Linn.* — Habitat in Libano, et Europa australi, praesertim in Insulis Graeciae ♄.

ORDO.

AQUIFOLIACEAE.

932 Ilex Aquifolium. *Linn. Brot.* — *Azevinho.* — Habitat in Europa; Lusitaniae in montosis *Gerez*, Herminii, et alibi ♄.

ORDO.

MYRSINEAE.

933 Myrsine Africana. *Linn.* — *Var. retusa Alph.*

D. C. — *Myrsine retusa. Ait.* — In Azoricis *Tamucho* dicta. — Habitat in rupestribus humidis ad Cap. B. Spei, Abyssinia, et in Azoricis frequentissima fere usque ad 4'00' alt. ♄.

ORDO.

PRIMULACEAE.

TRIBUS.

Samoleae.

934 SAMOLUS VALERANDI. *Linn. Brot.* — *Alface dos rios.* — Habitat in paludosis ubique Europae, Africae, Asiae, Americae; Lusitaniae frequentissima in humidis ad Oceanum inter *Ericeira* et *Praia das Maçãas*, et alibi ♃.

TRIBUS.

Primuleae.

935 CYCLAMEN EUROPAEUM. *Linn.* — Habitat in montibus Europae mediae ♃.

936 CYCLAMEN COUM. *Mill.* — Habitat in Europa australi, et Tauria ♃.

937 PRIMULA OFFICINALIS. *Jacq. Brot.* — *Primula veris officinalis. Linn* — *Primavera.* — Habitat in Europa, et Algeria; Lusitaniae in sylvatis montanis, pratis humidis provinciarum borealium ♃.

938 Primula elatior. *Jacq.* — *Primula veris elatior. Linn.* — *Primavera dos jardins.* — Habitat in Europa et Tauria ♃.

939 Primula Auricula. *Linn.* — *Orelha de urso.* — Habitat in montosis et subalpinis Europae ♃.

940 Primula Sinensis. *Sabine.* — Habitat in China ♃.

941 Lysimachia vulgaris. *Brot.* — *Lysimachia.* — Habitat Lusitaniae ad Durium, et Mundam, etiam (Welw.) ad *Caldas da Rainha* et in paludosis insularum laganarum inter *Samora* et *Aldéa Gallega.* Ex eodem Cl. Welw. Lysimachia vulgaris Brot. a Lysimachia vulgari Linn. discrepat, et insuper glandulis coccineis calicis foliorumque insignis. (Vid. Fl. Lus. exsic. Welw. in Acad. Reg. Scienc. Olisip.) ♃.

942 Lysimachia Ephemerum. *Linn.* — Habitat in Pyrenaeis orientalibus, in Hispania ♃.

943 Asterolinum stellatum. *Link. et Hoffm.* — *Lysimachia Linum-stellatum. Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae in vineis arenosis agri olisiponensis non infrequens, ex gr. prope *Tilheiras* (Welw.), in Beira; omnique regione mediterranea ①.

TRIBUS.

Anagallideae.

944 Anagallis linifolia. *Linn.* — *Anagallis Monelli. Brot.* — *Anagallis Lusitanica Linariae-folio. Tourn.* — Habitat in Lusitania et Hispania; in vineis et graminosis prope Olisiponem frequens, in Trans-

tagana, graniticis *Serra de Cintra* (Welw.), sicut alibi regione mediterranea ①.

945 Anagallis caerulea. *Brot.—Anagallis arvensis. Linn. var. α—Murrião azul.*—Habitat in cultis et pascuis totius fere Lusitaniae. Planta fere cosmopolita ①.

946 Anagallis phaenicia. *Brot.—Anagallis arvensis. Linn. var. β—Murrião vermelho.*—Habitat cum praecedenti ①.

ORDO.

JASMINEAE.

947 Jasminum Azoricum. *Linn.—Jasmineiro dos Açôres.*—Patria dubia ex Hochstettero, quanquam a Commelyno statutum fuisset hunc fructicem esse spontaneum et indigenum Azoricis, ut a Ker. et Sims. in Insula Madera ♄.

948 Jasminum odoratissimum. *Linn.—Jasmineiro amarello da Madeira.*—Habitat in Maderae rupibus maritimis rarum, sed vere indigenum (Lowe.) ♄.

949 Jasminum officinale. *Linn.—Jasmineiro Gallego.*—Patria ignota ♄.

950 Jasminum grandiflorum. *Linn.—Jasmineiro de Italia.*—Habitat ad oram malabaricam, et in Nepalia ♄ ◡.

951 Jasminum fruticans. *Linn. Brot.—Jasmineiro do monte.*—Habitat ad sepes Lusitaniae borealis, etiam prope *Setubal*, et alibi in Europa omnique regione mediterranea ♄.

952 Jasminum Sambac. *Ait.* — *Nyctantes Sambac. Linn.* — *Jasminum fragrans. Salisb.* — Habitat in India ♄.

ORDO.

OLEACEAE.

TRIBUS.

Oleineae.

953 Olea Europaea. *Linn.* — *Var. Oleaster, vel Olea Oleaster. Hoffm. et Link.* — *Zambujeiro.* — *Var. Sativa, vel Olea sativa. Hoffm. et Link.* — *Oliveira.* — Habitat in Oriente, unde migravit cultura in Europam australem, Insulas mediterraneas, et Africam borealem; totaque regione olivarum spontanea etiam evadit Olea Oleaster, seu Olea Europaea sylvestris. Lusitaniae coluntur quamplurimae varietates, quarum fructus vocantur ab incolis. — *Azeitonas verdeaes, cordovezas, de Sevilha, durazias, etc.* ♄.

954 Picconia excelsa. *D. C.* — *Olea excelsa. Ait.* — Habitat in Madera, Azoricis, et Teneriffa ♄.

955 Osmanthus fragrans. *Lour.* — *Olea fragrans. Thunb.* — Habitat in China, Japonia ♄.

956 Phyllyrea latifolia. *Linn. Brot.* — *Aderno.* — Habitat Lusitaniae in *Cintra, Thomar, Alcobaça,* et alibi; in Europa mediterranea, et Africa atlantica ♄ ♄.

957 Phyllyrea angustifolia. *Linn. Brot.* — *Lentisco bastardo.* — Habitat Lusitaniae trans Tagum, in Extremadura et Beira; in asperis Europae mediterraneae ♄ ♄.

958 Phyllyrea media. *Linn. Brot.* — *Aderno.* — Habitat in *Cintra*, *Monte-Mór o Novo*, et alibi in Lusitania; in Europa mediterranea ♄ ♄.

959 Phyllyrea Lowei. *D. C* — *Olea microcarpa. Lowe.* — Habitat in rupibus Maderae ♄.

960 Ligustrum vulgare. *Linn. Brot.* — *Alfenheiro.* — Habitat prope *Bragança* ad vias, et prope *Sabor* in Lusitania; in sepibus et dumetis Europae, in Caucaso, in Algeria ♄.

961 Ligustrum Japonicum. — Habitat in Japonia ♄.

962 Ligustrum Nepalense. *Wall.* — Habitat in montibus Nepaliae ♄.

TRIBUS.

Fraxineae.

963 Syringa vulgaris. *Linn* — *Lilaz.* — Habitat in Persia; coluntur in horto varietates — *Violacea et Alba*, seu *Lilaz rôxo e branco* ♄.

964 Syringa Persica. *Linn.* — *Lilaz da Persia Jasmineiro azul.* — Habitat in Persia ♄.

965 Fraxinus excelsior. *Linn. Brot.* — *Freixo.* — Habitat in sylvis montanis Europae totius, ut in tota fere Lusitania ♄

966 Fraxinus Ornus. *Linn.* — *Ornus Europaea. Pers.* — Habitat in Europa mediterranea ♄.

ORDO.

GENTIANACEAE.

SUB-ORDO.

MENYANTHEAE.

967 Limnanthemum nymphoides. *Link.*—*Villarsia nymphoides. Vent.*—*Menianthes nymphoides. Linn.*—*Golfão pequeno.*—Habitat in aquis stagnantibus et lente fluentibus Europae australis et mediae, Asiae centralis; Lusitaniae ad *Monte-Mór o Velho* et *Maiorca* prope Conimbricam ♃.

968 Menianthes trifoliata. *Linn.*—Habitat in paludibus et fossis Europae ♃.

SUB-ORDO.

GENTIANEAE.

969 Orphium frutescens. *E. Mey.*—*Chironia frutescens. Linn.*—Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

970 Chlora perfoliata. *Willd.*—*Gentiana perfoliata. Linn.*—*Centaurea menor perfolhada.*—Habitat in Europa media et australi, sicut in omni regione mediterranea; Lusitaniae frequens in Extremadura et Beira ①.

971 Erythraea Centaurium. *Pers.*—*Gentiana*

centaurium. *Linn*. *Brot*. — *Fel da Terra, ou Centaurea menor*. — Habitat in Europae collibus; Lusitaniae frequens in calcareis circa Olisiponem, et alibi ①.

972 Gentiana lutea. *Linn*. *Brot*. — *Genciana das boticas, Argençana dos pastores*. — Habitat in regionibus alpinis Europae; Lusitaniae in Herminio ♃.

973 Gentiana pneumonanthe. *Linn*. *Brot*. — Habitat in Europa media et australi; Lusitaniae in summisHerminii, et prope *Caldas* (Welw.), in graminosis ♃.

974 Gentiana acaulis. *Linn*. — Habitat in Europa ♃.

ORDO.

APOCYNACEAE.

SUB-ORDO.

CARISSEAE.

975 Carissa Arduini. *Lam*. — *Arduinia bispinosa*. *Linn*. — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

SUB-ORDO.

APOCYNEAE.

976 Vinca maior. *Linn*. *Brot*. — *Vinca media*. *Hoffm. et Link*. — *Congossa maior*. — Habitat in Eu-

ropa media et australi; Lusitaniae frequens ad sepes, et in umbrosis humidis ♃.

977 Lochnera rosea. *Reichenb.* — *Vinca rosea. Linn.* — Habitat in Madagascaria ♃.

978 Nerium Oleander. *Linn. Brot.* — *Loendro, ou Sevadilha.* — Habitat in India, et spontanea, nisi indigena etiam, ad rivulos omnis regionis mediterraneae; Lusitaniae in Transtagana, et Algarbiis. Colitur in horto varietas flore purpureo, roseo, albo, et flore pleno ♄.

979 Nerium odorum. *Soland.* — *Loendro de cheiro.* — Habitat ad rivulos et littora maris in India orientali ♄.

ORDO.

ASCLEPIADEAE.

980 Periploca graeca. *Linn.* — Habitat in Europa australi ♄ ◡.

981 Cynanchum acutum. *Hoffm. et Link.* — *Cynanchum acutum. Linn.* — *Var. Monspeliaca.* — *Cynanchum Monspeliacum. Brot.* — *Escamonea de Mompelher.* — Habitat in regione mediterranea; Lusitaniae ad Tagi ripas ♃ ◡.

982 Vincetoxicum officinale. *Moench.* — *Asclepias Vincetoxicum. Linn. Brot.* — Habitat in montosis Europae fere totius; Lusitaniae in sylvis *Gerez* ♃.

983 Arauja sericifera. *Brot.* — Habitat in Brasilia ♄ ◡.

984 Asclepias curassavica. *Linn.* — Habitat in America tropica ♄.

985 GOMPHOCARPUS FRUTICOSUS. *R. Br.* — *Asclepias fruticosa. Linn.* — Habitat in Arabia, et per totum orbem disseminata; Lusitaniae spontanea in Transtagana (Welw.) ♄.

986 HOYA CARNOSA. *R. Br.* — *Asclepias carnosa. Linn.* — *Flôr de cêra, Flôr de pedra.* — Habitat in India tropica ♄ ◡.

987 STEPHANOTIS FLORIBUNDA. *Hort.* — Habitat in Madagascaria ♄ ◡.

988 STAPELIA VARIEGATA. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

ORDO.

POLEMONIACEAE.

989 BONPLANDIA GEMINIFLORA. *Cav.* — Habitat in Nova-Hispania ①.

990 PHLOX PYRAMIDALIS. *H. K.* — Habitt in America boreali ♃.

991 PHLOX DRUMMONDI. *Hook.* — Habitat in Texas ♃.

992 GILLIA TRICOLOR. *Benth.* — Habitat in California ①.

993 GILLIA CAPITATA. *Douglas.*—Habitat in America boreali ①.

994 HOITSIA COCCINEA. *Cav.* — *Cantua coccinea. Poir.* — Habitat in Mexico ♄.

995 CANTUA ELEGANS. *Poir.* — *Ipomopsis elegans. Mich.* — *Gillia coronopifolia. Poir* — Habitat in America boreali ②.

996 COBAEA SCANDENS. *Cav.* — Habitat in Mexico ♃ ◡.

ORDO.

HYDROPHYLLEAE.

997 Nemophyla maculata. *Benth.* — Habitat in California ①.

998 Nemophyla insignis. *Benth.* — Habitat in California ①.

999 Eutoca viscida. *Benth.* — Habitat in California ①.

1000 Phacelia bipinnatifida. *Mich.* — Habitat in America boreali ♃.

ORDO.

CONVOLVULACEAE.

1001 Convolvulus tricolor. *Linn. Brot.* — Habitat in Lusitania, Hispania, Italia, Africa boreali ①.

1002 Convolvulus arvensis. *Linn. Brot.* — *Corriola ou Verdeselha.* — Habitat passim in arvis Lusitaniae, ut in orbe fere toto ♃.

1003 Convolvulus althaeoides. *Linn. Brot.* — Habitat in regione mediterranea, in Madera, et Asia; Lusitaniae in calcareis, ad sepes, et alibi ♃.

1004 Calystegia sepium. *R. Br.* — *Convolvulus sepium. Linn. Brot.* — *Trepadeira.* — Habitat in temperatis extratropicis totius orbis; Lusitaniae frequens ♃.

1005 Quamoclit vulgare. *Choisy.* — *Ipomaea qua-*

moclit. Linn. — Habitat inter tropicos totius orbis ① ◡.

1006 Batatas edulis. *Choisy.* — *Convolvulus batatas. Linn.* — *Batatas das Ilhas.* — Habitat in India orientali. Valde cultae in Insulis Azoricis, et Madera, varietates radice alba et violacea ♃.

1007 Pharbitis hispida. *Choisy.* — *Convolvulus purpureus. Linn.* — Habitat in America meridionali ①.

1008 Pharbitis Learii. *Hook.* — *Ipomaea Learii. Hort.* — Habitat in America centrali, *Buenos-Aires*, et Ceylona ♃.

ORDO.

NOLANACEAE.

1009 Nolana paradoxa. *Lindl.* — Habitat in Chili ① ♃.

ORDO.

SOLANACEAE.

TRIBUS.

Nicotianeae.

1010 Petunia nyctaginiflora. *Juss.* — *Nicotiana nyctaginiflora. Lehm.* — Habitat in America australi ad ostia fluvii *da Plata* ♃.

1011 Nicotiana Tabacum. *Linn.* — *Herva Santa ou do tabaco.* — Habitat in America tropica ①.

1012 Nicotiana paniculata. *Linn.* — Habitat in Peruvia ♃ ♄.

1013 Nicotiana glauca. *Graham.* — Habitat in *Buenos-Aires* ♄ ♄.

1014 Nicotiana rustica. *Linn.*—Habitat in America, fere ubique culta, et hinc inde spontanea ①.

1015 Nicotiana noctiflora. *Hook.* — Habitat in Chili ♃.

1016 Fabiana imbricata. *R. et Pav.* — Habitat in arvis Chili ♄.

TRIBUS.

Hyoscyameae.

1017 Hyoscyamus albus. *Linn. Brot.* — *Meimendro branco.* — Habitat frequens in ruderatis, ad muros, et alibi in Lusitania, in Europa, Asia, et Africa boreali ①.

1018 Hyosciamus niger. *Linn. Brot.*—*Meimendro negro.* — Habitat Lusitaniae, praesertim borealis, ad vias, in ruderatis, sicut in Europa fere tota, Asia, et Africa boreali ②.

1019 Hyosciamus orientalis. *Bieberstein* — Habitat in Iberia ♃.

TRIBUS.

Datureae.

1020 Datura Stramonium. *Linn. Brot.* — *Estra-*

monio. — Patria ignota, sed per commercium humanum in toto orbe divulgata; Lusitaniae in ruderatis, in arvis et agris *de Vallada* vulgarissima, sicut alibi frequens ①.

1021 Datura Tatula. *Linn.* — Habitat in America, nunc per Europam spontanea ①.

1022 Datura fastuosa. *Mill.* — *Trombetões róxos.* — Habitat in India orientali, et Aegypto ①.

1023 Brugmansia suaveolens. *Willd.* — *Datura arborea. Hort.* — *Calices de Venus.* — Habitat in Peruvia ♄.

1024 Datura Metel. — Habitat in India orientali ①.

TRIBUS.

Solaneae.

1025 Solanum tuberosum. *Linn.* — *Batatas.* — Habitat in America occidentali. Valde culta Lusitaniae in omnibus provinciis ♃.

1026 Solanum laciniatum. *Ait.* — Habitat in Nova-Hollandia, et Nova-Zeelandia ♃.

1027 Solanum Dulcamara. *Linn. Brot.* — *Dulcamára, Doceamarga, ou Uva de cão.* — Habitat in sepibus humidis Europae, Asiae, et Americae borealis: Lusitaniae in Interamnia, Beira, Extremadura, et alibi ♃ ♄.

1028 Solanum pseudocapsicum. *Linn.* — *Pimentão doce, Gingeira do Brasil.* — Habitat in Madera; colitur frequens in hortis ♃.

1029 Solanum guineense. *Lam.* — Habitat in Guinea ①.

1030 Solanum nigrum. *Linn. Brot.*—*Herva moira.* — Habitat frequens in ruderatis Europae passim; Lusitaniae fere ubique ①.

1031 Solanum sodomeum. *Linn.*—Habitat in subtropicis totius orbis; Lusitaniae quasi spontanea prope *Fortaleza de S. Julião* ♄.

1032 Solanum marginatum. *Linn.* — Habitat in Abyssinia ♄.

1033 Solanum Pyracanthos. *Lam.* — Habitat in Madagascaria ♄.

1034 Solanum Melongena. *Linn.*—*Beringella.*— Habitat subtropicis ①.

1035 Solanum agreste. *Roth.* — Habitat in India ♄.

1036 Solanum paniculatum. *Linn.* — Habitat in Brasilia ♃.

1037 Solanum lividum. *Willd.* — Habitat Madagascaria ♃.

1038 Solanum verbascifolium. *Linn.* — Habitat in America australi, India occidentali, Cochinchina, et Nova-Hollandia ①.

1039 Lycopersicum esculentum. *Mill.* — *Solanum lycopersicum. Linn.* — *Tomate.* — Habitat in America tropica; Lusitaniae valde culta ①.

1040 Capsicum annuum. *Linn.*—*Pimentão.*—Habitat in America tropica ①.

1041 Capsicum frutescens. *Willd.* — *Pimentão, ou Pimento de cheiro.* — Habitat in America tropica, et Asia; in Lusitania culta ♄.

1042 Capsicum grossum. *Willd.* — *Pimentão maçãa ou Catalão.* — Habitat in India orientali ①.

1043 Capsicum longum. *D. C.* — *Pimentão cornicabra* — Habitat in America tropica ①.

1044 Physalis somnifera. *Nees.* — Habitat in regione mediterranea, et inter tropicos ♃.

1045 Physalis Alkekengi. *Linn.* — *Alquequenge.* — Habitat in Europa media; Lusitaniae quasi spontanea ♃.

1046 Atropa Belladonna. *Linn.* — *Belladonna.* — Habitat in sylvis totius Europae ♃.

1047 Mandragora officinarum. *Bertol.* — *Mandragora autumnalis. Spreng.* — *Atropa mandragora. Linn.* — *Mandragora.* — Habitat in Graecia, et Sicilia ♃.

1048 Mandragora vernalis. *Bertol.* — Habitat in Oriente ♃.

1049 Lycium Europaeum. *Linn. Brot.* — *Espinheiro alvar na casca ou bastardo.* — Habitat in Europa; Lusitaniae ad sepes circa Olisiponem, et alibi ♄.

1050 Lycium barbarum. *Linn.* — Habitat in Europa australi ♄.

1051 Lycium chinense. *Mill.* — Habitat in China ♄.

1052 Lycium afrum. *Linn.* — *Jasmim de Africa.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

TRIBUS.

Cestrineae.

1053 Cestrum auriculatum. *Herit.* — *Courana, ou amante da noite.* — Habitat in Peruvia ♄.

1054 Cestrum nocturnum. *Herit.* — Habitat in America tropica ♄.

1055 Habrothamnus elegans. *Brong.* — Habitat in Mexico ♄.

ORDO.

EHRETIACEAE.

1056 Tournefortia fruticosa. *Ker.* — Habitat in Canariis ♄.

1057 Heliotropium Europaeum. *Linn. Brot.* — *Tornasol, Verrucaria, ou Herva das verrugas.* — Habitat frequens in Europa, Caucaso, Mauritania, Azoricis, et Madera; Lusitaniae frequens in agris, ruderatis, pratisque ①.

1058 Heliotropium Peruvianum. *Linn.* — *Baunilha dos jardins.* — Habitat in Peruvia ♄.

ORDO.

BORRAGINEAE.

TRIBUS.

Cerintheae.

1059 Cerinthe maior. *Linn. Brot.* — Habitat in subalpinis Europae; Lusitaniae in humosis subhumidis; etiam in Mauritania ①.

TRIBUS.

Cynoglosseae.

1060 Cynoglossum clandestinum. *Desf. Brot Phyt.*

— *Cynoglossum officinale. Brot. Linn.* — *Cynoglossa, ou Lingua de cão.* — Habitat ad limites agrorum Lusitaniae, in Hispania, Italia, et Barbaria ①.

1061 Cynoglossum pictum. *Ait. Brot. Phyt.* Habitat Lusitaniae frequens ad vias, et alibi in Europa australiori, Africa boreali, et Madera ①.

1062 Cynoglossum glochidiatum. *Vahl.* — Habitat in India orientali ♃.

1063 Myosotis pallustris. *Brot. Hoffm. et Link.* — *Myosotis scorpioides. Lam.* — *Myosotis perennis. Shrank.* — Habitat Lusitaniae frequens in uliginosis, et ad rivulos ♃.

1064 Myosotis arvensis. *Linn. Brot.* — *Orelha de rato.* — Habitat frequens in agris, collibus, sylvis, sepibus Lusitaniae borealis, sicut alibi in Europa ①.

TRIBUS.

Anchuseae.

1065 Borrago officinalis. *Linn. Brot.* — *Borragem.* — Habitat frequens in Europa media et australi, Mauritania, Oriente, et America boreali. Ex Aleppo olim venisse dicitur, ab Oriente ex Endlichero ①.

1066 Psilostemon orientale. *D. C.* — *Borrago orientalis. Linn.* — Habitat circa Byzantium ♃.

1067 Symphytum officinale. *Linn.* — *Consolda maior.* — Habitat in umbrosis humidis Europae; Lusitaniae in Duriminia ex *Christovão dos Reis* ♃.

1068 Anchusa italica. *Linn. Hoffm. et Link.* — *Anchusa officinalis. Brot.* — *Buglossa, ou Lingua de*

vacca. — Habitat inter segetes in calcareis prope Olisiponem, et alibi in Lusitania media ♃.

1069 Anchusa undulata. *Linn. Brot.* — *Buglossa ondeada.* — Habitat in Lusitania, et tota regione mediterranea. Anchusa undulata Linn. ex D. C. eadem etiam ac Anchusa nigricans Brot., cujus habitatio indicata est in Fl. et Phyt. Lus. ad *Alcantara* ①.

TRIBUS.

Lithospermeae.

1070 Lithospermum fruticosum. *Linn. Brot. Phyt.* — *Herva das sette sangrias, ou Sargaça hispida.* — Habitat in Europa australi, et Barbaria; Lusitaniae in ericetis, et dumetis sabulosis frequens ♄.

TRIBUS.

Echieae.

1071 Echium candicans. *Linn.* — *Maçaruco.* — Habitat in Maderae rupibus altis ♄.

1072 Echium vulgare. *Linn. Brot.* — *Viperina.* — — Habitat in ruderatis et ad vias totius Europae, Africae borealis, et in Ins. Azoricis ②.

1073 Echium Lusitanicum. *Linn.* — *Echium italicum. Brot. nec Linn.* — Habitat in Lusitaniae arenosis, et Hispania ♃.

1074 Echium plantagineum. *Linn. Brot.* — *Soágem.* — Habitat Lusitaniae frequens in humidiusculis,

pratis et agris, sicut alibi in Europa australi, et Mauritania ①.

ORDO.

LABIATAE.

TRIBUS.

Ocimoideae.

1075 Ocimum Basilicum. *Linn.* — *Alfavaca, ou Mangericão maior.* — Habitat in India orientali ♃.

1076 Ocimum minimum. *Linn.* — *Mangericão ordinario.* — Habitat in Ceylona (Linn.), in Chili, sed dubia incola, et forsan varietas Ocimi Basilici ex cultura orta (Bentham) ①.

1077 Lavandula Staechas. *Brot.* — *Lavandula Staechas. α Linn.* — *Rosmaninho.* — Habitat in Europa mediterranea, et Africa boreali; Lusitaniae frequens in sylvaticis et dumetis Transtaganae et alibi ♄.

1078 Lavandula pedunculata. *Cav. Hoffm. et Link.* — *Lavandula stoechas. β Linn.* — *Rosmaninho.* — Habitat cum praecedente, sed rarior, etiam in Hispania, et Madera ♄.

1079 Lavandula dentata. *Linn.* — Habitat in Europae et Africae regionis mediterraneae occidentalis aridis, in Madera ♄.

1080 Lavandula vera. *D. C.* — *Alfazema.* — Habitat in Europa, et Africa mediterranea ♄.

1081 Lavandula Spica. *D. C.* — *Alfazema.* — Ha-

bitat in Europae, et Africae, regionis mediterraneae aridis ♄.

1082 Lavandula multifida. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa et Africa mediterranea; Lusitaniae prope *Setubal* et alibi in Transtagana ♄.

TRIBUS.

Menthoideae.

1083 Mentha rotundifolia. *Linn. Brot.*—*Variet. Hirsuta. Brot.*—*Menthastro.*—*Variet. glabra. Brot.* — *Hortelãa das cosinhas.* — Habitat in ruderatis, ad vias et fossis Europae fere totius, in Mauritania, Sibiria, Azoricis, Madera; Lusitaniae frequens ♃.

1084 Mentha viridis. *Linn.* — Habitat in Europa temperata, Azoricis, Madera, et ad Cap. B. Spei ♃.

1085 Mentha piperita. *Linn.* — *Ortelãa-pimenta.* —Habitat in Europa septentrionali, ut videtur, spontanea, et alibi passim culta ♃.

1086 Mentha aquatica. *Linn.* — Habitat in aquosis, ad fossas et rivulos regionum temperatarum orbis fere totius; Lusitaniae in Beira, et provinciis borealibus ♃.

1087 Mentha Pulegium. *Linn. Brot.* — *Poejo.* — Habitat in uliginosis Europae totius, et regionis tauricae-caucasicae, in Madera, et America; Lusitaniae frequens ♃.

1088 Mentha arvensis. *Linn.* — *Mentha gentilis. Linn.* — *Vergamota.* — Habitat in uliginosis sylvaticis Europae mediae et borealis, nec non Asiae temperatae vulgarissima, etiam in Madera ♃.

1089 LYCOPUS EUROPAEUS. *Linn.* — *Marroio d'agua* — Habitat in humidis et uliginosis Europae totius, Asiae, et Africae borealis; Lusitaniae ad Mundam et alibi ♃.

TRIBUS.

Monardeae.

1090 SALVIA OFFICINALIS. *Linn.* — *Salva das boticas.* — Habitat in Europae australis siccis ♄.

1091 SALVIA CANARIENSIS. *Linn.* — Habitat in Insulis canariensibus ♄.

1092 SALVIA HORMINUM. *Linn.* — Habitat in regione mediterranea-pontica Europae et Asiae ♃.

1093 SALVIA PATULA. *Hoffm. et Link. Brot. Phyt.* — *Salvia Aethiopis. Brot.* — Habitat in pascuis et ericetis Transtaganae ♃.

1094 SALVIA CERATOPHYLLOIDES. *Linn.* — Habitat in regione mediterranea australiori ♃.

1095 SALVIA PRATENSIS. *Linn.* — Habitat in Europae mediae et australis herbidis, pratis siccis, ad vias; Lusitaniae frequens ♃.

1096 SALVIA LUSITANICA. *Jacq.* — Habitat in Lusitania, et Hispania ♃.

1097 SALVIA SCLAREOIDES. *Brot. Phyt.* — *Salvia Lusitanica. Poir.* — Habitat in Lusitania, et Italia ♃.

1098 SALVIA VERBENACA. *Linn.* — Habitat in Europa septentrionali et media ♃.

1099 SALVIA CLANDESTINA. *Linn.* — *Salvia verbenacoides. Brot.* — *Salvia polymorpha. Link. et Hoffm.* — *Salvia collina. Lowe.* — Habitat in regione mediterranea, Madera; Lusitaniae in collibus calcareis Extremadurae et Beirae ♃.

1100 Salvia tiliaefolia. *Vahl.* — Habitat in convalli Caracasana, et in Andibus Novae Hispaniae ♃.
1101 Salvia chamaedryoides. *Cav.* — Habitat in Mexico ♄.
1102 Salvia eriocalix. *Bertero.* — Habitat in Jamaica ♄.
1103 Salvia tubiflora. *Sm.* — Habitat in Peruvia ♄.
1104 Salvia lutea. *Kunth.* — Habitat in Peruvia ♄.
1105 Salvia leonuroides. *Glox.* — Habitat in locis temperatis regni Quitensis ♄.
1106 Salvia splendens. *Sellow.* — Habitat in sylvis prope *Rio de Janeiro* ♄.
1107 Salvia cardinalis. *Kunth.* — Habitat in Brasilia ♃.
1108 Salvia involucrata. *Cav.* — Habitat in Mexico ♄.
1109 Salvia coccinea. *Linn.* — Habitat in America aequinoctiali, et India ♃ ♄.
1110 Salvia verticillata. *Linn.* — Habitat in Europa australi, et in Asia mediterraneo-caucasica ♃.
1111 Rosmarinus officinalis. *Linn. Brot.* — *Alecrim.* — Habitat in Europae, et Africae regionis mediterraneae siccis et rupestribus; Lusitaniae frequens in Transtagana, Beira, et alibi ♄.

TRIBUS.

Satureineae.

1112 Satureja hortensis. *Linn. Brot.* — *Segurelha.* — Habitat in Europa australi ♃.

1113 Origanum Dictamnus. *Linn* — *Dictamo de Creta.* — Habitat in Cretae rupibus ♄.

1114 Origanum creticum. *Brot.* — *Origanum macrostachyum. Link.* — *Origanum creticum macrostachyum. Brot. Phyt.* — *Ouregão menor, Ourego.* — Habitat circa Olisiponem et alibi in Lusitania meridionali ♄.

1115 Origanum vulgare. *Brot.* — *Origanum virens. Link.* — *Origanum vulgare virens. Brot. Phyt.* — *Ouregão ordinario.* — Habitat in Lusitania, praesertim boreali ♄.

1116 Origanum Majorana. *Linn.* — *Mangerona.* — Habitat in Africa mediterranea, et Asia media ♃.

1117 Thymus vulgaris. *Linn. Brot.* — *Tomilho ordinario.* — Habitat in siccis aridis Europae austro-occidentalis; Lusitaniae in collibus calcareis Beirae, et Algarbiorum ♄.

1118 Thymus Serpyllum. *Linn.* — *Serpão.* — Habitat in temperatis Europae, Asiae, et Africae septentrionalis ♄.

1119 Thymus glabratus. *Link. Brot. Phyt.* — *Thymus serpyllum. Brot.* ex fide *P. Christovão dos Reis.* — *Serpão glabro.* — Habitat in montosis Transmontanae, et in Interamnia ♄.

1120 Thymus capitatus. *Hoffm. et Link.* — *Thymus creticus. Brot. Phyt.* — *Saturcja capitata Linn.* — *Tomilho de Creta ou de Dioscorides.* — Habitat in regionis mediterraneae siccis aridis saxosisque; Lusitaniae in calcareis *de Monsanto* prope Olisiponem et alibi ♄.

1121 Hyssopus officinalis. *Linn.* — *Hyssopo.* — Habitat in Europa australi, et Asia media ♄ ♃.

TRIBUS.

Melissineae.

1122 Melissa officinalis. *Linn. Brot.* — *Herva cidreira.* — Habitat in montosis sylvaticis Europae meridionalis, et Asiae mediae; Lusitaniae ad Mundam, in *Monte do Azinhal*, ad rivulum *Sabor*, prope *Brunhozo* ad sepes, et alibi in Beira boreali ♃.

1123 Calamintha officinalis. *Moench.* — *Melissa calamintha. Linn.* — *Thymus calamintha. Brot. Scop.* — *Calamintha, ou Neveda maior.* — Habitat in Europa media et australi, Asia media; Lusitaniae in montosis prope Olisiponem et alibi ♃.

TRIBUS.

Scutellarineae.

1124 Brunella grandiflora. *Linn.* — Habitat in Europae fere omnis locis umbrosis ♃.

1125 Brunella vulgaris. *Linn. Brot.* — *Herva ferrea, ou Prunella.* — Habitat in toto fere orbe; Lusitaniae etiam in pratis, pascuis, et subhumidis ♃.

1126 Cleonia Lusitanica. *Linn. Brot.* — Habitat in montosis calcareis Lusitaniae, in Hispania, et Barbaria ①.

1127 Scutellaria minor. *Linn. Brot.* — Habitat in palustribus Europae, et Asiae mediae; Lusitaniae in Beira ♃.

TRIBUS.

Prostanthereae.

1128 WESTRINGIA ROSMARINIFORMIS. *Sm.* — Habitat in Nova-Hollandia ♄.

TRIBUS.

Nepeteae.

1129 NEPETA TUBEROSA. *Linn. Brot.* — Habitat in Lusitania, Hispania, et Sicilia ♃.

1130 NEPETA ITALICA. *Linn.* — Habitat in Hispania, et Italia ♃.

1131 NEPETA GLECHOMA. *Benth.* — *Glechoma hederacea. Linn. Brot.* — *Hera terrestre.* — Habitat in Europa, et America boreali; Lusitaniae raro, in uliginosis, umbrosisque prope *Manteigas* in Herminio, et ad Conimbricam ♃.

1132 CEDRONELLA TRIPHYLLA. *Moench.* — *Dracocephalum Canariense. Linn.* — *Herva cidreira das Canarias.* — Habitat in Ins. Canariis, et Madera frequens ♄

1133 DRACOCEPHALUM MOLDAVICA. *Linn.* — Habitat in Sibiria orientali, et monte *Himalaya* ♃.

1134 DRACOCEPHALUM PEREGRINUM. *Linn.* — Habitat in Sibiria fere omni ♃.

TRIBUS.

Stachydeae.

1135 MELLITTIS MELISSOPHYLLUM. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa; Lusitaniae in umbrosis humidiusculis Beirae, et prope *Caldas do Gerez* ♃.

1136 LAMIUM PURPUREUM. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa omni, et Asia; Lusitaniae in cultis, praesertim provinciis borealibus ①.

1137 LAMIUM ALBUM. *Linn.* — Habitat in Europa et Asia boreali ad vias, in arvis, ruderatisve frequens ♃.

1138 LEONURUS CARDIACA. *Linn.* — Habitat in Europae regione taurico-caucasica et caucaso-caspica, in jugo Himalayano, et America boreali introducta ♃.

1139 STACHYS ARVENSIS. *Linn. Brot.* — Habitat in arvis Europae, Africae borealis, et Asiae mediae; Lusitaniae frequens ①.

1140 STACHYS LUSITANICA. *Brot. Phyt.* — *Stachys germanica. Brot.* — *Eriostemum Lusitanicum. Hoffm. et Link.* — Habitat in siccis aridis lapidosis Europae, Asiae mediae, et Africae borealis; Lusitaniae frequens in collibus calcareis ①.

1141 BETONICA HIRSUTA. *Linn.* — Habitat in Europae australioris subalpinis ♃.

1142 BETONICA OFFICINALIS. *Linn. Brot.* — *Betonica.* — Habitat in pascuis sylvaticis Europae totius et Asiae Rossicae ♃.

1143 BETONICA GRANDIFLORA. *Willd.* — Habitat in Sibiria, et Caucaso ♃.

1144 SIDERITIS ROMANA. *Linn. Brot.* — *Burgsdorfia romana. Hoffm. et Link.* — Habitat in regionis

mediterraneae cultis et ruderatis frequens; Lusitaniae in agris aggeribusque aridis Algarbiorum ①.

1145 Marrubium vulgare. *Linn. Brot.* — *Marroio branco.* — Habitat in ruderatis, ad vias, sepes in Europa, Asia, Africa, America; Lusitaniae vulgarissima ♃.

1146 Ballota Italica. *Benth.* — *Marrubium Hispanicum. Linn.* — Habitat in Sicilia, Italia australi, Dalmatia ♃ ♄.

1147 Ballota nigra. *Linn. Brot.* — *Marroio negro.* — Habitat in Europa, regione mediterranea; Lusitaniae in Beira et Transtagana in umbrosis humidis, ad sepes ♃.

1148 Leonotis Leonurus. *R. Br.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

1149 Phlomis purpurea. *Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae prope *Setubal* et alibi in Transtagana, Hispaniae a Valentia usque ad Gades ♄.

1150 Phlomis fruticosa. *Linn.* — Habitat in siccis apricis montosis regionis mediterraneae orientalis ♄.

1151 Phlomis herba-venti. *Linn. Brot.* — Habitat in regionis mediterraneae siccis; Lusitaniae in agris Transtaganae, prope *Béja*, sed raro ♃.

1152 Eremostachys laciniata. *Bunge.* — *Phlomis laciniata. Linn.* — Habitat in Oriente ♃.

1153 Molucella laevis. *Linn.* — Habitat in Oriente ①.

TRIBUS.

Prasieae.

1154 Prasium majus. *Linn.* — Habitat in regione

mediterranea, et Madera; Lusitaniae ad sepes prope *Lagos* in Algarbiis (Link., Durand) ♄.

TRIBUS.

Ajugoideae.

1155 Teucrium fruticans. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa et Africa mediterranea; Lusitaniae ad sepes inter *Cintra* et *Bellas*, etiam prope *Vidigueira* ♄.

1156 Teucrium bracteatum. *Desf.* — Habitat in Africa boreali ♃.

1157 Teucrium Scorodonia. *Linn. Brot.* — Habitat in sylvis, ad sepes Europae fere totius; Lusitaniae frequens ♃.

1158 Teucrium lucidum. *Linn.* — Habitat in regione mediterranea, Alpibus, et Atlante ♃.

1159 Teucrium Chamaedrys. *Linn.* — Habitat in Europa, in regione mediterranea, et caspica ♃ ♄.

1160 Teucrium Marum. *Linn.* — *Herva gateirinha.* — Habitat in regione Mediterranea occidentali ♄.

1161 Teucrium Lusitanicum. *Hoffm. et Link.* — *Teucrium polium. Brot.* — *Teucrium polium Lusitanicum. Brot. Phyt.* — *Polio montano.* — Habitat in collibus calcareis prope Olisiponem, et in tota Lusitania ♄.

1162 Ajuga reptans. *Linn.* — Habitat in Europae et Asiae mediae herbidis ♃.

1163 Ajuga orientalis. *Linn.* — Habitat in regione mediterranea ♃.

1164 Ajuga Chamaecistus. *Ging.* — Habitat in Persia, et Armenia ♄.

1165 Ajuga iva. *Schreb.* — *Teucrium Iva Brot.* — *Ajuga Iva heterantha. Brot. Phyt.* — *Iva moschada, ou Herva crina.* — Habitat circa Olisiponem et alibi in Lusitania ♄.

ORDO.

VERBENACEAE.

TRIBUS.

Lippieae.

1166 Verbena officinalis. *Linn. Brot.* — *Verbena, Urgebão, ou Gerbão.* — Habitat totum fere per orbem calidiorem et temperatum; Lusitaniae ad vias, et in subhumidis circa Conimbricam, et alibi frequens ♃.

1167 Verbena Aubletia. *Jacq.* — Habitat in America boreali ♃.

1168 Verbena Bonariensis. *Linn.* — Habitat in campis graminosis Brasiliae meridionalis, et *Buenos-Aires* ♃.

1169 Verbena venosa. *Gill. et Hook.* — Habitat in campis graminosis Brasiliae meridionalis et *Buenos-Aires* ♃.

1170 Verbena teucrioides. *Gill. et Hook.* — Habitat in campis Brasiliae meridionalis et *Monte-Video* ♄.

1171 VERBENA CHAMAEDRIFOLIA. *Juss.* — Habitat in campis Brasiliae meridionalis et Platensium ♄.

1172 LIPPIA CITRIODORA. *Kunth.* — *Verbena triphylla. L'Herit.* — *Aloisia citriodora. Ort.* — *Verbena cidrada, ou Lucia-lima.* — Habitat in Peruvia, et Chili ♄.

TRIBUS.

Lantaneae.

1173 LANTANA NIVEA. *Vent.* — Habitat in collibus siccis *Rio de Janeiro*, et alibi in Brasilia meridionali ♄.

1174 LANTANA SELLOWIANA. *Link. et Otto.* — Habitat in campis *Monte-Vidéo*, et in Brasilia meridionali ♄.

1175 LANTANA TRIFOLIA. *Linn.* — Habitat in America centrali et australi ♃ ♄.

1176 LANTANA ACULEATA. *Linn.* — Habitat in America tropica ♄.

1177 SPIELMANNIA AFRICANA. *Willd.* — *Lantana africana Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

1178 CITHAREXYLON QUADRANGULARE. *Jacq.* — Habitat in India occidentali ♄.

1179 DURANTA PLUMIERI. *Jacq.* — Habitat in Antillis ♄.

1180 VITEX AGNUS-CASTUS. *Linn.* — *Arvore da castidade, Agno-casto, ou Pimenteiro sylvestre.* — Habitat in regione mediterranea; Lusitaniae quasi spontanea in paludosis nonnullis Transmontanae ♄.

1181 CLERODENDRON FRAGRANS. *Vent.* — *Wolkameria Japonica. Hort.* — Habitat in Japonia ♄.

ORDO.

ACANTHACEAE.

1182 THUMBERGIA ALATA. *Bojer. Hook.* — Habitat in Africa orientali ♄ ⌣.

1183 DIPTERACANTHUS STREPENS. *Le Conte.* — *Var. calycinus. Nees.* — Habitat in America boreali ♃.

1184 DIPTERACANTHUS GRANDIFLORUS. *Nees.* — Habitat in Peruvia ♃.

1185 RUELLIA FORMOSA. *Andr.* — Habitat in Brasilia ♃.

1186 CRYPHIACANTHUS BARBADENSIS. *Nees.* — *Ruellia clandestina. Linn.* — Habitat in Antillis ♃.

1187 ACANTHUS MOLLIS. *Linn. Brot.* — *Branca Ursina dos Italianos, ou Herva gigante.* — Habitat frequens in humentibus umbrosis circa Olisiponem et alibi Lusitaniae, sicut in Europa australi ♃.

1188 ACANTHUS SPINOSUS. *Linn.* — Habitat in Asia minori, et Europa mediterranea ♃.

1189 ADHATODA VASICA. *Nees.* — *Justicia Adhatoda. Linn.* — *Nogueira de Ceylão.* — Habitat in India orientali ♄.

1190 JUSTICIA CARNEA. *Lindley.* — Habitat in Brasilia ♃.

1191 JUSTICIA FLAVICOMA *seu* JUSTICIA LUTEA. *Hort.* — Habitat in Brasilia ♃.

1192 JUSTICIA QUADRIFIDA. *Vahl.* — Habitat in Nova-Hispania ♃.

1193 JUSTICIA COCCINEA. *Aubl.* — Habitat in Cayena ♃.

1194 Peristrophe speciosa. *Nees.* — *Justicia speciosa. Roxb.* — Habitat in India orientali ♃.

ORDO.

PEDALIACEAE.

1195 Martynia proboscidea. *Glox.* — *Martynia annua. Linn.* — Habitat in Mexico, et America boreali calidiori ①.

ORDO.

BIGNONIACEAE.

1196 Bignonia jasminifolia. *H. B. Kunth.* — Habitat in rivis Orinoci ♄ ◡.

1197 Tecoma capensis. *Lindl.* — *Bignonia capensis. Thunb.* — *Jasmineiro do Cabo.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

1198 Tecoma radicans. *Juss.* — *Bignonia radicans. Linn.* — *Jasmineiro da Virginia.* — Habitat in America boreali ♄ ◡.

1199 Tecoma stans. *Juss.* — *Bignonia stans. Linn.* — Habitat in America tropica ♄.

1200 Catalpa syringaefolia. *Sims.* — *Bignonia catalpa. Linn.* — Habitat in America boreali ♄.

1201 Gelsemium nitidum. *Mich.* — *Bignonia sempervirens. Linn.* — Habitat in America boreali, et Mexico ♄.

ORDO.

GESNERIACEAE.

1202 Gesneria Cooperi. *Hort.* — Habitat in Brasilia ♃.

1203 Gesneria zeberina. *Hort.* — Habitat in America ♃.

1204 Columnea scandens. *Linn.* — Habitat in Antillis, ubi dicitur *Liane á sirop* ob copiosum nectar in fundo floris acumulatum ♄ ◡.

1205 Gloxinea speciosa. *Loddig.* — Habitat in Brasilia ♃.

1206 Nematanthus Guillemini. *Brong.* — Habitat in Brasilia ♄.

ORDO.

SCROPHULARINEAE.

TRIBUS.

Antirrhineae.

1207 Lophospermum erubescens. *Zucc.* — Habitat in Mexico ♃.

1208 Maurandia semperflorens. *Ort.* — Habitat in Mexico ♃.

1209 Antirrhinum majus latifolium. *Brot. Phyt.*

— *Antirrhinum majus. Brot.* — *Antirrhinum majus. α Linn.* — *Antirrhinum latifolium. Hoffm. et Link.* — *Antirrhinum Lusitanicum. Tourn.* — *Herva bezerra.* — Habitat totae fere Lusitaniae in muris, rupibus, turribus, ad sepes, et inter segetes nonnunquam ♄ ♄.

1210 Antirrhinum calycinum. *Lam. Brot. Phyt.* — *Antirrhinum Orontium. Linn. var. grandiflorum. Chav.* — Habitat frequens in Lusitania, in Hispania, Italia, et Africa boreali ①.

1211 Anarrhinum bellidifolium. *Linn. Brot. Phyt.* — Habitat in ruderatis et locis humidis Europae occidentalis, in Gallia, Hispania, Helvetia, et Italia superiore; Lusitaniae in sabulosis aridis Beirae, et provinciis borealibus, raro in Extremadura ② ③.

1212 Linaria cymbalaria. *Mill.* — *Antirrhinum cymbalaria. Linn.* — Habitat in Europa, praesertim occidentali ♃.

1213 Linaria lanigera *Desf.* — *Linaria dealbata. Hoffm. et Link.* — *Antirrhinum lanigerum. Brot. Phyt.* — Habitat Lusitaniae arvis in Transtagana, Algarbiis, et interdum Beira meridionali; etiam in Hispania, Barbaria, et Madera ①.

1214 Linaria spuria. *Mill.* — *Antirrhinum spurium integrifolium. Brot. Phyt.* — *Antirrhinum spurium. Brot.* — *Linaria lanigera. Hoffm. et Link.* — *Falsa veronica de Allemanha.* — Habitat in arvis Europae fere totius, etiam in Palaestina, Africa boreali, Madera; Lusitaniae frequens circa Olisiponem et alibi in Extremadura et Beira ①.

1215 Linaria elatine. *Mill.* — *Antirrhinum elatine. Linn. Brot.* — Habitat in arvis Europae fere totius,

Africa boreali, et Insulis canariensibus; Lusitaniae prope *Quinta Branca* ad Conimbricam ①.

1216 Linaria triornithophora. *Hoffm. et Link.* — *Antirrhinum triornithophorum. Linn. Brot.* — *Linaria Lusitanica. Mill.* — Habitat Lusitaniae borealis et mediae, praesertim *Minho*, in umbrosis humidis; et sat frequens etiam in Asturiis occidentalibus ♃.

1217 Linaria triphylla. *Mill.* — *Antirrhinum triphylla. Linn. Brot.* — Habitat in collibus aridis regionis mediterraneae occidentalis ♃.

1218 Linaria praecox. *Hoffm. et Link.* — *Antirrhinum praecox. Brot. Phyt.* — Habitat Algarbiis in sabulosis ②.

1219 Linaria spartea. *Hoffm. et Link.* — *Antirrhinum sparteum. Linn. Brot. Phyt.* — Habitat Lusitaniae trans Tagum ① ②.

1220 Linaria meonantha. *Hoffm. et Link.* — *Antirrhinum virgatulum. Brot. Phyt.* — Habitat in sabulosis ad Mundam ①.

1221 Linaria multipunctata. *Hoffm. et Link.* — — *Antirrhinum multipunctatum. Brot. Phyt.* — Habitat Lusitaniae in solo macro circa Olisiponem et alibi frequens; etiam in Hispania ①.

TRIBUS.

Collinsieae.

1222 Collinsia bicolor. *Benth.* — Habitat in California ①.

1223 Schizanthus pinnatus. *R. et Par.* — Habitat in Chili ♃.

TRIBUS.

Calceolarieae.

1224 Calceolaria pinnata. *Linn.* — Habitat in humidis Peruviae ①.

TRIBUS.

Verbasceae.

1225 Alonzoa incizaefolia. *R. et Pav.* — *Hemimeris urticaefolia. Willd.* — Habitat in Chili ruderatis frequens ♃.

1226 Verbascum Thapsus. *Linn. Brot.* — *Verbasco.* — Habitat in collibus incultis ad vias et sepes Europae totius, et Asiae mediae; Lusitaniae in sabulosis, dumetis sterilibus provinc. bor. ② ♃?

1227 Verbascum pulverulentum. *Vill. Brot.* — Habitat Lusitaniae prope Conimbricam, in Europae fere totius apricis, Madera ②.

1228 Verbascum virgatum. *With.* — *Verbascum blattarioides. Lam. Brot.* — *Blattaria maior.* — Habitat Lusitaniae in prov. bor., in Hispania, Gallia, Anglia, Africa boreali; et, seminibus forte ex Europa allatis, ad Cap. B. Spei, in India, Americaque ①.

1229 Scrophularia scorodonia. *Linn. Brot.* — Habitat in Azoricis, Madera; Lusitaniae in umbrosis, ad sepes frequens in Extremadura et Beira ♃.

1230 Scrophularia glabrata. *Soland.* — Habitat in Teneriffa ②.

1231 Scrophularia aquatica. *Linn. Brot.* — *Herva das escaldadelias, ou Escrophularia.* — Habitat in um-

brosis humidis Europae totius, et Asiae mediae, etiam in Insulis Azoricis et Canariensibus; Lusitaniae in Beira et Extremadura ♃.

1232 SCROPHULARIA PINNATIFIDA. *Brot.* — Habitat Lusitaniae in sabulosis prope *Pombal*, *Grandula*, Conimbricam, et alibi in arenosis soloque macro ♄.

TRIBUS.

Veroniceae.

1233 SCOPARIA DULCIS. *Linn.* — Habitat in America calidiori ① ♃.

1234 VERONICA OFFICINALIS. *Linn. Brot.* — *Veronica de Allemanha ou das boticas.* — Habitat in sylvis Europae, et Americae borealis, in Azoricis: Lusitaniae in *Serra da Lousãa*, *Miranda*, et alibi in prov. bor. ♃.

1235 VERONICA SPICATA. *Linn.* — Habitat in solo calcareo Europae mediae, Asiaeque mediae et Rossicae ♃.

1236 VERONICA ANAGALLIS. *Linn. Brot.* — Habitat in aquis stagnantibus et ad rivos Europae totius, in Asia, America boreali, Africa capensi, et Azoricis: Lusitaniae frequens ♃.

1237 VERONICA SERPYLLIFOLIA. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa tota, Asia, Africa, et America; Lusitaniae in provinciis borealibus, et alibi in montosis ♃.

1238 VERONICA ARVENSIS. *Linn.* — Habitat in cultis Europae, et Americae borealis; Lusitaniae frequens in arvis et agris ①.

1239 VERONICA AGRESTIS. *Linn., Brot.* — Habitat in cultis Europae, et Asiae; Lusitaniae frequens in arvis et agris ①.

1240 VERONICA BECCABUNGA. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa, Asia boreali, Algeria, Abyssinia, et jugo Himalayano; Lusitaniae ad *Serra do Marão* prope *Pezo da Regoa* (Link), e alibi, sed raro ♃.

1241 VERONICA HEDERAEFOLIA *Linn. Brot.* — Habitat in cultis Europae totius; Lusitaniae borealis et mediae, raro meredionalis, in montosis ①.

1242 VERONICA TEUCRIUM. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa media et australi, Asia media; Lusitaniae prope Conimbricam ad *Convento de S. Antonio,* et alibi in Beira ♃.

TRIBUS.

Salpiglossideae.

1243 FRANCISCEA UNIFLORA. *Pohl.* — Habitat in Brasilia ♄.

TRIBUS.

Digitaleae.

1244 PENTSTEMON GENTIANOIDES. *G. Don.* — Habitat in Mexico ♃.

1245 PENTSTEMON HARTWEGI. *Benth.* — Habitat in Mexico ♃.

1246 PENTSTEMON BARBATUS. *Lindl.* — *Chelone barbata. Cav.* — Habitat in Mexico ♃.

1247 PENTSTEMON CAMPANULATUS. *Willd.*—*Chelone campanulata. Cav.* — Habitat in Mexico ♃.

1248 RUSSELIA JUNCEA. *Zacc.* — Habitat in Mexico ♃.

1249 DIGITALIS PURPUREA. *Linn. Brot.* — *Herva dedal, Dedaleira, ou Digitol.* — Habitat in Europa, Madera; Lusitaniae in *Serra de Monchique* (Link), et alibi. Digitalis purpurea tomentosa Brot. Phyt. seu Digitalis tomentosa Hoffm. et Link, quae non solum a Cl. Brotero, sed ab aliis etiam botanicis censetur varietas Digitalis purpureae Linn., habitat frequens ad ima montium *de Cintra*, et alibi in subumbrosis et humidulis Lusitaniae meridionalis ②.

1250 DIGITALIS THAPSI. *Linn. Brot. Phyt.* — Habitat in montosis inter *Lamego* et *Vizeu*, in convallibus circa Herminium, ad Mundam et alibi in Beira; etiam in Hispania, et Etruria inveniri dicitur ♃.

1251 DIGITALIS FERRUGINEA. *Linn.* — Habitat in Italia, Caucaso, et Oriente ♃.

1252 PAULOWNIA IMPERIALIS. *Sieb. et Zucc.* — *Bignonia tomentosa. Thunb.* — Habitat in Japonia ♄.

TRIBUS.

Buddleieae.

1253 BUDDLEIA GLOBOSA. *Lam.* — Habitat in Andibus Chilensibus ♄.

1254 BUDDLEIA LINDLEYANA. *Fortune.* — Habitat in China prope *Macáo, Cantão*, et in insulis adjacentibus ♄.

TRIBUS.

Gratioleae.

1255 Gratiola linifolia. *Vahl. Hoffm. et Link. Brot. Phyt.* — *Gratiola officinalis. Brot. nec Linn.* — *Graciosa do Reino.* — Habitat Lusitaniae in inundatis et humentibus ad Mundam, Durium, et *Vouga* ♃.

1256 Mimulus cardinalis. *Douglas.* — Habitat in California ♃.

ORDO.

PLANTAGINEAE.

1257 Plantago major. *Linn. Brot.* — *Tanchagem maior.* — Habitat in pascuis Europae passim, in Africa boreali; Lusitaniae frequens ♃.

1258 Plantago Lusitanica. *Linn. Brot.* — *Tanchagem do Reino, Lingua de ovelha.* — Habitat frequens circa Olisiponem et alibi Lusitania, etiam in Algeria ♃.

1259 Plantago lanceolata. *Linn. Brot.* — *Tanchagem menor, ou ordinaria das Boticas.* — Habitat Lusitaniae in vallibus humidiusculis, in pascuis et pratis Europae passim, Africa boreali ♃.

1260 Plantago serraria. *Linn. Brot.* — Habitat Lusitania in ruderatis et collibus calcareis circa Conimbricam, in apricis herbidis Algarbiorum inter *Faro* et *Moncarrapaxo* (Welw.); alibi in Europa ♃.

1261 Plantago coronopifolia. *Brot.* — *Plantago*

Coronopus. Linn. — *Guiabelha.* — Habitat in arenosis et alibi frequens Lusitaniae, sicut in Europa omni, Africa boreali, Canariis ①.

1262 Plantago Psyllium. *Linn. Brot.* — *Zaragatóa.* — Habitat in Europa australi omni, Africa boreali, et Canariis; in Lusitania frequens ①.

ORDO.

PLUMBAGINEAE.

TRIBUS.

Staticeae.

1263 Armeria pungens. *Roem.* — *Statice pungens. Link. Brot.* — Habitat in arenosis maritimis Lusitaniae frequens ♃.

1264 Armeria pinifolia. *Roem.* — *Armeria Lusitanica Link.* — *Statice pinifolia. Brot.* — Habitat in arenosis siccis Lusitaniae transtaganae, etiam in Algarbiis (Welw.) prope *Olhão* et *Castro-Marim* non infrequens ♃.

1265 Armeria Welwitschii. *Boiss.* — *Armeria littoralis. Welw.* — In Extremadurae maritimis inter *Ericeira* et *Cabo da Roca* ex Cl. Welw., qui primum eam invenit ♃ ♄.

1266 Armeria maritima. *Willd.* — Habitat in maritimis Europae septentrionalis et mediae; Lusitaniae valde culta in hortis, et nonnunquam subspontanea ♃.

1267 Statice sinuata. *Linn.* — Habitat in omni regione mediterranea; Lusitaniae incola? ♃.

1268 Statice Limonium. *Linn. Brot.* — *Limonio.* — Habitat in littoribus maritimis totius Europae, Africae borealis, et Asiae minoris; Lusitaniae prope *Alfeite, Coina,* et alibi trans Tagum ♃.

1269 Statice auriculaefolia. *Brot.* — *Statice ovalifolia. Poir.* — *Statice lanceolata. Hoffm. et Link.* — *Statice pyramidata. Lowe.* — Habitat Lusitaniae ad Tagum salsum praesertim prope *Alfeite* et *Seixal*, etiamque in Algarbiis (Welw.) prope *Lagos* et *Villa-Nova de Portimão;* in Hispania, Barbaria, Madera, et *Porto-Santo* ♃ ♄.

1270 Statice oleaefolia. *Brot.* — Habitat in maritimis trans Tagum inter *Alfeite* et *Seixal,* in *Costa da Trafaria,* ad *Lagôa de Obidos,* et in Algarbiis (Welw.) prope *Lagos* et *Alvôr* sparsim ♃.

1271 Statice mucronata. *Linn.* — Habitat in Barbaria ♃.

1272 Statice ferulacea. *Linn. Brot.* — Habitat in maritimis regionis mediterraneae; Lusitaniae prope *Setubal, Seixal, Alfeite, Aldêa-Gallega,* et *Moita* in humidis salsis ad Tagum, etiam in Algarbiis (Welw.) ad *Villa-Nova de Portimão,* et *Olhão* non infrequens ♃.

TRIBUS.

Plumbageae.

1273 Plumbago Europaea. *Linn. Brot.* — *Dentilaria.* — Habitat in omni regione mediterranea; Lu-

sitaniae in Algarbiis prope *Villa-Nova de Portimão*, *Silves*, *Lagos* (Brot. Welw.) ♃.

1274 Plumbago Zeylanica. *Linn.* — Habitat in omni India orientali, Nova-Hollandia, Senegambia, et Insulis Capitis Viridis ♄.

1275 Plumbago Capensis. *Thunb.* — *Plumbago auriculata. Lam.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄ ⌣.

1276 Plumbago coccinea. *Boiss.* — *Plumbago rosea. Linn.* — *Thela coccinea. Lour.* — Habitat in India orientali, Java, China ♃.

ORDO.

PETIVERIACEAE.

1277 Rivina laevis. *Linn.* — Habitat in India occidentali ♄.

1278 Petiveria alliacea. *Linn.* — Habitat in India occidentali ♄.

ORDO.

POLYGONEAE.

1279 Coccoloba sagitifolia. *Ort.* — *Polygonum accetosaefolium. Vent.* — Habitat in Peruvia, Brasilia ♄ ⌣.

1280 Rumex Bucephalophorus. *Linn. Brot.* — Ha-

bitat in littoribus mediterraneis; in agris sabulosis totius fere Lusitaniae ①.

1281 Rumex Acetosa. *Linn. Brot.* — *Azêdas.* — Habitat in pratis et pomariis Europae totius et Sibiriae; Lusitaniae in provinciis borealibus ♃.

1282 Rumex vesicarius. *Linn.* — Habitat in maritimis Siciliae et Barbariae ①.

1283 Rumex Patientia. *Linn.* — Habitat in pratis et secus rivulos Europae australioris ♃.

1284 Rumex Scutatus. *Linn. Brot.* — *Azêdas romanas.* — Habitat Lusitaniae ad Conimbricam, Porto, et in Algarbiis; alibi in Europa, et regione mediterranea ♃.

1285 Rumex obtusifolius. *Linn* — *Labaça obtusa, ou Labaçól.* — Habitat in pratis et pascuis Europae; Lusitaniae in provinciis borealibus ♃.

1286 Emex Spinosus. *Campd.* — *Rumex Spinosus. Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae ad Tagum salsum, alibi regione mediterranea ①.

1287 Polygonum maritimum. *Linn. Brot.* — Habitat in maritimis mediterraneis et atlanticis Europae et Americae borealis; Lusitaniae frequens ♃.

1288 Polygonum Hydropiper. *Linn. Brot.* — *Pimenta d'agua, ou Persicaria mordaz.* — Habitat in fossis Europae totius, Sibiriae, Mauritaniae, et Americae borealis; Lusitaniae in Beira, et alibi ①.

1289 Polygonum Persicaria. *Linn. Brot.* — *Persicaria, ou herva pecegueira.* — Habitat in inundatis hemisphaerae borealis ①.

1290 Polygonum orientale. *Linn.* — *Moncos de perú.* — Habitat in Oriente, India, ad Cap. B. Spei, et Nova-Hollandia. Valde culta in hortis ♃.

1291 Polygonum bistorta. *Linn.* — Habitat in

pratis montosis et alpinis humidis Europae totius ♃.

1292 Fagopyrum esculentum. *Moench.* — *Polygonum Fagopyrum. Linn.* — *Trigo sarraceno.* — Habitat in Asia media, per omnem Europam culta ①.

1293 Rheum rhaponticum. *Linn.* — Habitat in Ponto Euxino ad littora orientalia, ad mare caspicum, et in Sibiria ♃.

1294 Rheum undulatum. *Linn.* — Habitat in Bucharia ♃.

1295 Rheum palmatum. *Linn.* — Habitat in Tataria sinica ♃.

1296 Rheum compactum. *Linn.* — Habitat in Tataria ♃.

ORDO.

NYCTAGINEAE.

1297 Boerhavia viscosa. *Lagasca et Rodrig.* — *Boerhavia pegajoza.* — Habitat in America tropica ♃.

1298 Boerhavia scandens. *Linn.* — Habitat in America tropica ♃.

1299 Bugenvillea spectabilis. *Juss.* — Habitat in America australi ♄.

1300 Mirabilis dichotoma. *Linn.* — *Boas-noites, Jalapa bastarda maior.* — Habitat in Mexico ♃.

1301 Mirabilis Jalapa. *Linn.* — *Boas-noites. Jalapa bastarda menor.* — Habitat in India ♃.

ORDO.

AMARANTACEAE.

1302 Celosia cristata. *Linn.* — *Martinetes, Veludilhos rôxos ou amarellos.* — Habitat in India, China, Japonia ♃.

1303 Celosia argentea. *Linn.* — Habitat in India orientali ①.

1304 Achyranthes aspera. *Linn.* — Habitat in Asia, et Africa inter tropicos ♃.

1305 Desmochaeta atropurpurea. *D. C.* — *Achyranthes lappacea. Linn.* — Habitat in India orientali ♃.

1306 Amarantus caudatus. *Linn.* — *Rabos de raposa, Moncos de perú, ou Chorão dos jardins.* — Habitat in India orientali, Zeylona, et Persia ①.

1307 Amarantus hypochondriacus. *Linn.* — Habitat in Virginia ①.

1308 Amarantus tricolor. *Linn.* — *Araras, ou Papagayos.* — Habitat in India, et China ①.

1309 Amarantus Blitum. *Linn. Brot.* — *Bredos ordinarios.* — Habitat in Europa; Lusitaniae in oleraceis, vallibus humidiusculis Beirae et Extremadurae ①.

1310 Amarantus albus. *Linn.* — *Bredos brancos.* — Habitat in America boreali. Valde culta in hortis ①.

1311 Gomphrena globosa. *Linn.* — Habitat in India orientali ①.

ORDO.

CHENOPODIACEAE.

TRIBUS.

Atripliceae.

1312 ATRIPLEX HORTENSE. *Linn.* — *Herva armoles.* — Habitat in Asia media. Cultura vulgaris in hortis, et Europae spontanea ①.

1313 ATRIPLEX HALIMUS. *Linn. Brot.* — *Salgadeira.* — Habitat in sepibus maritimis circa Olisiponem et alibi Lusitaniae, sicut in regione mediterranea ♄.

1314 ATRIPLEX PORTULACOIDES. *Linn.* — Habitat in maritimis Europae totius, et in Barbaria ①.

1315 SPINACIA OLERACEA. *Linn.* — *Espinafre.* — Habitat in Arabia, et ab Arabis in Europa introducta. Valde culta in Lusitania ①.

TRIBUS.

Chenopodieae.

1316 AGATHOPHYTUM BONUS-HENRICUS. *Moq.* — *Blitum Bonus-Henricus. C. A. Meyer.* — *Chenopodium Bonus-Henricus. Linn.* — Habitat in ruderatis Europae totius ♃.

1317 BLITUM CAPITATUM. *Linn.* — Habitat in Europa australi ①.

1318 BLITUM VIRGATUM. *Linn.* — Habitat in Europa australi ①.

1319 Beta vulgaris. *Linn. Brot.* — *Celga, ou Acelga.* — Habitat in maritimis regionis mediterraneae; Lusitaniae in agris, vallibusque subhumidis circa Olisiponem, et alibi. Coluntur varietates — *Beta vulgaris alba* vel *pallescens* — *Acelga ordinaria*, et *Beta vulgaris rubra* — *Beterraba, ou Acelga vermelha* ① ②.

1320 Chenopodium ambrosioides. *Linn. Brot.* — *Herva formigueira, ou Ambrosia do Mexico.* — Habitat in Mexico, America australi; et spontanea, nisi etiam indigena, in humidis totius fere Lusitaniae, Azoricis, Madera, Mauritania, et alibi ①.

1321 Chenopodium Botrys. *Linn. Brot.* — *Ambrosia das Boticas, ou Botrys vulgar.* — Habitat Lusitaniae ad Durium; in Europa australi, etiam Sibiria, Barbaria ①.

1322 Chenopodium graveolens. *Willd.* — Habitat in Mexico ①.

1323 Chenopodium Vulvaria. *Linn.* — *Fedegosa.* — Habitat in pinetis et ruderatis Europae totius, et in Barbaria; Lusitaniae ad muros, et vias frequens ①.

1324 Chenopodium scoparia. *Linn.* — *Valverde, Belverde, ou Belvedere.* — Habitat in Europa, et Tataria ①.

1325 Chenopodium maritimum. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa et Sibiria ad littora in salsis; Lusitaniae ad *Seixal, Figueira*, et alibi in maritimis ①.

TRIBUS.

Salicornieae.

1326 Salicornia fruticosa. *Linn. Brot.* — Habi-

tat in Europa; Lusitaniae frequens trans Tagum prope *Seixal*, *Piedade*, et alibi ♄.

TRIBUS.

Salsoleae.

1327 Salsola Soda. *Linn. Brot.*—*Soda maior.*—Habitat in maritimis mediterraneis; Lusitaniae ad ostia Tagi et Mundae ①.

1328 Suaeda fruticosa. *Forsk.* — *Chenopodium fruticosum. Schr. Brot.* — *Salsola fruticosa. Linn.* —Habitat in maritimis mediterraneis, Anglia, Africa boreali et australi; Lusitaniae inter *Seixal* et *Alfeite*, etiam in Algarbiis ♄.

TRIBUS.

Baselleae.

1329 Basella rubra. *Linn.*—Habitat in India orientali ① ②.

1330 Basella alba. *Linn.*—Habitat in China, Japonia ①.

ORDO.

PHYTOLACCEAE.

1331 Phytolacca dioica. *Linn.*—*Tintureira*, *Bel-*

la-sombra, Hombú de Buenos-Ayres.—Habitat in America australi ♄.

1332 PHYTOLACCA OCTANDRA. *Linn.* — Habitat in Japonia, et Mexico ♄.

1333 PHYTOLACCA DECANDRA. *Linn.* — *Herva dos cachos da India, Herva dos cancros.* — Habitat in America boreali; ad oram marinam Insulae *Flôres* (Hochst.), in Madera, et Lusitania boreali spontanea ♃.

ORDO.

LAURINEAE.

1334 LAURUS NOBILIS. *Linn.* — *Loireiro ordinario.* — Habitat in Asia minori, per regionem mediterraneam diffusa; Lusitaniae spontanea in *Serra da Arrabida, Monchique*, et *Gerez* ♄.

1335 LAURUS MADERENSIS. *Lam.*—*Laurus faetens. Ait.* — Habitat in Madera, et Canariis ♄.

1336 CAMPHORA OFFICINARUM. *Bauh.*—*Persea camphora. Spreng.* — *Laurus camphora. Linn.* — Habitat in Japonia, et China ♄.

1337 PERSEA SASSAFRAS. *Spreng.* — *Laurus sassafras. Linn.* — Habitat in America boreali ♄.

1338 PERSEA INDICA. *Spreng.* — *Laurus Indica. Linn.* — *Vinhatico das Ilhas.* — Habitat in Madera ♄.

1339 PERSEA BORBONIA. *Spreng.*—*Laurus borbonia. Linn.* — Habitat in America boreali et australi ♄.

ORDO.

SANTALACEAE.

1340 Osyris alba. *Linn. Brot.* — *Casia branca de Virgilio.* — Habitat in regione mediterranea omni; Lusitaniae in dumetis Extremadurae, Beirae ♄.

ORDO.

ELAEAGNEAE.

1341 Hippophae rhamnoides. *Linn.* — Habitat in paludosis Europae occidentalis et borealis, in Tauria, Sibiria ♄.

1342 Shepherdia argentea. *Nuttal.* — *Hippophae argentea. Pursh.* — Habitat in America boreali ♄.

1343 Elaeagnus hortensis. *Bieberst.* — *Elaeagnus angustifolia. Linn* — *Arvore do paraizo.* — Habitat in Europa australi, et Oriente ♄.

ORDO.

THYMELAEAE.

1344 Daphne Cneorum. *Linn.* — Habitat in pascuis siccis Europae australioris ♄.

1345 DAPHNE GNIDIUM. *Linn. Brot.* — *Trovisco ordinario, Trovisco femea.* — Habitat in Europa mediterranea; in tota fere Lusitania frequens ♄.

1346 DAPHNE LAUREOLA. *Linn.* — *Laureola macha. Mezeréo menor.* — Habitat in sylvis montanis Europae, in Ins. *Pico;* Lusitaniae quasi spontanea occurrit prope *Cintra,* et *Collares* ♄.

1347 DAPHNE MEZEREUM. *Linn.* — Habitat in Europae nemoribus montanis ♄.

1348 DAPHNE COLLINA. *Sm.* — Habitat in Italia ♄.

1349 DAPHNE INDICA. *Linn.* — Habitat in China ♄.

ORDO.

PROTEACEAE.

1350 GREVILLIA ROBUSTA. *Cun.* — Habitat in Nova-Hollandia β ♄.

1351 BANKSIA SERRATA. — Habitat in Nova-Hollandia ♄.

ORDO.

ARISTOLOCHIACEAE.

1352 ARISTOLOCHIA SEMPERVIRENS. *Linn.* — Habitat in Creta ♄.

1353 ARISTOLOCHIA LONGA. *Linn. Brot.* — *Herva bicha dos hervolarios, Estrellamim, ou Aristolochia longa.* — Habitat in Europa australi; Lusitaniae ad

ima collium in umbrosiusculis prope Olisiponem, et alibi ♃.

1354 Aristolochia Pistolochia. *Linn. Brot.* — *Aristolochia menor, ou Pistolochia.* — Habitat in Europa australi; Lusitaniae ad fluvium *Zezere*, circa *Portalegre*, *Marvão* et alibi in Transtagana ♃.

1355 Aristolochia labiosa. *Lindl.* — Habitat in America tropica ♄ ◡.

1356 Aristolochia altissima. *Desf.* — Habitat in Creta, Numidia ♃.

ORDO.

PIPERACEAE.

1357 Piper umbellatum. *Linn.* — Habitat in America meridionali ♄.

1358 Piper Amalago. *Linn.* — Habitat in Jamaica ♄.

ORDO.

BEGONIACEAE.

1359 Begonia discolor. *H. Kunth.* — Habitat in China ♃.

1360 Begonia spathulata. *Haw.* — Habitat in Antillis ♃.

1361 Begonia nitida. *Dryand.* — Habitat in Jamaica ♃.

1362 Begonia argyrostigma. *Fisch.* — *Begonia maculata. Raddi.* — Habitat in Brasilia ♃.

1363 Begonia manicata. *Cels.* — Habitat in Brasilia ♃.

ORDO.

EMPETREAE.

1364 Corema alba. *Don.* — *Empetrum album. Linn. Brot.* — *Camarinheira, ou Camarinha.* — Habitat in Europa; Lusitania in arenosis prope littora maritima ab *Aveiro* ad *Caparica* ♄.

ORDO.

EUPHORBIACEAE.

1365 Euphorbia canariensis. *Linn.* — Habitat in Insulis canariensibus ♄.
1366 Euphorbia officinarum. *Linn.* — Habitat in Africa media et australi ♄.
1367 Euphorbia mamillaris. *Linn.* — Habitat in Africa australi ♄.
1368 Euphorbia neriifolia. *Linn.* — Habitat in India orientali ♄.
1369 Euphorbia Caput-Medusae. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.
1370 Euphorbia Anacantha. *Ait.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.
1371 Euphorbia mauritanica. *Linn.* — Habitat in Mauritania ♄.
1372 Euphorbia Characias. *Linn. Brot.* — *Tro-*

visco macho, Tithymalo maior, ou Maleiteira maior. — Habitat in Europa australi; in collibus, ad aggeres, sepesque frequens per totam Lusitaniam ♄.

1373 EUPHORBIA SPLENDENS. *Bojer.* — Habitat in Madagascaria ♄.

1374 EUPHORBIA FULGENS. *Karwinski.* — *Euphorbia jacquiniaeflora. Hort.* — Habitat in Mexico ♄.

1375 EUPHORBIA ELEGANS. *Spreng.* — *Euphorbia variegata. Roth.* — Habitat in India orientali ♄.

1376 EUPHORBIA LATHYRIS. *Linn.* — *Tartago, ou Catapucia menor.* — Habitat in Europa australiori; in Lusitania nonnumquam ad pagos quasi spontanea occurrit in Extremadura ②.

1377 EUPHORBIA PARALIAS. *Linn. Brot.* — *Morganheira das praias.* — Habitat ad littora mediterranei, et in Canariis; Lusitania in arenosis maritimis ♃.

1378 EUPHORBIA SERRATA. *Linn. Brot.* — Habitat Lusitania in Algarbiis, Hispania, Gallia australi ♃.

1379 EUPHORBIA PTERICOCCA. *Bot. Phyt.* — *Euphorbia bialata. Link.* — Habitat in collibus calcareis Lusitaniae mediae ①.

1380 EUPHORBIA SEGETALIS. *Linn. Brot.* — Habitat in maritimis sabulosis et inter segetes Lusitaniae, sicut alibi in Europa media et australi, Africa bor. ①.

1381 POINSETHIA PULCHERRIMA. *Bot. Mag.* — *Euphorbia pulcherrima. Willd.* — Habitat in Mexico ♄.

1382 MERCURIALIS ANNUA. *Linn. Brot.* — *Mercurial.* — Habitat in Europa; in hortis, arvis, cultis Lusitaniae borealis ①.

1383 MERCURIALIS ELLIPTICA. *Lam. Brot.* — Habitat in Lusitaniae Transtagana occidentali, Madera, et Insulis balearicis ♄.

1384 CROZOPHORA TINCTORIA. *Adr. Juss.* — *Croton*

tinctorum. Linn. Brot. — *Tornasol'dos Francezes.* — Habitat in arvis, et incultis circa Pacem Juliam in Transtagana, et ad fluvium *Anam* inter *Alcoutim* et *Castro-Marim;* alibi in Europa australi, et Africa boreali ①.

1385 Ricinus communis. *Linn. Brot.* — *Carrapateiro, Catapucia maior, Mammona, Figueira do Inferno.* — Var. Ins. Cap. Viridis. — *Baforeira.* — Habitat in India orientali; in Lusitania fere spontanea ① ② ♄ ♄.

1386 Aleurites triloba. *Forst.* — *Jatropha moluccana. Linn.* — Habitat in Ins. Societ. et Moluccis ♄.

1387 Jatropha multifida. *Linn.* — Habitat in America australi ♃.

1388 Phyllanthus Niruri. *Linn.* — Habitat in India orientali ①.

1389 Cluytia pulchella. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

1390 Buxus sempervirens. *Linn. Brot.* — *Buxo.* — Habitat in Europa australi; ad Lusitaniae rivulos inter *Figueiró* et *Thomar* ♄ ♄.

ORDO.

CUPULIFERAE.

TRIBUS.

Coryleae.

1390 Corylus Avellana. *Linn. Brot.* — *Aveleira.* — Habitat per Europam omnem, in Asia boreali, et

Japonia; Lusitania praesertim in provinciis borealibus ♄.

TRIBUS.

Quercineae.

1391 Quercus Suber. *Linn. Brot.* — *Sobreiro, Sobro.* — Habitat per totam Lusitaniam in collibus calcareis, sabulosis, aut argilloso-sabulosis, sicut alibi in Europa australi, et Africa boreali ♄.

1392 Quercus Ilex. *Linn. Brot.* — *Azinheira, Azinho.* — Habitat in Europa australi, Africa boreali; in Lusitania frequens ♄.

1393 Quercus coccifera. *Linn Brot.* — *Carrasco, Carrasqueiro.* — Habitat in regione mediterranea; frequens in collibus calcareis aut argilloso-calcareis Lusitaniae ♄.

1394 Quercus robur. *Linn. Brot.* — *Carvalho roble.* — Habitat in montosis Lusitaniae borealis, et alibi in Europa ♄.

1395 Quercus racemosa. *Lam. Brot.* — *Quercus pedunculata. Willd.* — *Carvalho commum.* — Habitat in montosis Lusitaniae borealis, et alibi in Europa ♄.

TRIBUS.

Fagineae.

1396 Fagus sylvatica. *Linn.* — Habitat in Europa et Asia boreali ♄.

1397 Castanea vesca. *Gaertn.* — *Fagus Castanea.*

Linn. Brot. — *Castanheiro.* — Habitat in regione mediterranea; Lusitaniae sylvas vastas, vulgo *Soutos*, efferunt in *Serra de Monchique, de Portalegre, de Cintra*, et aliis regionibus montanis ♄.

ORDO.

PLATANEAE.

1398 Platanus orientalis. *Linn.* — *Platano.* — Habitat in Oriente; in Lusitania, ubi laetatur, vulgaris ♄.

1399 Platanus orientalis. *Linn.* — *Var. acerifolia. Ait.* — *Platanus acerifolia. Willd.* — *Platano de Hespanha.* — Habitat in Asia minori ♄.

ORDO.

CYNOCRAMBEAE.

1400 Thelygonum Cynocrambe. *Linn.* — Habitat in regione mediterranea ①.

ORDO.

SALICINEAE.

1401 Salix alba. *Linn.* — *Salgueiro branco ordinario.* — Habitat in aquosis Europae, Asia minori, Sibiria; in Lusitania vulgaris ♄.

1402 Salix Babylonica. *Linn.*—*Salgueiro chorão, ou Chorão.* — Habitat in Oriente; in humentibus Lusitaniae culta ♄.

1403 Salix viminalis. *Linn.* — *Vimeiro do Norte, ou Salgueiro Francez.* — Habitat ad ripas et in dumetis humidis Europae; culta in Lusitania praesertim provinciis borealibus ♄.

1404 Salix vitellina. *Linn.* — *Vimeiro ordinario.* — Habitat in Europae aquosis; in omni fere Lusitania ♄.

1405 Populus alba. *Linn.* — *Alemo ordinario, branco, ou alvar, Choupo branco, Faya branca.* — Habitat in Europa; spontanea ad fluvios Lusitaniae ♄.

1406 Populus tremula. *Linn.* — *Faya preta, ou Alemo Lybico.* — Habitat in Europa fere omni; ad rivulos Lusitaniae quasi spontanea ♄.

1407 Populus nigra. *Linn.* — *Choupo ordinario ou negro, Alemo negro.* — Habitat in Europa fere omni, Asia minori, Sibiria; spontanea ad fluvios Lusitaniae ♄.

1408 Populus canadensis. *Michx.*—*Choupo do Canadá.* — Habitat in Canada ♄.

ORDO.

CELTIDEAE.

1409 Celtis australis. *Linn. Brot.* — *Lodão bastardo, ou Agreira.* — Habitat in Europa australi, et Africa boreali; Lusitania ad sepes et alibi in provinciis borealibus ♄ ♄.

1410 Celtis occidentalis. *Linn* — Habitat in America boreali et tropica ♄.

ORDO.

CANNABINEAE.

1411 Cannabis sativa. *Linn.* — *Cannamo, ou Linho cannamo.* — Habitat in India orientali; colitur Lusitania boreali ①.

1412 Humulus Lupulus. *Linn. Brot.* — *Lupulo, Luparo, ou Pé de Gallo.* — Habitat in sepibus, et ad vias montanas Europae, et Americae borealis; Lusitania in Beira, et Duriminia ♃ ⌣.

ORDO.

URTICACEAE.

1413 Urtica Lusitanica. *Brot.* — *Urtiga menor caudada.* — Habitat frequens in hortis Lusitaniae, ad vias, et alibi in subumbrosis ①.

1414 Urtica urens. *Linn. Brot.* — *Urtiga menor.* — Habitat in cultis Europae totius; in Lusitania frequens ①.

1415 Urtica morifolia. *Poir.* — Habitat in Insulis canariensibus ♃.

1416 Boehmeria nivea. *Gaudichaud.* — *Urtica nivea. Linn.* — Habitat in India orientali ♃.

1417 Parietaria officinalis. *Linn. Brot.* — *Parietaria, ou Alfavaca de cobra.* — Habitat in ruderatis Europae totius; frequens in tota Lusitania ♃.

1418 Parietaria lusitanica. *Linn. Brot.* — Habitat in umbrosis erectioribus Lusitaniae borealis, et alibi in Europa australi, Caucaso, Sibiria ①.

ORDO.

MOREAE.

1419 Ficus Carica. *Linn.* — *Figueira ordinaria.* — Habitat in Asia minori, Africa boreali, et per Europam australem maxime diffusa; culta in Lusitania, spontanea, et vulgarissima ♄.

1420 Ficus laurifolia. *Lam.* — *Figueira do Brasil.* — Habitat in India occidentali ♄.

1421 Ficus bengalensis. *Linn.* — Habitat in India orientali ♄.

1422 Ficus Benjamina. *Linn.* — *Figueira de Gôa.* — Habitat in India orientali ♄.

1423 Ficus elastica. *Roxb.* — Habitat in India orientali ♄.

1424 Ficus stipulata. *Thunb.* — *Figueira da China.* — Habitat in China, Japonia ♄.

1425 Ficus indica. *Vahl.* — Habitat in India ♄.

1426 Morus nigra. *Linn.* — *Amoreira negra.* — Habitat in Persia, passim culta ♄.

1427 Morus alba. *Linn.* — *Amoreira branca.* — Habitat in China, passim culta ♄.

1428 Morus multicaulis. *Perrottet.* — Habitat in

China, passim culta. Ex Endlincher Morus multicaulis. *Perr.*, ut subsequens, varietas Mori albi ♄.

1429 Morus macrophyla. *Moretti.* — Habitat in China ♄.

1430 Broussonetia papyrifera. *Vent.* — *Morus papyrifera. Linn.* — *Arvore do papel.* — Habitat in China, Japonia, et Oceani Insulis ♄.

1431 Maclura aurantiaca. *Nutt.* — Habitat in America boreali, territorio Arkansano ♄.

ORDO.

ULMACEAE.

1432 Ulmus campestris. *Linn.* — *Ulmo, Ulmeiro.* — Habitat passim in sylvis Europae, Africa boreali; in Lusitania frequens ♄.

ORDO.

BETULACEAE.

1433 Betula alba. *Linn. Brot.* — *Vidoeiro.* — Habitat in Europa, et Africa boreali; Lusitania in montosis sylvaticis *Gerez*, *Marão*, et alibi in Interamnia et Transmontana ♄.

1434 Betula excelsa. *Ait.* — Habitat in America boreali ♄.

1435 Alnus glutinosa. *Gaertn.* — Habitat Europae, Asiae, Americae, et Africae borealis in paludo-

sis, et ad fluvios; Lusitania praesertim in provinciis borealibus ♄.

ORDO.

MYRICEAE.

1436 Myrica Faya. *Ait. Brot.* — *Samôco, ou Faya das Ilhas.* — Habitat Lusitania in Algarbiis, Madera, Azoricis ♄.

1437 Myrica gale. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa, et America boreali; Lusitania in paludosis prope *S. Martinho* ♄.

1438 Myrica cerifera. *Linn* — Habitat in America boreali ♄.

1439 Myrica Pensylvanica. *Lam.* — Habitat in America boreali ♄.

1440 Myrica quercifolia. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

ORDO.

CASUARINEAE.

1441 Casuarina equisetifolia. *Labill.* — Habitat in India orientali, et Nova-Caledonia. Magnificum et vetustissimum specimen existit prope Olisiponem in horto *Duque de Lafões* loco *do Grillo*, ubi vocatur *Arvore da tristeza.* ♄

Arvores de interesse publico

A folha oficial publicou ontem despachos considerando de interêsse publico o «Schinus Molle L.» existente num quintal do Asilo de S. João e um pinheiro manso da quinta de Camarate.

Diario de Noticias de 19-[illegible]-1945

Cimenteira.

pervirens. α. Linn. — *Cypreste.* — Habitat in regione mediterranea ♄.

1450 Cupressus horisontalis. *Mill.* — *Cupressus sempervirens. β. Linn.* — *Cypreste de ramos horisontaes.* — Habitat in regione mediterranea ♄.

1451 Cupressus horisontalis. *Mill.* — *β. pendula. Endl.* — *Cupressus horisontalis pendula. Hort.* — Habitat in Creta, Bithynia, et Persia ♄.

1452 Cupressus glauca. *Lam. Brot.* — *Cupressus Lusitanica. Tourn.* — *Cedro de Gôa.* — Habitat in India; spontanea in Lusitania, praesertim in montosis *Bussaco* ♄.

1453 Taxodium sempervirens. *Lam.* — Habitat in America boreali ♄.

1454 Cryptomeria Japonica. *Don.* — *Cupressus Japonica. Linn.* — Habitat in Japonia, et China ♄.

ORDO.

ABIETINEAE.

1455 Pinus sylvestris. *Linn.* — *Pinheiro bravo do norte.* — Habitat in maritimis Europae usque ad 70° L. B., in Asia usque ad 63° L. B. ♄.

1456 Pinus pinaster. *Solander.* — *Pinus maritima. Lam. Brot* — *Pinheiro bravo do Reino.* — Habitat in maritimis Europae usque ad 48° L. B., et 2800′ elevationem adscendens in Appeninis; culta et spontanea in collibus macris et arenosis totius fere Lusitaniae ♄.

1457 Pinus haleppensis. *Ait.* — Habitat in Europa et Asia mediterranea ♄.

1458 Pinus pinea. *Linn Brot.* — *Pinheiro manso,*

Pinheiro manso mollar.—Habitat in Europa et Africa mediterranea; spontanea in arenosis Lusitaniae ♄.

1459 Pinus Laricio. *Poiret.* — *Pinus haleppensis. Bieberst.* — *Pinus austriaca. Hocs Anleit.*— *Pinus altissima, P. carmanica, P. calabrica, P. romana, P. taurica, P. tatarica, et Pin d'Ecosse. Hort.* — Habitat in Europa australi et orientali, in Tauria, usque ad 8300′ elevationem adscendens ♄.

1460 Pinus strobus. *Linn.* — Habitat in America boreali ♄.

1461 Pinus Abies. *Du Roi.* — *Abies taxifolia. Desf.* — *Abies pectinata. D. C.* — *Pinus picea. Linn.*—Habitat in Europa media et australi, usque ad 4500′ elevationem adscendens ♄.

1462 Pinus picea. *Du Roi.* — *Pinus excelsa. Lam.* — *Pinus abies. Linn.* — *Abies excelsa. D. C.* — *Pinheiro alvar, Abeto maior.* — Habitat in Europa et Asia usque ad 7000′ elevationem adscendens ♄.

1463 Pinus Pinsapo. *Endl.*—*Abies Pinsapo. Boiss.* —Habitat in *Sierra nevada*, et montibus *Ronda* Hispaniae australioris ♄.

1464 Pinus Cedrus. *Linn.* — *Cedrus Libani. Barrel.* — *Cedro do Libano.* — Habitat in Oriente, et in Atlante ♄.

1465 Pinus microcarpa. *Lamb.* — *Larix americana. Michx.* — Habitat in America boreali inter 45° et 50° sylvas vastas efformans ♄.

1466 Araucaria Brasiliensis. *Lamb.*—Habitat in Brasilia ♄.

1467 Araucaria imbricata *R. et Pav.* — Habitat in Chili ♄.

1468 Eutacta excelsa. *Endl.*— *Araucaria excelsa. R. Br.* — Habitat in Insula Norfolk ♄.

ORDO.

TAXINEAE.

1469 Taxus baccata. *Linn. Brot.* — *Teixo.* — Habitat in Europa, et Sibiria; Lusitania in Herminio et *Gerez* ♄.

1470 Salisburia adiantifolia. *Smith.* — *Ginkgo biloba. Linn.* — *Arvore dos quarenta escudos.* — Habitat in China ♄.

ORDO.

CYCADEAE.

1471 Cycas revoluta. *Thunb.* — Habitat in Japonia, et China ♄.

1472 Cycas circinalis. *Linn.* — Habitat in India orientali ♄.

MONOCOTYLEDONEAE.

ORDO.

PALMAE.

1473 Chamaerops humilis. *Linn. Brot.* — *Palmeira das vassoiras.* — Habitat in regione mediterranea: in collibus et dumetis Algarbiorum frequens ♄.

1474 PHOENIX DACTILIFERA. *Linn.* — *Palmeira da Igreja, ou Tamareira.* — Habitat in regione mediterranea ♄.

1475 COCOS NUCIFERA. *Linn.* — *Coqueiro.* — Habitat in India ♄.

ORDO.

TYPHACEAE.

1476 TYPHA LATIFOLIA. *Linn. Brot.* — *Tabúa larga.* — Habitat in aquis stagnantibus et fluviis Europae totius, et Africae borealis; in Lusitania australiori ♃.

1477 TYPHA ANGUSTIFOLIA. *Linn. Brot.* — *Tabúa estreita.* — Habitat cum praecedenti ♃.

1478 SPARGANIUM RAMOSUM. *Hudson.* — *Sparganium erectum. Linn. Brot.* — Habitat in fossis et aquis lente fluentibus Europae totius, et Africae borealis; in Lusitania praesertim prope Conimbricam, etiam ad rivulum *de Bellas* (Welw.) ♃.

ORDO.

AROIDEAE.

1479 ARUM VULGARE. *Brot.* — *Arum maculatum. Linn.* — *Jarro, ou Pé de bezerro.* — Habitat in humidis umbrosis Europae totius, et Africa boreali; in Lusitania vulgarissimum ♃.

1480 ARUM ITALICUM. *Lam.* — *Arum vulgare. β. Brot.* — *Jarro, ou Pé de bezerro.* — Habitat in umbrosis regionis mediterraneae ♃.

1481 ARISARUM VULGARE. *Targioni.* — *Arum Ari-*

sarum. Linn. Brot. — *Arisaro, ou Capuz de Fradinho.* — Habitat in nemoribus regionis mediterraneae; in Lusitania frequens ♃.

1482 Colocasia antiquorum. *Schot.* — *Arum Colocasia. Linn.* — *Colocasia, ou Inhame do Egypto.* — Habitat in aquosis Aegypti, Syriae, et Cretae; spontanea in Lusitania ad rivos *de Monchique* in Algarbiis. In Azoricis et Madera valde culta ♃.

1483 Dracunculus vulgaris. *Schot.* — *Arum Dracunculus. Linn.* — *Serpentina, ou Serpentaria vulgar.* — Habitat in Europa australi. In Azoricis valde culta ♃.

1484 Richardia aethiopica. *Kunth.* — *Zantedeschia aethiopica. Spreng.* — *Calla aethiopica. Linn.* — Habitat ad rivulos Cap. B. Spei, et St. Helenae ♃.

1485 Acorus Calamus. *Linn.* — Habitat in inundatis uliginosis Europae totius, et Sibiriae ♃.

ORDO.

NAJADEAE.

1486 Potamogeton natans. *Linn. Brot.* — Habitat in aquis stagnantibus et lente fluentibus orbis fere totius; in Lusitania frequens, etiam in summis jugis Herminii aquis *Lagôa Longa* (Welw.) ♃.

ORDO.

ALISMACEAE.

1487 Alisma plantago. *Linn.* — *Tanchagem d'agua*

— Habitat in fossis et aquis stagnantibus Europae totius, et Asiae mediae; Lusitaniae frequens ♃.

1488 Triglochin palustre. *Linn. Brot.* — Habitat uliginosis et paludosis hemisphaerae borealis in regionibus temperatis; Lusitaniae prope *Setubal* ♃.

1489 Triglochin maritimum. *Linn. Brot.* — Habitat in maritimis Europae totius, et Americae borealis, nec non in lacubus salsis Hungariae et Asiae borealis; Lusitaniae prope *Aveiro* ♃.

1490 Sagittaria sagittaefolia. *Linn. Brot.* — Habitat in aquis stagnantibus et lente fluentibus Europae totius, Asiae et Americae borealis; Lusitaniae ad Mundam, et alibi ♃.

ORDO.

BUTOMACEAE.

1491 Butomus umbellatus. *Linn. Brot.* — Habitat in fossis et aquis lente fluentibus Europae totius; Lusitaniae ad Durium, Tagum, et Mundam ♃.

ORDO.

ORCHIDEAE.

TRIBUS.

Epidendreae.

1492 Epidendrum elongatum. *Jacq.* — Habitat ad *Caracas* ♃.

TRIBUS.

Ophrideae.

1493 Orchis Morio. *Brot.* — *Orchis Morio. Linn.?* — Habitat Lusitaniae in Transtagana, Extremadura prope *Loires*, etiam (Welw.) in pinetis densis *da Serra da Arrabida*, sed raro, in ericetis macris prope *Cabo de Espichel* et *Alferim*, frequens prope *Coina* in pinetes arenosis (Fl. Lus. exsic. Welw. in Museo Acad. Scient. Olis.) ♃.

1494 Orchis maculata. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa media, et boreali; Lusitaniae borealis, in jugis *de Miranda* et *Gerez*, ad rivulos, et sepes ♃.

1495 Orchis longibracteata. *Bivon.* — Habitat in Sicilia, Gallia, Creta, Caucaso, et Madera; Lusitaniae etiam, ex Cl. Welw., trans Tagum, et in agris olisiponensibus, olivetis densis *da Tapada da Ajuda* (Fl. Lus. exsic. Welw. in Museo Acad. Scient. Olis.) ♃.

1496 Orchis longicruris. *Brot. Phyt. Link.* — *Orchis simia. Lam.* — *Flor dos rapazinhos ou dos macaquinhos dependurados.* — Habitat in *Cintra*, etiam (Welw.) in pratis sylvaticis *da Serra de S. Luiz*, et alibi Lusitania media, Europa australi, Anglia ♃.

1497 Orchis papilionacea. *Brot. Phyt.* — Habitat Lusitaniae prope *Setubal*, et *Azeitão* (Link, Welw.), etiam prope *Loires* (Welw.), et *Elvas* in Transtagana, unde nobis advenerunt specimina viva; et alibi in regione mediterranea ♃.

1498 Orchis conica. *Brot. Phyt.* — *Orchis globosa.*

Brot. — Habitat Lusitaniae prope *Setubal*, *Bellas*, *Cintra*, et alibi in Extremadura; in Europa media et australi ♃.

1499 Anacamptis pyramidalis. *Rish.* — *Orchis pyramidalis. Linn. Brot.* — *Satyrião menor.* — Habitat in Europa media et australi, Caucaso; Lusitaniae prope *Bellas*, *Loires*, et alibi frequens ♃.

1500 Cephalanthera ensifolia. *Rich.* — *Serapias grandiflora. Brot.* — Habitat in Europa et Africa boreali; Lusitaniae ad basim *da Serra de Cintra*, et *Serra da Arrabida*, prope *Portinho* sparsim (Welw.), et in Beira boreali ♃.

1501 Himantglossum antropophorum. *Spreng.* — — *Aceras antropophora. R. Br.* — *Ophrys antropophora. Brot.* — Habitat in Europa australi, et Anglia; Lusitaniae circa *Bellas*, Conimbricam, et alibi, in *Serra de Cintra* super *Collares* sparsim (Welw.) ♃.

1502 Ophrys arachnitis. *Brot.* — *Herva aranha.* — Habitat prope Conimbricam, et alibi Lusitaniae ♃.

1503 Ophrys tenthredinifera. *Brot. Phyt.* — Habitat in *Serra da Arrabida*, et alibi Extremadura ♃.

1504 Ophrys ciliata. *Bivon.* — *Ophrys vernixia. Brot.* — *Ophrys scolopax. Brot. Phyt.* — *Ophrys speculum. Link.* — *Herva abelha.* — Habitat Sicilia, et Lusitaniae in montibus calcareis prope Conimbricam, in decliviis graminosis *da Serra da Amoreira*, et prope *Bellas* (Welw.) ♃.

1505 Ophrys lutea. *Brot. Phyt.* — *Ophrys vespifera. Brot.* — *Herva vespa.* — Habitat in Hispania, Gallia australi, Sicilia, et Lusitaniae circa *Bellas*, *Cintra*, et alibi frequens ♃.

1506 Serapias Lingua. *Linn. Brot.* — Habitat in

Europa australi, Africa boreali; Lusitaniae in Beira, Extremadura, Algarbiis, et frequens agro *de Cintra* ♃.

1507 SERAPIAS CORDIGERA. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa australi, Caucaso, Africa boreali; Lusitaniae in Beira boreali, *Serra de Cintra*, etiam (Welw. inter *Grandula* et *Alcacer do Sal* frequens ♃.

1508 SPIRANTHES AUTUMNALIS. *Rich.* — *Ophrys spiralis. Linn. Brot.* — Habitat in Europa; Lusitaniae frequens, in collibus praesertim calcareis ♃.

ORDO.

ZINGIBERACEAE.

1509 ZINGIBER OFFICINALIS. *Rosc.* — *Amomum zingiber. Linn.* — Habitat in India orientali ♃.

1510 CURCUMA LONGA. — Habitat in India orientali ♃.

1511 HEDYCHIUM CORONARIUM. *Koenig.* — Habitat in India orientali ♃.

ORDO.

CANNACEAE.

1512 CANNA INDICA. *Ait.* — *Herva conteira.* — Habitat in India ♃.

1513 CANNA ARGENTIFOLIA. *Linn.* — Habitat in Brasilia ♃.

1514 CANNA GLAUCA Linn — Habitat in India occidentali ♃.

1515 CANNA LUTEA. *Rosc.* — Habitat in India orientali ♃.

1516 CALATHEA ZEBRINA. *Dov.* — *Maranta zebrina. Sims.* — Habitat in Brasilia ♃.

ORDO.

MUSACEAE.

1517 MUSA PARADISIACA. *Linn.* — *Bananeira.* — Inter tropicos ubique culta innumeris varietatibus ♃.

1518 MUSA COCCINEA. *Andr.* — Habitat in China ♃.

1519 MUSA SAPIENTUM. *Linn.* — *Bananeira.* — Habitat in India orientali ♃.

ORDO.

IRIDEAE.

1520 TIGRIDIA PAVONIA. *Juss.* — Habitat in Mexico ♃.

1521 FERRARIA UNDULATA. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1522 GALAXIA GRAMINEA. *Thunb.* — *Ixia fugacissima. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1523 SISYRINCHIUM BERMUDIANA. *Linn.* — Habitat in Bermudis ♃.

1524 SISYRINCHIUM ANCEPS. *Lam.* — Habitat in America boreali ♃.

1525 Crocus sativus. *Linn.* — *Açafrão.* — In Oriente spontanea ♃.

1526 Crocus vernus. *Willd.* — *Açafrão da primavera.* — Habitat in Europa media, et austro-orientali; Lusitaniae in provinciis borealibus ♃.

1527 Crocus serotinus. *Gay.* — *Crocus autumnalis. Brot.* — Habitat in pascuis macris *da Serra de Monsanto*, circa *Caldas do Gerez* (Welw.), prope *Cintra, Bellas*, et alibi Lusitaniae, Europae australis ♃.

1528 Trichonema Bulbocodium. *Ker.* — *Ixia Bulbocodium. Linn.* — Habitat in regione mediterranea; Lusitaniae prope Olisiponem, (Welw.) in ericetis macris Transtaganae circa *Porta da Apostiça*, et alibi ♃.

1529 Watsonia iridifolia. *Ker.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1530 Watsonia rosea. *Ker.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1531 Gladiolus tristis. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1532 Gladiolus segetum. *Ker.* — *Gladiolus communis. Lam. Brot.* — *Espadana dos montes ou das searas.* — Habitat in Europa media et australi; Lusitaniae in agris, montosis, segetibus frequens ♃.

1533 Gladiolus trimaculatus. *Wahl.* — *Gladiolus blandus. Ait.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1534 Antholyza aethiopica. *Linn.* — *Antholyza da Ethiopia.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1535 Tritonia viridis. *Ker.* — *Gladiolus viridis. Ait.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1536 Tritonia fenestrata. *Ker.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1537 Tritonia longiflora. *Ker.* — *Gladiolus longiflorus. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1538 Babiana sulphurea. *Ker.*—Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1539 Babiana villosa. *Ker.* — *Ixia villosa. Ait.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1540 Ixia conica. *Salisb.*—Habitat ad Cap. B. Sp. ♃.

1541 Sparaxis tricolor. *Ker.*—*Ixia tricolor. Curt.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1542 Sparaxis grandiflora. *Ker.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1543 Sparaxis liliago. *Ker.*—Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1544 Moraea bulbifera. *Jacq.* —*Sparaxis bulbifera. Ker.*—*Ixia bulbifera. Linn.*—Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1545 Moraea Sisyrinchium. *Ker.* — *Iris Sisyrinchium. Linn.*—Habitat in Europa australi, Lusitaniae australioris vulgarissima, etiam in Mauritania ♃.

1546 Moraea pavonia. *Ker.* — *Iris pavonia. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1547 Iris Xiphium. *Linn. Brot. Phyt.*—*Lirio malhado amarello* —Habitat Lusitaniae prope *Alcantara* et alibi, in Hispania, Mauritania ♃.

1548 Iris Lusitanica. *Ker.* — *Iris juncea. Brot.* — Habitat in collibus *Alcantara*, et alibi Lusitania media ♃.

1549 Iris tuberosa. *Linn.* — *Hermodactylo bastardo.* — Habitat in Europa australi, et Oriente ♃.

1550 Iris Pseudoacorus. *Linn.* — *Lirio amarello dos charcos, Acoro bastardo.* — Habitat in paludosis, et fossis Lusitaniae trans et citra Tagum, ut in tota Europa, et Sibiria; etiam in Mauritania ♃.

1551 Iris setosa. *Pall.* —*Iris brevicuspis. Schult.* — Habitat in Sibiria ♃.

1552 Iris foetidissima. *Linn.* — *Lirio fetido.* — Habitat in Europa media, et australi, etiam in Mauritania ♃.

1553 Iris germanica. *Linn.* — *Lirio rôxo dos montes.* — Habitat in Europa media et australi ♃.

1554 Iris pallida. *Lam.* — *Iris odoratissima. Jacq.* — Habitat in Italia, Graecia ♃.

1555 Iris sambucina. *Linn. Brot.* — *Lirio cardano.* — Habitat in Lusitania boreali, et alibi Europa australiori ♃.

1556 Iris chinensis. *Curtis.* — *Lirio da China.* — Habitat in China, et India orientali ♃.

1557 Iris subbiflora. *Brot. Phyt.* — *Lirio rôxo.* — Habitat in Lusitania media solo calcareo, in *Serra do Monsanto* frequens (Welw.) ♃.

1558 Iris aphylla. *Vahl.* — *Iris Swertii. Lam.* — Patria ignota ♃.

1559 Iris florentina. *Linn.* — *Lirio florentino.* — Habitat in Europa australi ♃.

1560 Iris Transtagana. *Brot.* — *Iris alata. Lam.* — Habitat Lusitaniae in Transtagana prope *Elvas*, et *Evora*, in argilosis; etiam alibi Europa australi, et Africa boreali ♃.

ORDO.

AMARYLLIDEAE.

TRIBUS.

Alstroemerieae.

1561 Alstroemeria peregrina. *Linn.* — *Peregrina*

do Perú. — Habitat Peruvia, et Chili in maritimis ♃.

1562 Alstroemeria Ligtu. *Spreng.* — Habitat in Lima ♃.

TRIBUS.

Amarylleae.

1563 Leucojum autumnale. *Linn. Brot.* — Habitat frequens ad vias, in dumetis, collibusque totae Lusitaniae, Europae australis ♃.

1564 Leucojum trichophyllum. *Brot.* — *Leucojum grandiflorum. Red.* — Habitat Lusitaniae trans Tagum, (Welw.) ad locum dictum *As Vendas*, et *Valle do Pexeleiro*, in Algarbiis prope *Lagôa da Albufeira*; etiam in Numidia ♃.

1565 Sternbergia lutea. *Schult.* — *Amaryllis lutea. Linn.* — Habitat in Europa meridionali, Tauria, et Asia minore ♃.

1566 Haemanthus coccineus. *Linn.* — *Flor de sangue, ou Orelha de elephante.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1567 Haemanthus puniceus. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1568 Amaryllis formosissima. *Linn.* — *Flor de Liz, ou Cruz de S. Jacques.* — Habitat in America tropica, et Insula St. Helena ♃.

1569 Amaryllis vittata. *Ait.* — Habitat in America tropica ♃.

1570 Amaryllis Reginae. *Linn.* — *Bordão de S. José.* — Habitat in Caribaeis, Mexico, Peruvia ♃.

1571 Amaryllis Belladona. *Linn.* — *Belladona.*

—Habitat verisimiliter ad Cap. B. Spei, Insulis Azoricis et Madera quasi spontanea, in hortis Lusitaniae vulgarissima ♃.

1572 Amaryllis sarniensis. *Linn.* — *Racheis.* — Habitat ad Cap. B. Spei, et Japonia ♃.

1573 Amaryllis aurea. *Ait.* — *Amaryllis dourada.* — Habitat in China ♃.

1574 Amaryllis longifolia. *Ait.*—Habitat in Africa australi ♃.

1575 Brunsvigia Josephina. *Ker.* — *Amaryllis Josephina. Redonté.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1576 Crinum insignis. *Ker.* — *Amaryllis zeylanica. Linn.* — Habitat in India orientali ♃.

1577 Crinum amabile. *Don.* — Habitat in Bengala ♃.

TRIBUS.

Narcisseae.

1578 Pancratium maritimum. *Linn.* — Habitat in littoribus mediterraneis; Lusitaniae frequens trans Tagum ♃.

1579 Pancratium Caribaeum. *Linn.* — Habitat in Insulis Caribaeis ♃.

1580 Narcissus bulbocodium. *Linn. Brot.* — Habitat in Lusitania, Hispania, Pyrennaeis ♃.

1581 Narcissus Pseudo-Narcissus. *Linn. Brot.* — *Narciso, ou Narcisso trombeta.* — Habitat in Europa, et Tauria; Lusitaniae praesertim Herminio ♃.

1582 Narcissus Tazetta. *Linn.* — *Narciso ou Narcisso de inverno.* — Habitat in regione mediterranea; Lusitaniae in Extremadura australi ♃.

TRIBUS.

Agaveae.

1583 Agave americana. *Linn.* — *Piteira.* — Habitat in America tropica; quasi spontanea Lusitaniae, Italiae, et alibi regione mediterranea ♃.

1584 Agave vivipara. *Linn.* — Habitat Mexico; Lusitaniae quasi spontanea in Algarbiis ♃.

ORDO.

BROMELIACEAE.

1585 Bromelia acanga. *Linn.* — *Caraguata dos Brasileiros.* — Habitat in Brasilia ♃.

1586 Bromelia ananas. *Linn.* — *Ananassa sativa. Lindl.* — *Ananás.* — Habitat in India occidentali ♃.

1587 Bromelia humilis. *Jacq.* — Habitat verisimiliter in Mexico ♃.

1588 Pitcairnia bromeliaefolia. *Herit.* — Habitat in Jamaica ♃.

ORDO.

LILIACEAE.

TRIBUS.

Aloineae.

1589 Aloe imbricata. *Haw.* — *Aloe spiralis. Linn.*

— *Aloe cylindracea α. Lam.* — *Haworthia imbricata. Haw.* — *Apicra imbricata. Willd.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

1590 Aloe pentagona. *Haw.* — *Aloe spiralis β. pentagona. Ait. Willd.* — *Haworthia pentagona. Haw.* — *Apicra pentagona. Willd.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

1591 Aloe viscosa. *Linn.* — *Haworthia viscosa. Haw.* — *Apicra viscosa. Willd.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

1592 Aloe margaritifera. *Ait.* — *Aloe pumila β. Linn.* — *Haworthia margaritifera. Haw.* — *Apicra margaritifera β. major. Willd.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

1593 Aloe erecta. *Roem. et Schult.* — *Aloe pumila β. Linn.* — *Aloe margaritifera β. minor. Willd. Ait.* — *Haworthia erecta. Haw.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1594 Aloe retusa. *Linn.* — *Haworthia retusa. Haw.* — *Aprica retusa. Willd.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1595 Aloe arachnoides. *Mill.* — *Aloe pumilla δ. arachnoidea. Linn.* — *Haworthia arachnoides. Haw.* — *Apicra arachnoides. Willd.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1596 Aloe humilis. *Lam.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1597 Aloe depressa. *Haw.* — *Aloe perfoliata ζ. Linn.* — *Aloe Serra. Willd.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

1598 Aloe prolifera. *Haw.* — *Aloe brevifolia. Haw. Willd.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

1599 Aloe barbadensis. *Mill.* — *Aloe vulgaris.*

Lam. — *Aloe perfoliata vulgaris. Aubl.* — *Herva babosa.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

1600 ALOE RUBESCENS. *D. C.* — *Aloe vera. Lam.* — Habitat in Indiis ♄.

1601 ALOE VARIEGATA. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1602 ALOE SOCCOTORINA. *Lam.* — *Aloe perfoliata ξ. Linn.* — Habitat in Soccotora; culta in *Barbados* ♄.

1603 ALOE SAPONARIA. *Haw.* — *Aloe perfoliata θ. Aloe picta. Ait.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

1604 ALOE COMMELYNI. *Willd.* — *Aloe mitraeformis α. Lam.* — *Aloe mitraeformis. D. C.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

1605 ALOE ARBORESCENS. *Mill.* — *Aloe perfoliata η. Willd.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

1606 ALOE FEROX. *Lam.* — *Aloe perfoliata γ. Linn.* — *Pachydendron ferox. Haw.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

1607 ALOE PLICATILIS. *Mill.* — *Aloe disticha ε. Linn.* — *Rhipidodendron plicatile. Hāw.* — *Aloe em leque.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

1608 ALOE LINGUA. *Willd.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1609 ALOE CARINATA. *Mill* — *Aloe disticha β. Linn.* — *Gasteria carinata. Haw.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1610 ALOE VERRUCOSA. *Mill.* — *Aloe disticha β. Linn.* — *Aloe carinata. D. C.* — *Gasteria verrucosa. Haw.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1611 KNIPHOFIA ALOIDES. *Moench.* — *Tritoma uvaria. Gawl.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1612 YUCCA GLORIOSA. *Linn.* — *Palmitos.* — Habitat in America boreali, et Peruvia ♄.

TRIBUS.

Hemerocallideae.

1613 Phormium tenax. *Linn.* — *Linho da Nova-Zelandia, ou Espadana das Ilhas australes.* — Habitat in Nova-Zelandia, et Insula Norfolk ♃.

1614 Polianthes tuberosa. *Linn.* — *Angelica branca.* — Habitat inter tropicos Asiae et Americae ♃.

1615 Hemerocallis fulva. *Linn.* — *Formosa de um dia.* — Habitat in Europa australiori ♃.

1616 Hemerocallis flava. *Linn.* — Habitat in arvis Europae austro-orientalis, et Sibiriae ♃.

1617 Funkia ovata. *Spreng.* — *Hemerocallis caerulea. Ait.* — *Angelica do Japão.* — Habitat in Japonia ♃.

1618 Agapanthus umbellatus. *Herit.* — *Angelica azul.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1619 Agapanthus umbellatus. *Herit.* — *Var. variagatus. Hort.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

TRIBUS.

Hyacintheae.

1620 Veltheimia viridifolia. *Jacq.* — *Aletris capensis. Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1621 Bellevalia comosa. *Kunth.* — *Muscari comosum. Mill.* — *Hyacinthus comosus. Linn.* — Habitat in Europa australi et media, et regione mediterranea; Lusitaniae in arvis, et collibus herbidis passim ♃.

1622 Hyacinthus orientalis. *Linn.* — *Jacintho*

dos floristas. — Habitat in Oriente, Gallia littorali, et Barbaria ♃.

1623 Uropetalum serotinum. *Gawl.* — *Hyacinthus serotinus. Linn.* — Habitat in regione mediterranea ♃.

1624 Uropetalum serotinum β. *Gawl.* — *Hyacinthus serotinus. Brot.* — *Jacintho da tarde.* — Habitat Lusitaniae ad Tagum et *Zezere*, (Welw.) in Transtagana prope *Setubal*, Algarbiis prope *Faro;* etiam circa *Mogador* in *Marocco* ♃.

1625 Lachenalia pendula. *Ait.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

TRIBUS.

Scilleae.

1626 Allium sativum. *Linn.* — *Alho ordinario.* — Habitat in Sicilia, Gallo-provincia, Aegypto ♃.

1627 Allium Ampeloprasum. *Linn. Brot.* — *Alho porro bravo.* — Habitat in pratis nemorosis Europae totius, ut in tota Lusitania, etiam in Africa boreali ♃.

1628 Allium Porrum. *Linn.* — *Alho porro.* — Habitat in Lusitania, Hispania, Italia, Aegypto ① ♃.

1629 Allium ascalonicum. *Linn.* — *Chalottas ou Cebolinhas de França.* — Habitat in Syria, Asia minore, Palaestina; valde culta in Europa ♃.

1630 Allium cepa. *Linn.* — *Cebola hortense.* — Patria ignota ♃.

1631 Allium moschatum. *Linn.* — Habitat in Europa australi, Tauria, et Persia caspica ♃.

1632 Allium Victorialis. *Linn. Brot.* — Habitat in alpibus Europae mediae et australis, Caucasi, Si-

biriae, et Oriente; Lusitaniae Herminio in spongiosis super *Sabugueiro* (Welw.), sed raro ♃.

1633 Allium triquetrum. *Linn. Brot.* — *Alho triangular branco.* — Habitat in Europa meridionali, et Africa boreali; Lusitaniae prope *Setubal* in humidis *Serra de S. Luiz* (Welw.) ♃.

1634 Allium roseum. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa australi omni et regione mediterranea; Lusitaniae Extremadura, Beira, in asperis petrosis prope *S. Pedro* ad *Cintra* frequens (Welw.) ♃.

1635 Allium subhirsutum. *Linn. Brot.* — Habitat in Transtagana et Algarbiis Lusitaniae, ut in tota fere regione mediterranea, Persia, Teneriffa, et Cap. B. Spei? ♃.

1636 Allium magicum. *Linn. Brot. Phyt.* — Habitat Lusitaniae in collibus calcareis aut basalticis *Alcantara* et *Ajuda*; Europa australi, regione mediterranea ♃.

1637 Allium Broteri. *Kunth.* — *Allium Lusitanicum. Brot.* — *Chalottinhas do Gerez.* — Habitat in jugis *Gerez* Lusitaniae. Non confundendum cum Allio Lusitanico Lam., quae species diversa (Vid. Kunth. En. pl. t. 4. pg. 424 et 455) ♃.

1638 Nothoscordum fragrans. *Kunth.* — *Allium fragrans. Vent.* — *Allium inodorum. Ait.* — Habitat in America boreali, Mexico, Africa ♃.

1639 Eucomis undulata. *Ait.* — *Eucomis regia. Herit.* — *Ornithogalum undulatum. Thunb.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1640 Ornithogalum arabicum. *Brot. Phyt.* — Habitat in regione mediterranea, et Madera; Lusitaniae ad *Alcantara*, sed raro, prope *Cruz da Oliveira* in *Monsanto* (Welw.) ♃.

1641 Ornithogalum longebracteatum. *Jacq* — Habitat in Cap. B. Spei ♃.

1642 Ornithogalum lanceolatum. *Labill.* — Habitat in Syria ♃.

1643 Scilla autumnalis. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa occidentali et australi, Barbaria, Tauria; Lusitaniae in collibus siccis Extremadurae et Beirae, frequens in declivis *Serra do Monsanto* (Welw) ♃.

1644 Scilla hyacinthoides. *Linn. Brot.* — Habitat in regione mediterranea, Madera, et Insulis canariensibus; Lusitaniae prope Olisiponem in collibus basalticis *Alcantara* ♃.

1645 Scilla pumilla. *Brot. Phyt.* — *Scilla monophyllos. Link.* — Habitat Lusitaniae in dumetis sabulosis, ad sepes, trans Tagum, in Beira, et alibi ♃.

1646 Scilla Peruviana. *Linn. Brot.* — *Albarrãa do Perú.* — Habitat in regione mediterranea; Lusitaniae ad *Cintra* prope *S. Pedro* frequens (Welw.) ♃.

1647 Scilla cernua. *Hoffm. et Link.* — *Agraphis cernua. Reichenb.* — *Hyacinthus cernuus. Brot. Phyt.* — Habitat in Lusitania, Hispania; ad *Cintra, Arrabida, Setubal,* et alibi Lusitaniae mediae et borealis ♃.

1648 Urginea scilla. *Steinh.* — *Scilla maritima. Linn.* — *Ornithogallum maritimum. Lam.* — *Scilla, Cebôlla albarrãa.* — Habitat in omni regione mediterranea, et? ad Cap. B. Spei ♃.

1649 Urginea scilla. *β. Steinh.* — *Scilla maritiam. β. radice alba. Linn. Bauh. Pin.* — *Ornithogallum maritimum. Tourn. Brot.* — *Scilla, Cebôlla albarrãa.* — Habitat Lusitaniae passim in collibus maritimis, et alibi ♃.

TRIBUS.

Anthericeae.

1650 Asphodelus fistulosus. *Brot.* — *Asphodelus fistulosus. β. Linn.* — *Asphodelus fistulosus caule simplice. Gawl.* — Habitat frequens Lusitaniae solo macro, sicut in regione mediterranea passim Asphodelus fistulosus. Linn. ♃.

1651 Asphodelus ramosus. *Linn. Brot.* — Habitat in littoribus mediterraneis, et Insulis canariensibus; Lusitaniae prope Olisiponem, et alibi ♃.

1652 Cyanella capensis. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1653 Bulbine semibarbata. *Haworth.* — *Bulbine floribunda. Schrad.* — Habitat in Nova-Hollandia, Insula *von Diemen* ♃.

1654 Narthecium ossifragum. *Huds.* — *Anthericum ossifragum. Linn. Brot.* — Habitat ad rivos *Gerez* ♃.

TRIBUS.

Tulipaceae.

1655 Tulipa Celsiana. *Redouté.* — Habitat in Europa australi, Africa boreali ♃.

1656 Tulipa Transtagana. *Brot. Willd.* — *Tulipa Celsiana. α. Redouté.* — *Tulipa brava.* — Habitat trans Tagum in ericetis, regione boreali *Serra da Arrabida*, et prope *Villa Nova de Portimão* (Welw.) in pascuis et palmetis ♃.

1657 Tulipa Gesneriana. *Linn.* — *Tulipa grande*

dos jardins. — Habitat in Cappadocia, Tauria, Caucaso, Calabria, Etruria, Sabaudia ♃.

1658 Lilium candidum. *Linn.* — *Açucena branca, ou Cebôlla cecem.*— Habitat in Oriente, Persia caspica, Sardinia, et? Helvetia ♃.

1659 Lilium Martagon. *Linn. Brot.* — *Martagão.* — Habitat in montosis sylvaticis Europae, et Sibiriae; Lusitaniae in *Gerez* et Herminio ♃.

1660 Petilium imperiale. *Jaume.* — *Fritillaria imperialis. Linn.*—*Corôa imperial.*—Habitat in Persia ♃.

1661 Fritillaria Lusitanica. *Wikstr.* — *Fritillaria Meleagris. Brot. nec Linn.* — Habitat trans Tagum in ericetis, ad *Bussaco,* et alibi Lusitaniae. Ex Spreng. et Welw. Fritillaria Lusitania Wikstr. et Fritillaria Meleagris. Brot. species diversae, quod a Kunth (En. pl.) non confirmatur. Ex eodem Cl. Welw. Fritillaria Lusitanica Wikstr. invenitur, sed rarissima, ad *Cintra* in dumetis prope *S. Pedro* (Fl. exs. Welw. in Museo A. S. Olis.) ♃.

TRIBUS.

Asparageae.

1662 Polygonatum vulgare. *Desf.* — *Convallaria Polygonatum. Linn. Brot.* — *Sêllo de Salomão.* — Habitat in Europa, Tauria, Sibiria; Lusitaniae in omnibus provinciis ♃.

1663 Convallaria majalis. *Linn.*— *Lirio convalle.* — Habitat in nemoribus Europae totius, Tauriae, Sibiriae, et Americae borealis ♃.

1664 Dracoena Draco. *Linn.* — Habitat in Insulis Canariis, et India orientali ♄.

1665 Asparagus officinalis. *Linn.*—*Espargo hortense.*—Habitat in Europae, Tauriae, Sibiriae arenosis maritimis ♃.

1666 Smilax aspera. *Linn. Brot.*—*Legacão, Salsa parrilha do Reino.*—Habitat in Europa australi, et Syria; Lusitaniae ad sepes ♃.

1667 Ruscus aculeatus. *Linn. Brot.*—*Gilbarbeira.*—Habitat in nemorosis Europae australis, et Anglia; Lusitaniae ad sepes, et in dumetis *Beira*, *Extremadura* ♄.

1668 Ruscus Hypoglossum. *Linn.*—Habitat in sylvis umbrosis Hungariae, Carinthyae, Italiae ♄.

1669 Ruscus androgynus. *Linn.*—Habitat in Insulis Canariis, et Madera, spontanea Azoricis ♄.

TRIBUS.

Parideae.

1670 Myrsiphylum asparagoides. *Willd.*—*Medeola asparagoides. Linn.*—Habitat ad Cap. B. Spei ♄.

ORDO.

DIOSCOREACEAE.

1671 Dioscorea bulbifera. *Linn.*—Habitat in India orientali ♃ ◡.

1672 Dioscorea sativa. *Linn.*—Habitat in India orientali ♃ ◡.

ORDO.

MELANTHAEAE.

TRIBUS.

Colchiceae.

1673 Colchicum autumnale. *Linn.* — *Colchico autumnal.* — Habitat in pratis Europae totius, sed borealis rarior ♃.

1674 Colchicum Lusitanicum. *Brot. Phyt.* — *Colchicum multiflorum. Brot.* — *Colchicum Bivonae Guss. (ex Boiss.)* — Habitat in Beira, in basalticis *Serra de Monsanto* prope Olisiponem ♃.

1675 Merendera Bulbocodioides. *Steud.* — *Colchicum Bulbocodioides. Brot. Phyt.* — Habitat in collibus calcareis Lusitaniae mediae, etiam (Welw.) in pascuis editis *Serra do Gerez* ♃.

TRIBUS.

Veratreae.

1676 Veratrum album. *Linn. Brot.* — *Helleboro branco.* — Habitat in pratis subalpinis et alpinis Europae totius; Lusitaniae circa Herminium ♃.

1677 Veratrum nigrum. *Linn.* — Habitat in sylvis montosis Europae mediae ♃.

ORDO.

JUNCACEAE.

1678 Juncus maritimus. *Lam. Brot.*—*Juncus acutus. β. Linn.*—*Junco maritimo.*—Habitat in paludosis maritimis utriusque hemisphaerae extra tropicos; Lusitaniae frequens ♃.

1679 Juncus acutus. *Lam. Brot.*—*Juncus acutus. α Linn.*—*Junco agudo.*—Habitat in arenosis maritimis Europae, et regionis mediterraneae; Lusitaniae frequens ♃.

1680 Juncus glaucus. *Ehrh.*—*Juncus diaphragmarius. Brot.*—*Junco desmedullado.*—Habitat in Europa, Asia minori, Madera, et America boreali; Lusitaniae praesertim borealis, etiam (Welw.) sed raro in Algarbiis prope *Silves* ♃.

1681 Lusula maxima. *Desv.*—*Juncus maximus. Brot.*—Habitat in Herminio, et *Serra do Gerez*, sicut in montosis sylvaticis totius Europae, in Sibiria, et Labradoria ♃.

ORDO.

COMMELINACEAE.

1682 Commelina communis. *Linn.*—Habitat in Carolina, India orientali ① ♃.

1683 Commelina Africana. *Linn.* — Habitat ad Cap. B. Spei ♃.

1684 Commelina tuberosa. *Linn.* — Habitat in Mexico ♃.

1685 Tradescantia virginica. *Linn.* — Habitat in America boreali ♃.

1686 Tradescantia discolor. *Smith.* — Habitat in America meridionali; circa sinum mexicanum ♃.

1687 Dichorizandra thyrsiflora. *Mik.* — Habitat in Brasilia ♃.

1688 Spironema fragrans. *Lindl.* — Habitat in Mexico ♃.

ORDO.

CYPERACEAE.

1689 Cyperus longus. *Linn. Brot.* — *Junça de cheiro, ou Albafór.* — Habitat in aquosis Europae australis, Africae borealis, et Indiae orientalis; Lusitaniae frequens ♃.

1690 Cyperus esculentus. *Brot.* — Habitat in paludosis ad Tagum non procul a *Santarem*, etiam (Welw.) in arenosis maritimis *da Praia das Maçãas* ad *Cintra* ♃.

1691 Cyperus aureus. *Tenor.* — Habitat in Italia ♃.

1692 Papyrus Sicula. *Parlat.* — Habitat in paludibus Siciliae. Species in omnibus fere viridariis Europae culta, et hucusque a botanicis habita eadem ac species aegyptiana Papyrus antiquorum Willd. seu

Cyperus Papyrus Linn.; sed species diversas esse recenter observavit *Parlatore*, Cl. Professor Florentinus (V. Hook. J. of Bot. Jun. 1851 pag. 189, et Fl. Ital. ejusdem *Parlatore)* ♃.

1693 Scirpus mucronatus. *Linn. Brot.* — Habitat in inundatis Europae meridionalis, Americae borealis, Asiae, et Novae-Hollandiae; Lusitaniae in Beira, et (Welw.) trans Tagum frequentissima ♃.

1694 Scirpus lacustris. *Linn Brot.* — *Bunho.* — Habitat in aquosis Europae, Asiae, Americae borealis; Lusitaniae prope *Villa Nova da Rainha*, et alibi frequens ♃.

1695 Eleocharis palustris. *R. Br.* — *Scirpus palustris. Linn. Brot.* — Habitat in palustribus totius fere orbis; Lusitaniae, praesertim australioris, (Welw.) prope *Povoa* et *Friellas* frequens ♃.

1696 Isolepsis Holoschoenus. *Roem.* — *Scirpus Holoschoenus. Linn. Brot.* — Habitat in Europa australi; Asia, et Africa boreali; Lusitaniae ad Mundam, et (Welw.) trans Tagum prope *Piedade* in subhumidis frequens ♃.

1697 Chaetospora nigricans. *Kunth.* — *Schoenus nigricans. Linn. Brot.* — Habitat in Europa, Persia, et? ad Cap. B. Spei; Lusitaniae in *Serra da Arrabida* prope *Aldêa dos Mouros*, ad *Almada*, *Caparica*, et alibi trans Tagum ♃.

1698 Elyna spicata. *Schrad.* — *Carex myosuroides. Vill.* — Habitat in Alpibus Europaeis summis ♃.

1699 Carex paniculata. *Linn. Brot.* — Habitat in paludibus Europae, et Americae borealis; Lusitaniae in Beira, et (Welw.) Transtagana prope *Villa Nova de Mil Fontes* ♃.

ORDO.

GRAMINEAE.

TRIBUS.

Oryzeae.

1700 Oryza sativa. *Linn.*—Colitur in Europa meridionali, America, Asia, Africa; Lusitaniae in parte media et australi ①.

TRIBUS.

Phalarideae.

1701 Lygeum spartum. *Loefl.* —Habitat in Hispania, Africa boreali ♃.

1702 Zea Mays. — *Linn.* — *Milho grosso, ou Milhão.* — Habitat indigena apud Paraguenses (A. de St. Hil.), in omni Lusitania valde culta ①.

1703 Coix Lachryma. *Linn.* — Habitat in India orientali ♃.

1704 Phleum pratense. *Linn.* β. *Kunth.* — *Phleum nodosum. Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae in collibus calcareis ad Conimbricam ♃.

1705 Phalaris canariensis. *Linn.* — *Alpista.*—Habitat in Insulis Fortunatis. Valde culta in Europa ①.

1706 Phalaris arundinacea. *Linn.* — Habitat in aquosis Europae, Americae, et Asiae borealis ♃.

1707 Holcus lanatus. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa, et America boreali; Lusitaniae in humidis umbrosis *Serra de Cintra*, et alibi Extrêmadura, Beira, Algarbiis ♃.

1708 Anthoxanthum odoratum. *Linn. Brot.* — *Feno de cheiro ordinario.* — Habitat in Europa, Sibiria; Lusitaniae trans Tagum, et provinciis borealibus ♃.

1709 Anthoxanthum amarum. *Brot. Phyt.* — *Feno de cheiro amargoso.* — Habitat Lusitaniae ad *Villa Franca* prope Conimbricam, et alibi in Beira, et Interamnia, sat frequens (Welw.) prope *Braga* ♃.

TRIBUS.

Paniceae.

1710 Setaria glauca. *Beauv.* — *Panicum glaucum. Linn. Brot.* — *Milhãa glauca.* — Habitat in Europa, Asia, Africa, America, Nova-Hollandia; Lusitaniae ad *Céa*, et alibi in provinciis borealibus ①.

1711 Setaria verticillata. *Beauv.* — *Panicum verticillatum. Linn. Brot.* — *Milhãa verticillada.* — Habitat in Europa, Asia, America; Lusitaniae ad Conimbricam, et (Welw.) in oleraceis aggeris Olisiponensis tempore autumnali fere ubique ①.

1712 Setaria viridis. *Beauv.* — *Panicum viride. Linn.* — *Milhãa verde.* — Habitat in Europa, Sibiria, America boreali, Japonia; Lusitaniae in Beira ①.

1713 Setaria italica. *Kunth.* — *Panicum itali-*

cum. Linn. — *Milho painço.* — Habitat in Europa, India, Nova-Hollandia; Lusitaniae culta ①.

1714 Milium effusum. *Linn.* — Habitat in Europae nemoribus, Sibiria ♃.

1715 Panicum rottboellioides. *Humb. et Kunth.* — *Milhãa das Antilhas.* — Habitat ad Orinocum ♃.

1716 Panicum virgatum. *Linn.* — Habitat in America boreali ♃.

1717 Panicum miliaceum. *Linn.* — *Milho miudo.* — Habitat in India orientali; omni Lusitania culta ①.

1718 Panicum altissimum. *Meyer.* — *Panicum elatius. Kunth.* — Habitat in Peruvia ①.

1719 Panicum sanguinale. *Linn.* — *Paspalum sanguinale. Brot.* — *Digitaria sanguinalis. Pers.* — *Milhãa digitada.* — Habitat in Europa, Asia, America; Lusitaniae frequens ①.

TRIBUS.

Stipaceae.

1720 Macrochloa tenacissima. *Kunth.* — *Stipa tenacissima. Linn. Brot.* — *Esparto.* — Habitat Lusitaniae in Algarbiis, frequens (Welw.) prope *Villa Nova de Portimão*, et ad *Cabo de S. Vicente;* in Hispania, Attica, Barbaria ♃.

1721 Macrochloa arenaria. *Kunth.* — *Stipa arenaria. Brot. Phyt.* — *Stipa gigantea. Link.* — *Baracejo.* — Habitat in aridis et arenosis Lusitaniae meridionalis, passim in pinetis et dumetis ab *Almada* ad *Cabo de Espichel;* etiam in Hispania ♃.

TRIBUS.

Agrostideae.

1722 AGROSTIS MILIACEA. *Brot.* — *Talha-dente.* — Habitat frequens Lusitaniae ♃.

TRIBUS.

Arundinaceae.

1723 ARUNDO DONAX. *Linn. Brot.* — *Canna.* — Habitat Europa australi, Caucaso, Sibiria, Aegypto; Lusitaniae ad sepes, et aggeres, quasi spontanea ♃.

1724 PHRAGMITES COMMUNIS. *Trin.* — *Arundo phragmitis. Linn. Brot.* — *Caniço d'agua.* — Habitat in Europa, Caucaso, Sibiria, Japonia, America, Nova-Hollandia; Lusitaniae in humidis ad Tagum ♃.

TRIBUS.

Chlorideae.

1725 SPARTINA STRICTA. *Roth.* — *Paspalum strictum. Brot. Phyt.* — *Paspalum cynosuroides. Brot.* — *Murraça.*—Habitat Europa australi, Anglia; Lusitaniae ad *Seixal*, *Sacavem*, in Algarbiis, (Welw.) prope *Villa Nova de Portimão* ingenti quantitate, sumaeque utilitatis ♃.

1726 Cynodon Dactylon. *Pers.* — *Digitaria stolonifera. Schrad.* — *Paspalum Dactylon. Brot.* — *Panicum Dactylon. Linn.* — *Grama das boticas.* — Habitat in Europa, Asia, America, Nova-Hollandia; Lusitaniae ubique ♃.

TRIBUS.

Avenaceae.

1727 Avena agraria. *Brot.* — *Avena strigosa. Schreb. β. Kunth.* — *Avéa.* — Habitat in Europa; Lusitaniae in agris fere spontanea, ubi colitur cum varietatibus — Avena agraria mutica Brot. — *Avéa mócha,* Avena agraria sesquialtera. Brot. — *Avéa ordinaria* ①.

1728 Avena hirsuta. *Roth.* — *Avena barbata. Brot.* — *Balanco.* — Habitat in Lusitania, Hispania, Italia, et Montevideo ①.

1729 Aira caryophyllea. *Linn. Brot.* — Habitat Lusitaniae in Beira; Europa, Tauria, Chili, Cap. B. Spei ①.

1730 Deschampsia laevis. *Schult.* — *Aira laevis. Brot.* — Habitat Lusitaniae in Beira ①.

TRIBUS.

Festucaceae.

1731 Cynosurus cristatus. *Linn. Brot.* — Habitat in pratis Europae; Lusitaniae in Beira ♃.

1732 Bromus madritensis. *Linn. Brot.* — Habitat

in sterilibus Europae australis, et Africae borealis; Lusitaniae mediae, et australis ①.

1733 Festuca ovina. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa, Sibiria; Lusitaniae in collibus siccioribus, et apricis aridis provinc. boreal. ♃.

1734 Festuca tenuifolia. *Sibth.* — *Festuca ovina. Linn. β. tenuifolia. Kunth.* — Habitat in Europa, Sibiria ♃.

1735 Festuca duriuscula. *Linn.* — Habitat Europa ♃.

1736 Festuca elatior. *Linn.* — Habitat in pratis Europae, Sibiriae ♃.

1737 Dactylis glomerata. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa, Sibiria, America boreali; Lusitaniae fere ubique ♃.

1738 Poa trivialis. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa, Caucaso, Sibiria, Japonia, America boreali; Lusitaniae in Beira praesertim ♃.

1739 Poa Eragrostis. *Brot.* — *Poa megastachya. Koel.* — *Briza Eragrostis. Linn.* — Habitat Europa australi, Africa boreali, America ①.

1740 Poa nemoralis. *Linn.* — Habitat in Europae nemoribus, Caucaso, Sibiria, America boreali ♃.

1741 Briza maxima. *Linn. Brot.* — *Bollebolle maior.* — Habitat Europa australi, India, Cap. B. Spei; Lusitaniae frequens ①.

1742 Briza media. *Brot.* — *Briza media. Linn.? Bollebolle menor.* — Habitat in pratis, et vallibus subhumidis Lusitaniae frequens ①.

1743 Uniola paniculata. *Linn.* — Habitat in America boreali ♃.

1744 Bambusa arundinacea. *Willd.* — *Arundo Bambos. Linn.* — *Bambú.* — Habitat in Asia tropica ♄.

TRIBUS.

Hordeaceae.

1745 Lolium perene. *Linn. Brot.* — *Raigraz dos Inglezes, Herva da semente, Azevém.* — Habitat in Europa, America boreali; Lusitaniae vulgaris ♃.

1746 Lolium temulentum *Linn. Brot.*—*Joio.*—Habitat in Europa, America, Japonia, Nova-Hollandia ①.

1747 Triticum vulgare. *Vill.* — *Trigo.* — Habitat apud Baschkiros. Triticum aestivum Linn. — *Trigo tremez*, et Triticum hybernum Linn. — *Trigo branco candiel, preto, mourisco, durazio, gallego*, considerantur varietates Tritici vulgaris Vill. ①.

1748 Triticum compositum. *Linn.* — *Triticum turgidum. Linn.* — *Trigo mourisco maior.*—Patria ignota ①.

1749 Triticum repens. *Linn. Brot.* — *Grama das boticas de França.* — Habitat in Europa, Sibiria, America; Lusitaniae in provinciis borealibus, etiam (Welw.) prope *Villa Nova de Portimão* in Algarbiis, sed raro ♃.

1750 Triticum villosum. *Beauv.* — Crescit in Europa australi, Oriente ①.

1751 Triticum Polonicum. *Linn.* — *Trigo da Polonia.* — Patria ignota ①.

1752 Secale cereale. *Linn. Brot.* — *Centeio.* — Habitat in deserto Caucasico-Caspico ①.

1753 Elymus geniculatus. *Curt.*—Habitat in maritimis Angliae, Hollandiae ♃.

1754 Hordeum hexastichon. *Linn.* — *Cevada.* — Patria ignota ①.

1755 Hordeum distichon. *Linn.* — *Cevada Santa.* — Habitat in Tataria ①.

1756 Hordeum murinum. *Linn. Brot.* — *Cevada dos ratos.* — Habitat in Europa, Oriente, Montevideo, Cap. B. Spei; Lusitaniae ad vias, muros, et alibi frequentissima ①.

TRIBUS.

Rottboelliaceae.

1757 Tripsacum dactyloides. *Linn.* — Habitat in America boreali, Mexico, *S. Domingos* ♃.

TRIBUS.

Andropogoneae.

1758 Sacharum officinarum. *Linn.* — *Cana d'assucar.* — Colitur sub tropicis ♃.

1759 Andropogon hirtus. *Linn. Brot.* — Habitat in Europa australi, Barbaria, Oriente, Cap. B. Spei; Lusitaniae vulgaris ♃.

1760 Andropogon Sorghum. *Brot.* — *Holcus Sorghum. Lam.* — *Milho zaburro vermelho, ou Milho da India.* — Habitat in India orientali. Colitur inhumentibus Lusitaniae ①.

1761 Andropogon compactum. *Brot.* — *Holcus Sorghum. Linn.* — *Milho zaburro branco.* — Habitat in India. Colitur in humentibus Lusitaniae ①.

1762 Andropogon Halepensis. *Sibth. Brot.* — *Holcus Halepensis. Linn.* — *Zaburro de Alepo.* — Habitat in Europa australi, Syria, Mauritania, Cuba; Lusitaniae, et Brasiliae ♃.

1763 Andropogon cernuus. *Roxb.* — *Sorghum cernuum. Willd.* — Patria ignota. Colitur Bengala ① ♃.

ACOTYLEDONEAE VASCULARES.

ORDO.

EQUISETACEAE.

1764 Equisetum fluviatile. *Linn. Brot.* — *Cavailinha.* — Habitat in paludosis, fossis, ad fluvios Europae totius; Lusitaniae prope *Bellas*, et alibi frequens ♃.

1765 Equisetum palustre. *Brot.* — Habitat Lusitaniae in paludosis et fossis, prope *Calhariz* (Welw.), et alibi ♃.

ORDO.

FILICES.

SUB-ORDO.

POLYPODIACEAE.

TRIBUS.

Acrosticheae.

1766 Acrostichum squamosum. *Swartz.* — Habitat in America australi, Madera, Azoricis ♃.

TRIBUS.

Grammitideae.

1767 Gymnogramme leptophylla. *Desv.* — *Grammitis leptophylla. Swartz.* — *Polypodium leptophyllum. Linn. Brot.* — Habitat Europa australi, Madera, Azoricis; Lusitaniae in cenobio *da Serra da Arrabida*, et alibi frequens ♃.

1768 Gymnogramme Ceterach. *Desv.* — *Asplenium Ceterach. Linn. Brot.* — *Ceterach officinarum. Willd.* — *Doiradinha.* — Habitat in Europa, Teneriffa; Lusitaniae omnis in muris, et fissuris rupium humidis ♃.

TRIBUS.

Polypodieae.

1769 Polypodium vulgare. *Linn. Brot.* — *Polypodio.* — Habitat in rupestribus sylvaticis totius Europae, Madera, Azoricis, America boreali; Lusitaniae ubique ♃.

TRIBUS.

Pterideae.

1770 Pteris aquilina. *Linn. Brot.* — *Feto femea das Boticas.* — Habitat in sylvaticis totius Europae, America boreali, Madera; Lusitaniae frequens ubique ♃.

1771 Pteris arguta. *Vahl.* — Habitat in Insulis Canariis, Madera, Azoricis; Lusitaniae in *Serra de Cintra* prope cenobio *dos Capuchos* (Welw.), et primum indicata Florae Lusitaniae a Clar. Vallorado ♃.

1772 Adianthum Capillus Veneris. *Linn. Brot.* — *Avenca.* — Habitat in Europa australi et media, Africa boreali, Asia, Madera, Azoricis; Lusitaniae frequentissima ♃.

1773 Adianthum reniforme. *Linn.* — Habitat Madera, Canariis, et Mauritiis ♃.

1774 Lomaria spicant. *Desv.* — *Blechnum boreale. Sm.* — *Osmunda spicant. Linn.* — *Acrostichum spicant. Brot.* — Habitat Europa, Canariis, Madera, Azoricis; Lusitaniae in umbrosis *Serra de Cintra*, *Bussaco*, et alibi Lusitaniae borealis et mediae ♃.

1775 Woodwardia radicans. *Swartz.* — Habitat Italia, Canariis, Madera, Azoricis, et etiam (Welw.) Lusitaniae ad *Caldas do Gerez* ♃.

TRIBUS.

Asplenieae.

1776 Asplenium adiantum nigrum. *Linn. Brot.* — *Avenca negra.* — Habitat Europa, Mauritania, America boreali; Lusitaniae in Beira frequens, et alibi ♃.

1777 Asplenium Trichomanoides. *Linn. Brot.* — *Avencão, Polytricho das Boticas.* — Habitat in rupibus totius Europae, ut Lusitaniae, etiam in Asia, America boreali, Africa boreali ♃.

1778 Asplenium palmatum. *Lam.* — *Asplenium hemionites. Linn. Brot.* — Habitat Europa australi, Ca-

nariis, Madera, Azoricis; Lusitaniae in *Cintra* frequens ♃.

1779 Asplenium marinum. *Linn.*—Habitat Anglia, Hispania, Africa boreali, Canariis, Madera, Azoricis, etiam Lusitaniae in *Serra de Cintra* (Valor. Welw.) ♃.

1780 Asplenium Filix foemina. *Bernh.* — *Polypodium Filix foemina. Linn. Brot.*—*Athyrium Filix foemina. Roth.* — *Feto femea dos Italianos.* — Habitat Europa, Madera, Azoricis; Lusitaniae, praesertim in provincis borealibus ♃.

1781 Asplenium canariense. *Willd.*—Habitat Canariis, Madera ♃.

1782 Asplenium productum. *Lowe.*—Habitat Madera ♃.

1783 Asplenium Lanceolatum. *Huds.*—Habitat Madera, Azoricis, et in Anglia, Bohemia, Hungaria ♃.

4784 Asplenium Ruta muraria. *Linn. Brot.* — *Ruta muraria, ou Paronychia de Mathiolo.* — Habitat in rupibus Europae, praesertim borealis; Lusitaniae etiam, sed raro ♃.

1785 Allantodia umbrosa. *Kaulfuss.* — *Aspidium umbrosum. Swartz.* — Habitat Madera, Azoricis ♃.

1786 Scolopendrium officinarum. *Swartz.* — *Asplenium scolopendrium. Linn. Brot.* — *Lingua cervina.* —Habitat Europa, Africa boreali, Madera, Azoricis: Lusitaniae, praesertim borealis, etiam in *Cintra*, sed raro ♃.

TRIBUS.

Aspidieae.

1787 Aspidium aculeatum. *Swartz.* — *Polypodium aculeatum. Linn. Brot.*—Habitat Europa, Africa bo-

reali et australi, America boreali; Lusitaniae mediae et borealis ♃.

1788 Aspidium Filix mas. *Swartz.* — *Nephrodium Filix mas. L. C. Richard.* — *Polypodium Filix mas. Linn. Brot.* — *Feto macho, ou Dentebrura.* — Habitat Europa, Asia, Africa boreali; Lusitaniae in sylvaticis, et ad fluvios provinciarum borealium, frequens (Welw.) in Herminio ♃.

1789 Aspidium thelypteris. *Swartz.* — *Polypodium thelypteris. Linn.* — Habitat Europa, Africa boreali et australi, America boreali; Lusitaniae in paludosis prope *Bellas*, ad *Comporta* (Welw.) frequens, at alibi Extremadura et Transtagana ♃.

1790 Aspidium falcinellum. *Swartz.* — *Aspidium trapezoides. Swartz.* — Habitat Madera, Jamaica ♃.

1791 Aspidium frondosum. *Lowe.* — Habitat Madera ♃.

1792 Nephrodium molle. *R. Br.* — *Aspidium molle. Swartz.* — Habitat Madera, Azoricis, etiam Insulis occidentalibus maris pacifici, et Nova-Hollandia ♃.

1793 Nephrodium Faenisesii. *Lowe.* — Habitat Madera, Azoricis ♃.

1794 Nephrodium affine. *Lowe.* — Habitat Madera ♃.

1795 Nephrodium elongatum. *Lowe.* — Habitat Madera ♃.

1796 Nephrodium orbiculatum. *Desv.* — Habitat Madera ♃.

1797 Cystopteris fragilis. *Bernh.* — *Aspidium fragile. Swartz.* — *Polypodium fragile. Linn. Brot.* — Habitat Europa, America, Canariis, Madera, Azoricis; Lusitaniae in *Serra de Cintra*, *Serra da Estrella* et alibi ♃.

TRIBUS.

Dicksonieae.

1798 Dicksonia culcita. *Herit.* — *Balantium culcita. Kaulfuss.* — Habitat Madera, Azoricis ♃.

1799 Davallia canariensis. *Swartz.* — *Trichomanes canariensis. Linn. Brot.* — *Polypodium lusitanicum. Linn.* — Habitat Canariis, Madera, Azoricis; Lusitaniae in *Cintra* frequens, etiam in Minio, et alibi ♃.

SUB-ORDO.

OSMUNDACEAE.

1800 Osmunda regalis. *Linn. Brot.* — *Feto real.* — Habitat Europa, Madera, Azoricis; Lusitaniae in umbrosis humidis *Serra de Cintra*, *Serra da Estrella*, et alibi in Beira ♃.

SUB-ORDO.

OPHIOGLOSSEAE.

1801 Ophioglossum lusitanicum. *Linn. Brot.* — *Lingua de cobra menor.* — Habitat Lusitaniae in dumetis *Caparica*, prope *Arrentella* et *Coina* (Welw.) in pinetis; etiam Madera ♃.

ORDO.

LYCOPODIACEAE.

1802 Lycopodium denticulatum. *Linn. Brot.* — *Lycopodio.* — Habitat Europa, Africa mediterranea; Lusitaniae in Minio, ad basim *Serra da Arrabida* in umbrosis a nobis visa ♃.

1803 Lycopodium stoloniferum. *Swartz.* — *Lycopodio dos jardins.* — Habitat in India orientali. In viridariis Europae valde culta ♃.

ADDENDA.

9 Thalictrum flavum. *Linn. Brot.* — *Rhuibarbo dos pobres.* — Stirps lusitana indicata fuit a Brotero ut varietas stirpis Linnaeanae, nomine — *Thalictrum flavum hispanicum. Brot.*, sed a Boissier et ab aliis habita est species distincta, et nominata fuit — Thalictrum glaucum. *Desf.* — Habitat etiam in Hispania et regno neapolitano.

53 Chelidonium majus. *Mill.* — Habitat etiam Lusitaniae ad *Monchique* in Algarbiis (Welw.)

57 Fumaria spicata. *Linn.* — Platycapnos spicatus. *Bernhardi.* — Habitat in Europa omni mediterranea, et in Canariis.

60 Barbarea praecox. *R. Br.* — Habitat in Europa australiori montana, Africa boreali, Canariis, et in Canada.

64 Cardamine pratensis. *Linn.* — Habitat etiam in *Cintra* (Welw.)

67 Alyssum maritimum. *Linn.* — Koniga maritima. *R. Br.*

119 Dianthus attenuatus. *Sm. ac Dianthus lusitanus. Brot.* non eadem species ex Boissier. Stirps lusitana habitat in *Cintra.*

137 Lychnis laeta. *Ait.* — Habitat etiam in Hispania, Italia, et regno maroccano.

144 Arenaria rubra. *Linn.* — Spergula rubra. *Torr.* — Alsine rubra. *Wahlenbe.*

149 Malope trifida. *Cav.* — Habitat etiam Lusitaniae ad *Casas brancas* (Welw.)

196 Androsaemum officinale. *All.* — Habitat Lusitaniae ad Conimbricam et *Gerez.*

298 GENISTA CANDICANS. *Linn.* — Habitat etiam in Hispania, Madera, Canariis, et ex herbario Tournefortii in Lusitania.

310 CYTISUS ARGENTEUS. *Brot. Phyt.* — CHOSMONE ARGENTEA. *E. M.* — ARGYROLOBIUM LINNEANUM. *Walpers.*

328 MELILOTUS MESSANENSIS. *Desf.* — Habitat etiam in Algarbiis (Welw.)

344 GALEGA OFFICINALIS. *Linn.* — Habitat etiam Lusitaniae ad *Villa-Nova da Rainha* (Welw.)

349 PHACA BAETICA. *Linn.* — EROPHACA BAETICA. *Boiss.*

413 ARACHIS HYPOGAEA. *Linn.* — *Mandobi.*

414 TAMARINDUS INDICA. *Linn.* — *Tamarindo.*

456 ROSA SCANDENS. *Brot.* — Habitat etiam ad *Otta* prope *Caldas* (Welw.)

533 MOMORDICA ELATERIUM. *Linn.* — ECBOLIUM AGRESTE. *Rchb.* — ECBOLIUM ELATERIUM. *Rich.*

550 CUCUMIS COLOCYNTHIS. *Linn.* — Habitat etiam in Hispania australi, et Africa boreali.

664 LASERPITIUM GUMMIFERUM. *Desf.* — MARGOTIA LASERPITIOIDES. *Boiss.* — Habitat etiam in Hispania.

668 *Scandix cerefolium*, lege — *Scandix cerefolium. Linn.*

775 ANTHEMIS AUREA. *Brot.* — Eadem species ac ANTHEMIS NOBILIS. *Linn.* ex Boissier, ut ANACYCLUS AUREUS. *Linn.* ab eodem cl. botanico varietas, nec species distincta ANTHEMIS NOBILIS. *Linn.*, esse videtur.

792 PYRETHRUM MYCONIS. *Moench.* — MYCONIA CHRYSANTHEMUM. *C. H. Schultz.*

815 SOLIVA LUSITANICA, lege — SOLIVA LUSITANICA. *Less.*

1031 Solanum Sodomeum. *Linn.* — Habitat etiam Lusitaniae in loco *Troya* prope *Setubal.*

1047 Mandragora officinarum. *Bertol.* — Habitat in omni regione mediterranea, et Lusitaniae ad *Villa-Nova da Rainha* et *Faro* (Welw.), ut etiam in Transtagana, unde nobis advenerunt stirpes horti.

1165 Ajuga Iva. *Schreb.* — Habitat in regione mediterranea, et Canariis.

1203 Gesneria zeberina. *Hort.*, lege — Gesneria zebrina. *Paxt.*

1209 Antirrhinum majus. *Brot.* in Phytographia lusitana indicatur ♄ ♄, sed raro frutex seu suffrutex observatur, pluries ♃ seu perenne herbaceum videtur.

1212 Anarrhinum bellidifolium. *Linn. Brot.*, lege — Anarrhinum bellidifolium. *Desf. Brot.* — *Antirrhinum bellidifolium. Linn.*

1229 Scrophularia Scorodonia. *Linn.* — Habitat etiam in Anglia, Gallia, et in Africa boreali.

1310 Amaranthus albus. *Linn.*—Habitat in omni regione mediterranea, et Lusitaniae ad *Villa-Nova da Rainha* ut alibi in Extremadura (Welw.)

1326 Salicornia fruticosa. *Linn. Brot.*— Arthrochnemon fructicosum. *Moq.* — Habitat etiam in Africa boreali, Senegalia, et Insula *Timor*.

1488 Triglochin palustre. *Brot.* — *Triglochin palustre. β. Linn.*, videtur esse ex Kunth eadem stirps ac Triglochin Barrelieri. *Lois.*

1495 Orchis longibracteata. *Biv.* — Aceras longibracteata. *Rchb.*

1496 Orchis longicruris. *Brot. Link.* — Ex Reichenbach et Boissier habita est species diversa ab Orchi simia. *Lam.* Eadem est stirps ac Orchis un-

DULATIFOLIA. *Biv.*, seu *Orchis simia. var. undulatifolia. Webb.*

1499 ANACAMPTIS PYRAMIDALIS. *Rich.*—ACERAS PYRAMIDALIS. *Reich.*

1503 OPHRYS TENTHRIDINIFERA. *Brot.* — Habitat etiam in Hispania, Italia, Graecia, et Africa boreali.

1674 COLCHICUM LUSITANICUM. *Brot.* — Habitat etiam in Hispania, et Graecia.

1675 MERENDERA BULBOCODIOIDES. *Steud.*—Habitat in Hispania (Boissier).

1700 ORYZA SATIVA. *Linn.* — *Arroz.*

1704 PHLEUM PRATENSE. *Linn.* — Habitat in Europa.

1783 ASPLENIUM LANCEOLATUM. *Huds.* — Habitat etiam Lusitaniae in *Cintra* (Welw.)

Observação. — Os additamentos referidos são extrahidos em parte da *Histoire du voyage dans le midi de l'Espagne* de Boissier, e, na parte Orchideas, do *Icones Florae Germaniae* de Reichenbac; obras, que só tivemos occasião de consultar depois de impresso o Catalogo Do mesmo modo fizemos por aproveitar algumas noticias sobre a habitação de plantas da nossa Flora, que nos foram communicadas verbalmente, e depois da dita impressão, pelo nosso amigo, o Dr. Friedrich Welwitsch.

Corrigenda.

Pag.	*Lin.*		
17	27	*Oth. lege*	*Ott.*
18	3	*Oth.*	*Ott.*
20	6	**Halopeae**	**Malopeae**
22	18	*Both.*	*Roth.*
27	4	*Negunda.*	*Negundo.*
39	10	BABBA-JOVIS	BARBA-JOVIS
84	9	CENTHRATERUM	CENTHRANTERUM
86	17	especies	species
93	14	*Lab.*	*Linn.*
95	9	omnia	omni
101	19	TINGITANUS	TINGITANUM
104	16	*Reid.*	*Rud.*
107	3	*Lobill.*	*Labill.*
108	4	usquo	usque
133	22	①	♃
137	28	♄	♄ ♄
»	29	*Wolkameria*	*Volkameria*
138	3	THUMBERGIA	THUNBERGIA
»	4	♄	♃
159	15	β ♄	♄
161	8	♃	♄
179	13	HIMANTGLOSSUM	HIMANTOGLOSSUM
185	5	*Dov.*	*Don.*
»	7	ANTUNMALE	AUTUMNALE
191	3	*Gawl.*	*Ker.*
200	27	*Schrad*	*Schrad.*
208	26	Lusitaniae, et Barbariae	Lusitania et Barbaria

INDEX

GENERUM, ET ORDINUM.

A.

C.

F.

I.

J.

K.

L.

M.

P.

Q.

R.

S.

U.

V.

W.

X.

INDEX

NOMINUM VULGARIUM.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

L.

M.

N.

S.

T.

